

# Liste des taxons notés mercredi 15 mai 2024


Etat imprimé le 21 mai 2024 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)

mercredi 15 mai 2024

## France - 28 : Mézières en Drouais - Coteau au dessus du parking du dolmen

avec : MORICE Patrick, GALAND Christian, PETIT Alain, QUITARD Fanny, BUISSON Daniel, BOIN Michel & DAVID Cécile



### Bryophytes

*Rhytidiadelphus triquetrus* (Hedw.) Warnst. [Hylocomiaceae]

### Gymnospermes

*Juniperus communis* L. subsp. **communis** [Cupressaceae]  
Genévrier commun des plaines  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12343>

### Angiospermes Monocotylédones

*Aira caryophylla* L. [Poaceae]  
Aira caryophyllé  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8564>

*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. **R** [Orchidaceae]  
Orchis pyramidal

*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [Poaceae]  
Droue stérile  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6720>

*Brachypodium rupestre* (Host) Roem. & Schult. subsp. **rupestre** [Poaceae]  
Brachypode commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43302>

*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [Poaceae]  
Brachypode des bois  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6674>

*Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr. subsp. **erecta** [Poaceae]  
Brome-des-prés commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8832>

Vivace de 30 à 60 cm de haut, poussant en touffes, à feuilles de 2 sortes, les caulinaires larges et planes, les inférieures étroites et pliées, bordées de cils fins surtout visibles à contre-jour ; ce caractère permet toujours de reconnaître cette espèce qui est, par ailleurs très variable.

*Carex divulsa* Stokes [Cyperaceae]  
Carex de Westfalie  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5894>

Plante en touffes, avec des inflorescences allongées ( $\geq 5,5$  cm) ; épillets à utricules longs de 3,4-4,2 mm ; épillets espacés sauf les supérieurs et espace entre les 2 épis inf. gén.  $> 2$  cm ; feuilles souples, retombantes, vertes

*Carex flacca* Schreb. subsp. **flacca** [Cyperaceae]  
Carex glauque commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9014>  
Rhizomateuse hétérostachyée de 30 à 60 cm de haut, à feuilles de 3 à 4 mm de large de couleur typiquement glauque et à épillets femelles brunâtres composés d'utricules arrondis et dépourvus de bec.

*Carex sylvatica* Huds. subsp. **sylvatica** [Cyperaceae]  
Carex des bois commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5979>  
Cespitueuse hétérostachyée. Utricules brunâtres, longs de 4-5,5 mm, distinctement nervés, progressivement rétrécis en un bec long, étroit et bifide ; épis ♀ longuement pédonculés à pédoncule scabre, au moins l'épi inf. pendant ; feuilles larges de 3-6 (9) mm, vert clair.

*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce **R** [Orchidaceae]  
Céphanthère jaunâtre  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6419>

*Festuca heterophylla* Lam. subsp. **heterophylla** [Poaceae]  
Fétuque hétérophylle  
Fétuque de grande taille (pouvant dépasser 1 m), en touffes denses, bien caractérisée par son dimorphisme foliaire, les inférieures très fines et scabres souvent nombreuses, les caulinaires beaucoup plus larges.

*Festuca lemanii* Bastard [Poaceae]  
Fétuque de Léman  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6874>

*Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco [Poaceae]  
Avénule des prés au sens large  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6658>  
Plante vivace pouvant atteindre 1 m de haut surtout caractérisée par ses feuilles inférieures et ses gaines longuement velues, à ses panicules allongées et brillantes et ses arrêtes à base aplatie

*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [Orchidaceae]  
Orchis bouc  
himanto = lanière / glossa = langue / hircin = bouc  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30162>  
plante robuste (30 à 70 cm) à grandes feuilles et inflorescences denses ; les fleurs sont tout à fait particulières avec des labelles dont le lobe médian est très allongé (4 à 6 cm) d'abord enroulé puis étalé et spiralé ; de plus cette plante a une odeur très forte et désagréable.

*Luzula forsteri* (Sm.) DC. [Juncaceae]  
Luzule de Forster  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6172>  
Vivace de 20 à 40 cm de haut, à feuilles étroites ( $< 5$  mm) à fleurs brunes, petites (5 mm), solitaires, disposées en panicules lâches à rameaux dressés étalés mais non refractés.

*Muscari comosum* (L.) Mill. [Asparagaceae]  
Muscari à toupet  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6343>

*Ophrys fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench subsp. **fuciflora** **R** [Orchidaceae]  
Ophrys bourdon précocé  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12844>

*Ophrys sphegodes* Mill. subsp. **sphgodes** [Orchidaceae]  
Ophrys araignée tardif  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12856>

*Orchis purpurea* Huds. [Orchidaceae]  
Orchis pourpre  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6547>

*Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. [Orchidaceae]  
Platanthère verdâtre  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30287>

*Poa nemoralis* L. subsp. **nemoralis** [Poaceae]  
Paturin des bois  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30566>

*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. [Poaceae]  
Vulpie queue-de-rat  
Annuelle de taille très variable (de 20 à 60 cm) avec une panicule longue (10 à 25 cm) et très fine, généralement englobée à sa base par la dernière gaine à maturité. Épillets à glumes peu inégales inermes (la sup.  $\leq 5,5$  mm de long à 1 nervure médiane complète et 2 latérales  $\pm$  obsolètes dans leur moitié apicale) et à glumelles non ciliées aristées.

### Angiospermes Dicotylédones

*Agrimonia eupatoria* L. subsp. **eupatoria** [Rosaceae]  
Aigremoine Petite  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4630>  
Grande rosacée (jusqu'à 1 m de haut) vivace à tige munie de poils de différente longueur, à feuilles divisées en folioles séparées, à fleurs jaunes en longues grappes, et à curieux fruits surmontés de nombreux crochets à son extrémité et à hypanthium sillonné sur les 3/4 de leur longueur.  
Souvent employée comme tonique et astringente.

*Anthriscus caucalis* M.Bieb. var. **caucalis** [Apiaceae]  
Cerfeuil anthriscue commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=79>

*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [Apiaceae]  
Cerfeuil des prés au sens large  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8626>  
Vivace (ou rarement bisannuelle) glabre, à feuilles de forme variable, profondément mais diversement divisées, à pétales entiers (ou légèrement échancrés), à fruits allongés (8 mm) lisses et noir brillant à maturité et à tiges creuses facilement compressibles.  
Les tiges et les jeunes fruits sont comestibles crues ou cuites

*Arenaria serpyllifolia* L. var. **serpyllifolia** [Caryophyllaceae]  
Arenaire à feuilles de serpolet de Linné  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1994>

*Carlina vulgaris* L. subsp. **vulgaris** [Asteraceae]  
Carline commune de Linné

**Centaurea scabiosa** L. subsp. **scabiosa** [Asteraceae]

Centauree scabieuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9194>

**Cerastium glomeratum** Thuill. [Caryophyllaceae]

Céraisie aggloméré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2024>

Ce céraisie annuel se reconnaît à ses sépales poilus jusqu'au bout, ses fleurs groupées en cymes assez denses et sa couleur d'un vert jaunâtre.

**Chaerophyllum temulum** L. [Apiaceae]

Cerfeuil enivrant

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=140>

Toxique

**Cirsium acaulon** (L.) Scop. [Asteraceae]

Cirse acaule

acaule, vient de a privatif et caul la tique. En effet le capitule apparaît au raz du sol.

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30045>

**Cirsium vulgare** (Savi) Ten. [Asteraceae]

Cirse commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=691>

Les jeunes pousses sont comestibles plutôt cuites

**Cornus sanguinea** L. subsp. **sanguinea** [Cornaceae]

Cornouiller sanguin

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2476>

**Crataegus monogyna** Jacq. var. **monogyna** [Rosaceae]

Aubépine monogyne commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9590>

**Cruciata laevipes** Opiz [Rubiaceae]

Croisette commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5034>

**Cytisus scoparius** (L.) Link subsp. **scoparius** f. **scoparius**

[Fabaceae]

Cytise à balais de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9667>

**Draba verna** L. [Brassicaceae]

Drave printanière

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1653>

**Eryngium campestre** L. [Apiaceae]

Panicaut champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=172>

On mangeait autrefois sa racine qui passe pour diurétique, apéritive, emménagogue  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - racine, jeune feuille, jeune pousse, foliole séchée - furocoumarines, polyvinés à surveiller

**Fragaria vesca** L. [Rosaceae]

Fraisier des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4745>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fruit

**Fraxinus excelsior** L. subsp. **excelsior** var. **excelsior**

[Oleaceae]

Frêne élevé de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30618>

Diurétique, hypotensive, antirhumatismal, antilithiasique.

**Geranium columbinum** L. [Geraniaceae]

Géranium colombin

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3419>

Annuelle peu élevées (10 à 30 cm) à feuilles orbiculaires de 2 à 5 cm planes, divisées en lanières. Fleurs roses assez grandes (pétales de plus de 6 mm) par deux portées par des pédoncules nettement plus longs que les feuilles. Tige et pétioles à poils appliqués.

**Geranium molle** L. [Geraniaceae]

Géranium mou au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30460>

Annuelle à pétioles à poils flexueux de tailles variables dont les plus longs dépassent le diamètre du pétiole, à feuilles à contour arrondi et assez profondément divisées à texture douce et veloutée, et à pétioles dépassant le calice, roses pourprés, veinés de violet, fortement échanrés.

**Geum urbanum** L. [Rosaceae]

Benoîte commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4758>

La racine séchée a longtemps été utilisée pour ses propriétés, en remplacement du clou de girofle dont elle a d'ailleurs l'odeur.  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

**Glechoma hederacea** L. [Lamiaceae]

Gléchome lierre-terrestre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3549>

Les limbes de jeunes feuilles sont les parties les plus aromatiques de cette plante comestible et médicinale.

**Hedera helix** L. subsp. **helix** f. **helix** [Araliaceae]

Lierre commun grimpant

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10318>

**Hippocrepis comosa** L. [Fabaceae]

Hippocrépis à toupet

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2929>

**Hypericum perforatum** L. [Hypericaceae]

Millepertuis commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3494>

**Jacobaea vulgaris** Gaertn. subsp. **vulgaris** [Asteraceae]

Sèneçon jacobée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14453>

**Lactuca virosa** L. [Asteraceae]

Laitue vireuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=996>

Le latex au goût amer et à odeur forte possède des propriétés comparables à celui des opiacés. Il a été utilisé comme opium dans médecine traditionnelle et jusqu'au début du 20e siècle dans les pharmacopées de plusieurs pays pour son activité analgésique entre autres.

**Lapsana communis** L. subsp. **communis** [Asteraceae]

Lapsane commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12391>

Excellente salade sauvage

**Lathyrus latifolius** L. [Fabaceae]

Gesse à feuilles larges

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2950>

**Ligustrum vulgare** L. [Oleaceae]

Troène commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3955>

**Linum catharticum** L. [Linaceae]

Lin purgatif au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3757>

Pl. amère et purgative

**Lonicera periclymenum** L. subsp. **periclymenum**

[Caprifoliaceae]

Chèvrefeuille des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30219>

Liane de 1 à 2 m, à feuilles caduques, elliptiques à lancéolées, atténuées et non soudées à la base, glabres, glauques dessous, les inf. brièvement pétiolées, les sup. sessiles, longues de 4-10 cm. Fleurs d'un blanc jaunâtre, odorantes, verticillées en têtes terminales longuement pédonculées.

**Melampyrum arvense** L. [Orobanchaceae]

Mélampyre des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5384>

**Myosotis arvensis** (L.) Hill [Boraginaceae]

Myosotis des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1400>

**Myosotis ramosissima** Rochel [Boraginaceae]

Myosotis très rameux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1416>

**Origanum vulgare** L. subsp. **vulgare** [Lamiaceae]

Origan commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13115>

Plante aromatique. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, mais carvacrol à surveiller

**Orobanche gracilis** Sm. [Orobanchaceae]

Orobanche grêle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3978>

Parasite des Fabacées

**Pilosella officinarum** Vaill. [Asteraceae]

Piloselle officinale

des offices

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=939>

Plante vivace peu élevée (30 cm max.) en colonnie, à feuilles toutes à la base, blanches tomenteuses en dessous, et avec de longs poils blancs sur les marges. Stolons pouvant atteindre 20 cm, munis de feuilles de taille décroissante. Capitule à fleurs jaune citron, souvent teintées de rouge à l'extérieur, isolé au sommet des tiges.

Plante télétoxique, libérant dans le sol des produits toxiques pour les autres plantes. Sa rosette de feuilles comestible crue était séchée et utilisée comme remède contre les affections respiratoires (asthme, bronchite), les problèmes de foie et d'estomac. Elle était également utilisée en cataplasme contre les ecchymoses. Propriétés : antinfectieuse, détoxifiante, astringente, cholagogue, apéritive, dépurative, vulnérinaire, désertive et diurétique. Ses feuilles servent de nourriture à la chenille du papillon de nuit, la Fidonie du Pin.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

**Polygala vulgaris** L. [Polygalaceae]

Polygale commun au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4207>

**Potentilla neglecta** Baumg. [Rosaceae]

Potentille négligée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4804>

**Potentilla verna** L. [Rosaceae]

Potentille printanière

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4806>

**Poterium sanguisorba** L. [Rosaceae]

Pimprenelle Petite

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4976>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

**Prunus cerasus** L. [Rosaceae]

Cerisier acide

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, pédoncule, feuille, écorce

**Pulmonaria longifolia** (Bastard) Boreau subsp. **longifolia**

[Boraginaceae]

Pulmonaire à feuilles très allongées

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13579>

**Quercus robur** L. [Fagaceae]

Chêne pédonculé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30308>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, feuille, bourgeon de feuille, graine

**Rabelera holostea** (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp []

Grande-Stellaire holostée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14627>

**Rosa canina** L. [Rosaceae]

Rosier des chiens

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4863>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - faux fruit (cynorrhodon), fleur, jeune pousse

**Rubus caesius** L. [Rosaceae]

Ronce bleue

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4910>

Ronce prostrée, à 3 folioles, sans poils sur les tiges et à pétiole sillonné sur toute sa longueur

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fruit

**Seseli montanum** L. subsp. **montanum** [Apiaceae]

Séséli des montagnes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=292>

**Sonchus asper** (L.) Hill subsp. **asper** [Asteraceae]

Laiteron rude

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1228>

**Sorbus aucuparia** L. subsp. **aucuparia** [Rosaceae]

Sorbier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14568>

**Sorbus torminalis** (L.) Crantz [Rosaceae]

Alisier torminal

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4996>

**Stachys recta** L. [Lamiaceae]

Épiaire droite

**Teucrium chamaedrys** L. [Lamiaceae]

Germandrée petit-chêne

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14778>

Toxicité hépatique

**Teucrium montanum** L. [Lamiaceae]

Germandrée des montagnes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3715>

**Teucrium scorodonia** L. [Lamiaceae]

Germandrée scorodaine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30402>

**Ulmus minor** Mill. [Ulmaceae]

Orme champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14872>

**Veronica arvensis** L. [Plantaginaceae]

Véronique des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5496>

**Veronica officinalis** L. [Plantaginaceae]

Véronique officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5517>

Elle a des propriétés astringentes, eupeptiques et cicatrisantes. La présence d'aucuboside, un anti-inflammatoire, contribue à soigner l'arthrose. La véronique combat aussi l'artériosclérose et a un effet antioxydant qui aide à combattre le diabète ; elle protège le foie, pour lequel elle est citée en conjonction avec d'autres plantes (pissenlit, chicorée, aspérule) par l'herboriste renommée Maria Treben qui la cite également pour l'excès de cholestérol, les blessures enflammées à cicatrisation difficile, l'eczéma chronique (avec l'ortie), les vieilles bronchites, la jaunisse, les affections de la rate, les troubles intestinaux, la nervosité issue de surmenage intellectuel et les vertiges. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

**Viburnum lantana** L. [Viburnaceae]

Viorne lantane

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14899>

**Vicia segetalis** Thuill. [Fabaceae]

Vesce des moissons

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7701>

**Viola riviniana** Rchb. [Violaceae]

Violettes de Rivinus

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14920>

**Viscum album** L. subsp. **album** [Santalaceae]

Gui des feuillus

Viscum vient du latin viscus, nom attribué à la fois à ce genre et à la glu que l'on extrayait de ses fruits. Album, blanc, a été choisi en raison de la couleur des fruits. Gui est une déformation de alu. dérivé du latin alus. qui désigne la colle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3782>

Hémiparasite. Viscum vient du latin viscus, nom attribué à la fois à ce genre et à la glu que l'on extrayait de ses fruits. En effet, les rameaux feuillés servaient, avec l'écorce du houx, à la préparation de la glu des oiseleurs, matière collante et visqueuse, pour piéger les oiseaux. Album, blanc, a été choisi en raison de la couleur des fruits. Gui est une déformation de glu, dérivé du latin glu, qui désigne la colle. Les baies toxiques peuvent provoquer des empoisonnements graves en cas d'ingestion.

## Oiseaux

**Ardea cinerea** [Ardeidae]

Héron cendré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=11003419>

**Cuculus canorus** [Cuculidae]

Coucou gris

**Sylvia borin** [Sylviidae]

Fauvette des jardins



## Insectes - Lépidoptères

**Gonepteryx rhamni** Linnaeus []

Le Citron

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001659>

Les plantes hôtes de la chenille sont des Rhamnus, dont le Nerprun purgatif sur calcaire et l'Alaterne en région méditerranéenne, et des Frangula, dont la bourdaine sur terrain acide.


**Polyommatus bellargus** Rottemburg []

Le Bel-Argus, l'Azuré bleu céleste

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001708>

## France - 28 : Écluzelles - Coteau de Marsauceux

avec : MORICE Patrick, GALAND Christian, PETIT Alain, QUITARD Fanny, BUISSON Daniel, BOIN Michel & DAVID Cécile



## Angiospermes Monocotylédones

**Anisantha diandra** (Roth) Tutin ex Tzvelev [Poaceae]

Droue à grandes fleurs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8831>

**Arrhenatherum elatius** (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl [Poaceae]

Fromental élevé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8654>

Avoine (arêtes dorsales), de grande taille (souvent plus de 1 m de haut), en touffe lâche. Grande panicule étroitement diffuse, portant de nombreux épillets blanchâtres d'environ 8 mm, à une seule fleur aristée. Lemme inf. portant une longue arête coudée presque à la base ; lemme sup. à arête subterminale souvent peu développée.

Parfois cultivée comme fourrage.

**Briza media** L. subsp. **media** [Poaceae]

Amourette des prés

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8828>

**Bromus hordeaceus** L. [Poaceae]

Brome mou au sens large

**Catapodium rigidum** (L.) C.E.Hubb. [Poaceae]

Catapode raide

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9159>

**Lolium arundinaceum** (Schreb.) Darbysh. subsp.

**arundinaceum** [Poaceae]

Grande-Fétuque commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10049>

**Ophrys fuciflora** (F.W.Schmidt) Moench subsp. **fuciflora** **R**

[Orchidaceae]

Ophrys bourdon précoce

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12844>

**Ophrys insectifera** L. [Orchidaceae]

Ophrys mouche

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6511>

**Ophrys sphegodes** Mill. subsp. **sphgodes** [Orchidaceae]

Ophrys araignée tardif

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12856>

**Ophrys xobscura** Beck [Orchidaceae]

Ophrys sombre

**Orchis mascula** (L.) L. subsp. **mascula** [Orchidaceae]

Orchis mâle commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13034>

**Orchis purpurea** Huds. [Orchidaceae]

Orchis pourpre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6547>

**Vulpia myuros** (L.) C.C.Gmel. [Poaceae]

Vulpie queue-de-rat

Annuelle de taille très variable (de 20 à 60 cm) avec une panicule longue (10 à 25 cm) et très fine, généralement englobée à sa base par la dernière gainie à maturité. Épillets à glumes peu inégales inermes (la sup. ≤ 5,5 mm de long à 1 nervure médiane complète et 2 latérales ± obsolètes dans leur moitié apicale) et à glumelles non ciliées aristées.



**Vulpia unilateralis** (L.) Stace subsp. **unilateralis** [Poaceae]

## Angiospermes Dicotylédones

**Achillea millefolium** L. [Asteraceae]

Achillée millefeuille au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8527>

Composée vivace, odorante, rampante (pouvant former des colonies très denses et étendues), à fleurs blanches ou rosées et à feuilles longues, étroites et finement divisées.

Plante médicinale astringente permettant de stopper les hémorragies. En infusion elle réduit les spasmes digestifs et utérins, et est aussi anti-inflammatoire.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - thuyone (alpha et bêta), camphre, eucalyptol à surveiller

**Ajuga chamaepitys** (L.) Schreb. subsp. **chamaepitys**

[Lamiaceae]

Bugle petit-pin

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3513>

**Alliaria petiolata** (M.Bieb.) Cavara & Grande [Brassicaceae]

Alliaire officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1468>

Grande plante (jusqu'à 1 m de haut), à légère odeur d'ail, à feuilles longuement pétiolées, cordiformes et dentées et à fleurs blanches.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

**Anthriscus caucalis** M.Bieb. var. **caucalis** [Apiaceae]

Cerfeuil anthriscue commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=79>

**Arctium minus** (Hill) Bernh. [Asteraceae]

Bardane Petite

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=417>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - racine, graine, feuille immature, tige

**Bellis perennis** L. [Asteraceae]

Pâquerette vivace

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=493>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - inflorescences

**Bryonia dioica** Jacq. subsp. **dioica** [Cucurbitaceae]

Bryone dioïque dioïque

**Campanula rapunculus** L. [Campanulaceae]

Campanule raiponce

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30003>

**Conium maculatum** L. var. **maculatum** [Apiaceae]

Ciguë Grande tachetée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31749>

Bisannuelle élevée (jusqu'à 2 m), à grosses tiges tachées de rouge, à feuilles très amples, plusieurs fois divisées; à fleurs blanches et à petits fruits (2 mm max.) globuleux, munis de côtes formant des ailes ondulées.

**Corylus avellana** L. var. **avellana** f. **avellana** [Betulaceae]

Noisetier commun sauvage

**Cynoglossum officinale** L. [Boraginaceae]

Cynoglosse officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1365>

**Daucus carota** L. subsp. **carota** var. **carota** [Apiaceae]

Carotte commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=37131>

**Digitalis purpurea** L. subsp. **purpurea** [Plantaginaceae]

Digitale pourpre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30976>

Plante extrêmement toxique (10 g de feuilles sèches et 40 g de feuilles fraîches sont mortels pour l'homme) dont on extrait la digitale ou digitoxine qui sont des glycosides cardiotoniques utilisés dans le traitement de la tachycardie et de l'arythmie cardiaque.

**Draba muralis** L. [Brassicaceae]

Drave des murailles

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1645>

**Echium vulgare** L. var. **vulgare** [Boraginaceae]

Vipérine commune à feuilles lisses

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1376>

**Ervilia hirsuta** (L.) Opiz [Fabaceae]

Luzette hirsute

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3242>

**Galium aparine** L. subsp. **aparine** [Rubiaceae]

Gaillet gratteron

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10168>

**Geranium dissectum** L. [Geraniaceae]

Géranium découpé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3420>

Annuelle de 20 à 40 cm de haut, surtout reconnaissable à ses feuilles découpées en lanières longues et étroites, ses fleurs rose vif à pétales dépassant peu les sépales, sur des pédoncules généralement plus courts que les feuilles. Pétiole à poils rétrorses, non glanduleux de plus de 1 mm de long.

**Geranium pyrenaicum** Burm.f. [Geraniaceae]

Géranium des Pyrénées au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30144>

**Helianthemum nummularium** (L.) Mill. [Cistaceae]

Hélianthème nummulaire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2430>

**Helleborus foetidus** L. [Ranunculaceae]

Hellébore fétide

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4455>

**Hypochaeris radicata** L. [Asteraceae]

Porcelle commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=967>

Vivace à latex à feuilles exclusivement en rosette basales presque entières, à face inférieure non entièrement glabre. Tiges ramifiées dès le milieu, munies de nombreuses feuilles avortées. Capitule à paillettes. Fleurs à ligules jaunes supérieures à 8 mm de long, dépassant l'involucre d'au moins 4 mm. Bractées involucreales disposées sur 3 à 4 rangs, nettement croissantes de l'extérieur vers l'intérieur. Akènes avec bec et pappus de 2 rangs de soies plumeuses. (Confusions possibles avec *H. glabra*)

**Juglans regia** L. [Juglandaceae]

Noyer commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3506>

Les feuilles et le brou contiennent plusieurs principes colorants dont la juglone, une naphtoquinone. Une fermentation longue est nécessaire.

**Leucanthemum vulgare** Lam. [Asteraceae]

Marguerite Grande au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1047>

**Linaria vulgaris** Mill. [Plantaginaceae]

Linaire commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5377>

**Malus sylvestris** Mill. [Rosaceae]

Pommier des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4762>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, bourgeon, fleur, feuille, racine

**Medicago arabica** (L.) Huds. [Fabaceae]

Luzerne d'Arabie

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3014>

Ses 3 folioles possèdent généralement une tache noire en leur centre

**Medicago minima** (L.) L. [Fabaceae]

Luzerne naine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3032>

**Pentanema squarrosus** (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente,

Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort. [Asteraceae]

Inule conyze

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=973>

**Picris hieracioides** L. [Asteraceae]

Picris fausse-épervière

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1102>

**Plantago coronopus** L. subsp. **coronopus** [Plantaginaceae]

Plantain corne-de-cerf de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13294>

**Prunus spinosa** L. [Rosaceae]

Prunellier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4847>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, fleur

**Rhamnus cathartica** L. [Rhamnaceae]

Nerprun purgatif

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4620>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce - anthraquinones, dérivés hydroxy-anthracéniques à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'une mention déconseillant l'usage prolongé.

**Rhinanthus alectorolophus** (Scop.) Pollich [Orobanchaceae]

Rhinanthe Grand

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5429>

**Rumex thyrsiflorus** Fingerh. [Polygonaceae]

Oseille à oreillettes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30328>

Espèce diploïde

**Salvia verbenaca** L. [Lamiaceae]

Sauge verbénacée au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3646>

**Sedum acre** L. [Crassulaceae]

Sédum âcre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30350>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

**Sedum rubens** L. [Crassulaceae]

Sédum rougeâtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30355>

**Senecio inaequidens** DC. [Asteraceae]

Sèneçon du Cap

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1176>

Les laines de moutons importées d'Afrique du Sud en Europe contenaient des graines de Sèneçon du Cap. L'espèce a ainsi été introduite accidentellement en Allemagne en 1889, en Belgique en 1922, en Ecosse en 1928, en France (Calais et Mazamet, dans le Tarn) en 1935 et en Italie en 1947. A partir de ces foyers, le Sèneçon du Cap a commencé à se propager en Europe dans les années 70.

**Senecio vulgaris** L. subsp. **vulgaris** [Asteraceae]

Sèneçon commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14458>

Plante annuelle très commune de taille variant de 10 à 50 cm, à feuilles épaisses, irrégulièrement découpées et à capitules de fleurs jaunes sans ligules, en groupes penchés avant la floraison.

**Seseli montanum** L. subsp. **montanum** [Apiaceae]

Séséli des montagnes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=292>

***Silene vulgaris*** (Moench) Garcke subsp. ***vulgaris*** var.

***vulgaris*** [Caryophyllaceae]

[Silene commun à feuilles larges](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43125>

***Stellaria media*** (L.) Vill. [Caryophyllaceae]

[Stellaire intermédiaire](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30388>

Petite plante annuelle à 5 pétales blancs bifides (donc paraissant 10). Possède la particularité d'avoir une ligne de poils sur les entrenœuds changeant de côté d'une paire de feuilles à l'autre.

Les jeunes pousses, récoltées toute l'année, se consomment en salade, leur saveur douce rappelle celle des noisettes. Le mouron des oiseaux peut être ajouté à une salade composée printanière avec le lamier tacheté, le plantain, le laiteron... On peut aussi les cuire en potage avec d'autres légumes. Attention à ne pas confondre avec *Lysimachia arvensis* aussi appelé mouron, mais toxique.

***Taraxacum sp.*** [Asteraceae]

[Pissenlit](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=36245>

[gr hamata](#)

***Torilis arvensis*** (Huds.) Link [Apiaceae]

[Torilis des champs au sens très large](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14807>

Annuelle de taille très variable, à ombelles terminales longuement pédonculées et dépourvues d'involucre (parfois 1 ou 2 bractées) et à fruits sans côtes, couverts d'aiguillons terminés par une couronne de crochets (forte loupe !). Tige à partie inférieure glabre.

***Torilis japonica*** (Houtt.) DC. subsp. ***japonica*** [Apiaceae]

[Torilis du Japon](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=44352>

***Trifolium campestre*** Schreb. [Fabaceae]

[Trèfle jaune](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30487>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

***Trifolium dubium*** Sibth. [Fabaceae]

[Trèfle douteux](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3152>

***Trifolium pratense*** L. subsp. ***pratense*** [Fabaceae]

[Trèfle violet](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3182>

***Urtica dioica*** L. [Urticaceae]

[Ortie Grande](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14875>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, racine - L'étiquetage des compléments alimentaires contenant les parties souterraines de cette plante doit comporter une mention recommandant de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé ("Demander l'avis de votre médecin et /ou pharmacien").

***Vicia segetalis*** Thuill. [Fabaceae]

[Vesce des moissons](#)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7701>



**Oiseaux**

***Aegithalos caudatus*** [Aegithalidae]

[Mésange à longue queue](#)