

Liste des taxons notés mercredi 22 mai 2024


Etat imprimé le 22 mai 2024 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)

mercredi 22 mai 2024

France - 28 : Rouvres - Côte de la Floqueterie

avec : GALAND Christian, MORICE Patrick, BUISSON Daniel, BOIN Michel, THIERCERIN Odile & BOCK Benoît



Coléoptère : *Pyrochroa serraticornis*

Hyménoptère : nid de poliste (guêpe solitaire)



Gymnospermes

Juniperus communis L. subsp. **communis** [Cupressaceae]

Genévrier commun des plaines

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12343>

Pinus sylvestris L. [Pinaceae]

Pin sylvestre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7288>

Les vertus expectorantes, antiseptiques et calmantes des bourgeons sont utilisées en phytothérapie pour traiter les maladies des voies respiratoires telles que rhume, sinusite, laryngite, catarrhes bronchiques, grippe, affections pulmonaires chroniques.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - cône, aiguille, bourgeon, écorce, jeune pousse



Angiospermes Monocotylédones

Alopecurus myosuroides Huds. subsp. **myosuroides**

[Poaceae]

Vulpin des champs commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43236>

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. **R** [Orchidaceae]

Orchis pyramidale

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev [Poaceae]

Droue à grandes fleurs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8831>

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl

[Poaceae]

Fromental élevé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8654>

Avoine (arêtes dorsales), de grande taille (souvent plus de 1 m de haut), en touffe lâche. Grande panicule étroitement diffuse, portant de nombreux épillets blanchâtres d'environ 8 mm, à une seule fleur aristée. Lemme inf. portant une longue arête coudée presque à la base ; lemme sup. à arête subterminale souvent peu développée.

Parfois cultivée comme fourrage.

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. subsp.

rupestre [Poaceae]

Brachypode commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43302>

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. [Poaceae]

Brachypode des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6674>

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. **erecta** [Poaceae]

Brome-des-prés commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8832>

Vivace de 30 à 60 cm de haut, poussant en touffes, à feuilles de 2 sortes, les caulinaires larges et planes, les inférieures étroites et pliées, bordées de cils fins surtout visibles à contre-jour ; ce caractère permet toujours de reconnaître cette espèce qui est, par ailleurs très variable.

Bromus hordeaceus L. [Poaceae]

Brome mou au sens large

Carex flacca Schreb. subsp. **flacca** [Cyperaceae]

Carex glauque commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9014>

Rhizomateuse hétérostachyée de 30 à 60 cm de haut, à feuilles de 3 à 4 mm de large de couleur typiquement glauque et à épillets femelles brunâtres composés d'utricules arrondis et dépourvus de bec.

Carex leersii F.W.Schultz [Cyperaceae]

Carex de Leers

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5895>

Laiche homotachyée en touffes, avec des inflorescences allongées ($\leq 5,5$ cm) ; épillets à utricules longs de 3,4-4,2 mm ; épillets espacés sauf les supérieurs et espace entre les 2 épis inf. gén. ≤ 2 cm ; feuilles relativement rigides, dressées, vert jaunâtre ; écaille ♀ incolore à brun clair à maturité, gén. translucide sauf la nervure médiane. Ligule moins longue que large. Racines non rouges.

Carex spicata Huds. [Cyperaceae]

Carex en épi

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5977>

Laiche homotachyée assez grande (40 à 70 cm) poussant en touffes, sans stolons, et à feuilles larges de 2 à 4 mm et à ligule 2 à 3 fois plus longues que larges ; les inflorescences de 3 cm de long max. sont denses et ininterrompues, les épillets étant très rapprochés ; rhizomes à section violette.

Carex sylvatica Huds. subsp. **sylvatica** [Cyperaceae]

Carex des bois commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5979>

Cespitueuse hétérostachyée. Utricules brunâtres, longs de 4-5,5 mm, distinctement nervés, progressivement rétrécis en un bec long, étroit et bifide ; épis ♀ longuement pédonculés à pédoncule scabre, au moins l'épi inf. pendante ; feuilles larges de 3-6 (9) mm, vert clair.

Dactylis glomerata L. [Poaceae]

Dactyle aggloméré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6754>

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin [Dioscoreaceae]

Tamier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2577>

Festuca heterophylla Lam. subsp. **heterophylla** [Poaceae]

Fétuque hétérophylle

Fétuque de grande taille (pouvant dépasser 1 m), en touffes denses, bien caractérisée par son dimorphisme foliaire, les inférieures très fines et scabres souvent nombreuses, les caulinaires beaucoup plus larges.

Festuca marginata (Hack.) K.Richt. [Poaceae]

Fétuque marginée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10058>

Cette fétuque ovine est la mieux caractérisée par ses feuilles souvent glauque chez le type à section en V présente un sclérenchyme disposé en 3 îlots aux 3 extrémités du V. Les feuilles sont moins rigides et plus faciles à rompre que celles des autres taxons.

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. [Orchidaceae]

Orchis bouc

himanto = lanière / glossa = langue / hircin = bouc

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30162>

plante robuste (30 à 70 cm) à grandes feuilles et inflorescences denses ; les fleurs sont tout à fait particulières avec des labelles dont le lobe médian est très allongé (4 à 6 cm) d'abord enroulé puis étalé et spiralé ; de plus cette plante a une odeur très forte et désagréable.

Hordeum vulgare L. subsp. **vulgare** [Poaceae]

Orge commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12244>

Les orges à six rangs, dont l'épi est constitué de six rangs de grains autour du rachis, sont essentiellement des variétés d'hiver, donc semées en automne. Encore appelées escourgeons, elles présentent les rendements les plus élevés de toutes les orges et sont principalement destinées à l'alimentation animale.

Melica uniflora Retz. [Poaceae]

Mélique uniflore

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6999>

Miscanthus x giganteus J.M.Greef & Deuter ex Hodk. &

Renvoize [Poaceae]

Herbe-à-éléphant géante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=42917>

Muscari comosum (L.) Mill. [Asparagaceae]

Muscari à toupet

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6343>

Ophrys apifera Huds. [Orchidaceae]

Ophrys abeille

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6487>

Poa pratensis L. subsp. **pratensis** [Poaceae]

Paturin des prés commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31177>

Poa trivialis L. [Poaceae]

Paturin commun au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7097>

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. subsp. **flavescens**

[Poaceae]

Trisète jaunâtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7180>

Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco [Poaceae]

Avénule des prés au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6658>

Plante vivace pouvant atteindre 1 m de haut surtout caractérisée par ses feuilles inférieures et ses gaines longuement velues, à ses panicules allongées et brillantes et ses arrêtes à base aplatie

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. subsp. ***pyramidata***

[Poaceae]

Koélerie pyramidale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=42964>

Orchis purpurea Huds. [Orchidaceae]

Orchis pourpre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6547>



Angiospermes Dicotylédones

Betula pendula Roth [Betulaceae]

Bouleau verruqueux au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1325>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, écorce, bourgeon, sève - salicylate de méthyle à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés

Campanula rotundifolia L. subsp. ***rotundifolia***

[Campanulaceae]

Campanule à feuilles rondes commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1902>

Carpinus betulus L. [Betulaceae]

Charme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1328>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, bourgeon de feuille

Lathyrus pratensis L. [Fabaceae]

Gesse des prés

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2964>

Leontodon hispidus L. subsp. ***hispidus*** [Asteraceae]

Liondent commun

Leucanthemum vulgare Lam. [Asteraceae]

Marguerite Grande au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1047>

Linum catharticum L. [Linaceae]

Lin purgatif au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3757>

Pl. amère et purgative

Orobanche gracilis Sm. [Orobanchaceae]

Orobanche grêle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3978>

Parasite des Fabacées

Polygala calcarea F.W.Schultz [Polygalaceae]

Polygale du calcaire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4192>

Populus tremula L. [Salicaceae]

Peuplier tremble

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5131>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, bourgeon de feuille

Rosa micrantha Borrer ex Sm. [Rosaceae]

Rosier à petites fleurs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4878>

Sorbus aucuparia L. subsp. ***aucuparia*** [Rosaceae]

Sorbier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14568>



Insectes - Orthoptères

Nemobius sylvestris Bosc subsp. ***sylvestris*** []

Grillon des bois