

Liste des taxons notés le mercredi 12 juin 2024


Etat imprimé le 18 juin 2024 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)

mercredi 12 juin 2024

France - 27 : Mesnil sur l'Estrée - Du stade au coteau du moulin d'Auger

avec : GALAND Christian, HACHE Maxime, DAUNAY Patrick, BUISSON Daniel, BOIN Michel, MORICE Patrick & PETIT Alain



Lichens - Champignons

- **Agaricus augustus** Fr. [Agaricaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2204111>



Ptérédiphytes

- **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott [Dryopteridaceae]
Fougère-mâle commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7379>



Angiospermes Monocotylédones

- **Avenella flexuosa** (L.) Drejer subsp. **flexuosa** [Poaceae]
Canche flexueuse de Linné
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9782>
- **Carex leersii** F.W.Schultz [Cyperaceae]
Carex de Leers
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5895>
Laiche homotachyée en touffes, avec des inflorescences allongées ($\leq 5,5$ cm) ; épillets à utricules longs de 3,4-4,2 mm ; épillets espacés sauf les supérieurs et espace entre les 2 épis inf. gén. ≤ 2 cm ; feuilles relativement rigides, dressées, vert jaunâtre ; écaille ♀ incolore à brun clair à maturité, gén. translucide sauf la nervure médiane. Ligule moins longue que large. Racines non rouges.
- **Carex pilulifera** L. subsp. **pilulifera** [Cyperaceae]
Carex à pilules
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5960>
- **Carex spicata** Huds. [Cyperaceae]
Carex en épi
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5977>
Laiche homostachyée assez grande (40 à 70 cm) poussant en touffes denses (très difficile à arracher sans outil), sans stolons. Feuilles larges de 2 à 4 mm et à ligule 2 à 3 fois plus longues que larges terminée en pointe. Inflorescence de 2 à 5 cm de long, à épis denses et ininterrompus. Écailles des fleurs femelles vertes à larges bords membraneux teintés de brun. Utricule souvent de plus de 5 mm de long. Racines à intérieur rouge pourpre.
- **Dactylis glomerata** L. [Poaceae]
Dactyle aggloméré
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6754>
- **Festuca heterophylla** Lam. subsp. **heterophylla** [Poaceae]
Fétuque hétérophylle
Vivace grande taille (pouvant dépasser 1 m), en touffes denses, bien caractérisée par son dimorphisme foliaire, les nombreuses inférieures très fines et scabres, les quelques feuilles caulinaires beaucoup plus larges.
- **Holcus lanatus** L. subsp. **lanatus** [Poaceae]
Houlque laineuse
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=42958>

- **Luzula forsteri** (Sm.) DC. [Juncaceae]

Luzule de Forster
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6172>
Vivace de 20 à 40 cm de haut, à feuilles étroites (< 5 mm) à fleurs brunes, petites (5 mm), solitaires, disposées en panicules lâches à rameaux dressés étalés mais non refractés.

- **Melica uniflora** Retz. [Poaceae]

Mélique uniflore
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6999>



Angiospermes Dicotylédones

- **Acer campestre** L. [Sapindaceae]

Érable champêtre
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8522>
Arbuste en général peu élevé (moins de 5 m, sauf exception), à feuilles de taille moyenne (10 cm max.), à 5 lobes arrondis et profonds et à samares aux ailes disposées en ligne droite.
Vit jusqu'à 200 ans. Parfois, comme les ormes, les rameaux surdéveloppent une couche de liège. Peut être utilisé comme un bois d'œuvre et comme arbre d'ornement. Mais le faible largeur du tronc rend son bois rare.

- **Acer platanoides** L. subsp. **platanoides** [Sapindaceae]

Érable plane
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10>
Feuilles ressemblant à celles des platanes, mais d'un vert brillant sur les 2 faces avec des lobes et des sinus très aigus. Samares disposées à angle très ouvert. Floraison et bouquets dressés, à fleur jaune d'or avant les feuilles.
Vit jusqu'à 500 ans

- **Acer pseudoplatanus** L. f. **pseudoplatanus** [Sapindaceae]

Érable sycomore commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=32061>

- **Achillea millefolium** L. subsp. **millefolium** [Asteraceae]

Achillée millefeuille
Composée vivace, odorante, rampante (pouvant former des colonies très denses et étendues), à fleurs blanches ou rosées et à feuilles longues, étroites et finement divisées.
Plante médicinale astringente permettant de stopper les hémorragies. En infusion elle réduit les spasmes digestifs et utérins, et est aussi anti-inflammatoire. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - thuyone (alpha et bêta), camphre, eucalyptol à surveiller

- **Ailanthus altissima** (Mill.) Swingle [Simaroubaceae]

Ailante glanduleux
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5537>
Nourrit un Bombyx à soie. Le père jésuite Pierre d'Incarville a expédié de Chine des plants d'Ailante au Chelsea Physic Garden de Londres en 1751 et vers 1760 au Jardin Botanique de Padoue en Italie. La culture de cet arbre comme plante ornementale s'est diffusée pendant la seconde moitié du 18ème siècle, et rapidement, il s'est acclimaté et propagé dans l'Europe entière où il est considéré maintenant comme invasif !

- **Alliaria petiolata** (M.Bieb.) Cavara & Grande [Brassicaceae]

Alliaire officinale
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1468>
Grande plante (jusqu'à 1 m de haut), à légère odeur d'ail, à feuilles longuement pétiolées, cordiformes et dentées et à fleurs blanches.
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

- **Anthriscus sylvestris** (L.) Hoffm. subsp. **sylvestris** var. **sylvestris** [Apiaceae]

Cerfeuil des prés commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=84>
Plante de grande taille (jusqu'à 1 m), assez polymorphe, à feuilles amples et divisées, dépassant largement 20 cm

- **Artemisia vulgaris** L. [Asteraceae]

Armoise commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=459>
Grande composée en touffe dépassant facilement 1 m de haut, reconnaissable à ses feuilles dont les folioles sont profondément dentées, blanchâtres dessous à son odeur faible et désagréable, à ses inflorescences rameuses très amples et à ses souches non ou très brièvement stolonifères.
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fleur, tige - thuyones, eucalyptol, camphre à surveiller - L'huile essentielle de cette plante est interdite.

- **Carpinus betulus** L. [Betulaceae]

Charme commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1328>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, bourgeon de feuille

■ **Castanea sativa** Mill. [Fagaceae]

Châtaignier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3279>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - bourgeon de feuille, feuille, fleur, tige, graine, écorce

■ **Cerastium fontanum** subsp. **vulgare** (Hartm.) Greuter & Burdet [Caryophyllaceae]

Céraiste commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2022>

Céraiste vivace à fleurs dont les pétales ne sont pas plus longs que les sépales et à feuilles ovales-lancéolées.

■ **Chelidonium majus** L. subsp. **majus** f. **majus**

[Papaveraceae]

Chélidoine Grande de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9311>

■ **Cirsium vulgare** (Savi) Ten. [Asteraceae]

Cirse commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=691>

Les jeunes pousses sont comestibles plutôt cuites

■ **Clematis vitalba** L. [Ranunculaceae]

Clématite des haies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4436>

■ **Conium maculatum** L. [Apiaceae]

Ciguë Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=144>

Bisannuelle élevée (jusqu'à 2 m), à grosses tiges tachées de rouge, à feuilles très amples, plusieurs fois divisées; à fleurs blanches et à petits fruits (2 mm max.) globuleux, munis de côtes formant des ailes ondulées.

Très toxique, elle était à la base du poison officiel des Athéniens, pour les condamnés à mort dont Socrate est le plus connu.

■ **Crataegus monogyna** Jacq. var. **monogyna** [Rosaceae]

Aubépine monogyne commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9590>

■ **Daucus carota** L. subsp. **carota** var. **carota** [Apiaceae]

Carotte commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=37131>

■ **Dianthus armeria** L. subsp. **armeria** [Caryophyllaceae]

Cillet armérie

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2043>

■ **Digitalis purpurea** L. subsp. **purpurea** [Plantaginaceae]

Digitale pourpre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30976>

Plante extrêmement toxique (10 g de feuilles sèches et 40 g de feuilles fraîches sont mortels pour l'homme) dont on extrait la digitaline ou digitoxine qui sont des glycosides cardiotoniques utilisés dans le traitement de la tachycardie et de l'arythmie cardiaque.

■ **Euonymus europaeus** L. [Celastraceae]

Fusain d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2298>

En raison de sa toxicité naturelle, le Fusain résiste à la plupart des phytophages. Il est cependant régulièrement victime des chenilles d'un petit papillon : Yponomeuta evonymella, l'hypnomete du fusain.

■ **Fraxinus excelsior** L. subsp. **excelsior** var. **excelsior**

[Oleaceae]

Frêne élevé de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30618>

Diurétique, hypotensive, antirhumatismal, antilithiasique.

■ **Galeopsis tetrahit** L. [Lamiaceae]

Galéopsis tétrahit

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3546>

■ **Galium aparine** L. subsp. **aparine** [Rubiaceae]

Gaillet gratteron

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10168>

■ **Geranium dissectum** L. [Geraniaceae]

Géranium découpé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3420>

Annuelle de 20 à 40 cm de haut, surtout reconnaissable à ses feuilles découpées en lanières longues et étroites, ses fleurs rose vif à pétales dépassant peu les sépales, sur des pédoncules généralement plus courts que les feuilles. Pétiole à poils rétrorses, non glanduleux de plus de 1 mm de long.

■ **Geranium lucidum** L. [Geraniaceae]

Géranium luisant

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3425>

Annuelle glabre à feuilles peu découpées, de forme arrondie, d'un vert brillant caractéristique. Fleurs rose vif dont les calices présentent 5 angles saillants.

■ **Geranium robertianum** L. [Geraniaceae]

Géranium herbe-à-Robert

Au Moyen-Age, la plante aurait été nommée Herba-Ruperti, en l'honneur de St-Robert, 1er évêque de Salzbourg (VIII^e siècle; fête le 27 mars), qui en aurait enseigné les propriétés thérapeutiques. mais aussi peut-être du latin ruber. rouge <http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3435>

Plante annuelle à limbe foliaire à contour triangulaire-pentagonal, peu luisant, à 3-6 segments bipennés, pétiolulés ou subsessiles. Fleur à pétales dépassant 1 cm, plus longs que les sépales, d'un rose plus ou moins clair et à anthères de couleur orangée de plus de 0,4 mm.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ **Geranium rotundifolium** L. [Geraniaceae]

Géranium mauvin

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3438>

Plante annuelle assez basse (10 à 30 cm), à feuilles à contour circulaire peu profondément divisées souvent munies d'une tache rouge à l'échancrure des sinus et à fleurs à pétales arrondis, entiers, roses plus pâles à leur base. Tige et pétiole munis de poils terminés par une glande rouge et de quelques poils non glanduleux plus longs.

■ **Geum urbanum** L. [Rosaceae]

Benoîte commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4758>

La racine séchée a longtemps été utilisée pour ses propriétés, en remplacement du clou de girofle dont elle a d'ailleurs l'odeur.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ **Hedera helix** L. subsp. **helix** f. **helix** [Araliaceae]

Lierre commun grimpat

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10318>

■ **Heracleum sphondylium** L. [Apiaceae]

Berce sphondyle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=187>

■ **Hypochaeris radicata** L. [Asteraceae]

Porcelle commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=967>

Vivace à latex à feuilles exclusivement en rosette basales presque entières, à face inférieure non entièrement glabre. Tiges ramifiées dès le milieu, munies de nombreuses feuilles avortées. Capitule à paillettes. Fleurs à ligules jaunes supérieures à 8 mm de long, dépassant l'involucre d'au moins 4 mm. Bractées involucreales disposées sur 3 à 4 rangs, nettement croissantes de l'extérieur vers l'intérieur. Akènes avec bec et pappus de 2 rangs de soies plumeuses. (Confusions possibles avec H. glabra)

■ **Ilex aquifolium** L. [Aquifoliaceae]

Houx d'Europe

de folium, feuille et acus, aiguille

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=326>

■ **Jacobaea vulgaris** Gaertn. subsp. **vulgaris** [Asteraceae]

Sèneçon jacobée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14453>

■ **Lactuca virosa** L. [Asteraceae]

Laitue vireuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=996>

Le latex au goût amer et à odeur forte possède des propriétés comparables à celui des opiacés. Il a été utilisé comme opium dans médecine traditionnelle et jusqu'au début du 20^e siècle dans les pharmacopées de plusieurs pays pour son activité analgésique entre autres.

■ **Lapsana communis** L. subsp. **communis** [Asteraceae]

Lapsane commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12391>

Excellente salade sauvage

■ **Ligustrum vulgare** L. [Oleaceae]

Troène commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3955>

■ **Linaria vulgaris** Mill. [Plantaginaceae]

Linaire commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5377>

■ **Lonicera periclymenum** L. subsp. **periclymenum**

[Caprifoliaceae]

Chèvrefeuille des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30219>

Liane de 1 à 2 m, à feuilles caduques, elliptiques à lancéolées, atténuées et non soudées à la base, glabres, glauques dessous, les inf. brièvement pétiolées, les sup. sessiles, longues de 4-10 cm. Fleurs d'un blanc jaunâtre, odorantes, verticillées en têtes terminales longuement pédonculées.

■ **Moehringia trinervia** (L.) Clairv. [Caryophyllaceae]

Arénaire à trois nervures

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2136>

Annuelle à feuilles à 3 nervures, ciliées sur les bords. Fleurs à sépales acuminés, à 3 nervures, et à pétales absents ou moins de la moitié des sépales. Capsules plus courtes que le calice sur les pédoncules recourbés.

■ **Picris hieracioides** L. [Asteraceae]

Picris fausse-épipervière

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1102>

■ ***Pilosella officinarum*** Vaill. [Asteraceae]

Piloselle officinale
des offices

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=939>

Plante vivace peu élevée (30 cm max.) en colonnie, à feuilles toutes à la base, blanches tomenteuses en dessous, et avec de longs poils blancs sur les marges. Stolons pouvant atteindre 20 cm, munis de feuilles de taille décroissante. Capitule à fleurs jaune citron, souvent teintées de rouge à l'extérieur, isolé au sommet des tiges.

Plante télétoxique, libérant dans le sol des produits toxiques pour les autres plantes. Sa rosette de feuilles comestible crue était séchée et utilisée comme remède contre les affections respiratoires (asthme, bronchite), les problèmes de foie et d'estomac. Elle était également utilisée en cataplasme contre les ecchymoses. Propriétés : anti-infectieuse, détoxifiante, astringente, cholagogue, apéritive, dépurative, vulnéraire, détersive et diurétique. Ses feuilles servent de nourriture à la chenille du papillon de nuit, la Fidonie du Pin.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ ***Quercus petraea*** (Matt.) Liebl. subsp. ***petraea***
[Fagaceae]

Chêne sessile

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13628>

■ ***Rabelera holostea*** (L.) M.T.Sharpley & E.A.Tripp []

Grande-Stellaire holostée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14627>

■ ***Robinia pseudoacacia*** L. [Fabaceae]

Robinier faux-acacia

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3124>

Le genre a été dédié par Linné à Jean Robin (1550-1629), jardinier du roi Henri IV, ainsi qu'à son fils Vespasien Robin. Jean Robin a introduit *Robinia pseudoacacia* en France en 1601, à partir de graines nord-américaines récoltées dans les Appalaches, qui lui avaient été offertes par le botaniste anglais John Tradescant l'ancien. Le robinier du square René-Viviani, dans le 5e arrondissement de Paris, juste en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris, aurait été semé en 1601 ou 1602 par Jean Robin (Peabody, 1982). C'est le plus vieux arbre de la capitale.

Occasionne des intoxications parfois graves chez les chevaux, en particulier lors d'ingestion de plante en fruits, les graines concentrant les produits toxiques de ces plantes. Les symptômes sont des nausées, des diarrhées, une irritation, une mydriase et, dans les cas les plus sévères, une insuffisance respiratoire aiguë allant jusqu'à la mort. En revanche les fleurs sont comestibles (beignés, gâteaux, ...)

■ ***Rosa arvensis*** Huds. [Rosaceae]

Rosier rampant

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4861>

■ ***Rumex obtusifolius*** L. [Polygonaceae]

Oseille parelle

■ ***Rumex sanguineus*** var. ***viridis*** (Sibth.) W.D.J.Koch
[Polygonaceae]

Oseille sanguine des bois

Variété des bois à nervures vertes

■ ***Sambucus nigra*** L. [Viburnaceae]

Sureau noir

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1968>

C'est le vrai sureau, arbuste ou petit arbre avec de grands corymbes de fleurs blanches très odorantes à anthères jaunes fleurissant en fin de printemps, des feuilles à 5 folioles et des rameaux ligneux à moelle aérée.

Les fleurs et les fruits cuits sont comestibles. Crus les fruits sont laxatifs. Plante médicinale.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur, fruit mûr, feuille

■ ***Sedum rupestre*** L. [Crassulaceae]

Orpin rupestre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14426>

■ ***Senecio sylvaticus*** L. [Asteraceae]

Sèneçon des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1200>

■ ***Silene nutans*** L. [Caryophyllaceae]

Silene penché au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14528>

Vivace assez élevée (jusqu'à 1 m de haut), souvent un peu ligneuse à la base, à feuilles velues grisâtres et à fleurs à pétales profondément bifides variant du blanc verdâtre au rose et au brunâtre, penchées et disposées en inflorescences ramifiées (et carpophores plus courts que les capsules).

■ ***Solanum dulcamara*** L. var. ***dulcamara*** [Solanaceae]

Morelle douce-amère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31164>

■ ***Sonchus asper*** (L.) Hill subsp. ***asper*** [Asteraceae]

Laiteron rude

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1228>

■ ***Sonchus oleraceus*** L. [Asteraceae]

Laiteron maraîcher

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1232>

■ ***Spergula rubra*** (L.) D.Dietr. [Caryophyllaceae]

Spergulaire commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2280>

■ ***Stellaria graminea*** L. [Caryophyllaceae]

Stellaire graminée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2286>

■ ***Stellaria media*** (L.) Vill. [Caryophyllaceae]

Stellaire intermédiaire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30388>

Petite plante annuelle à 5 pétales blancs bifides (donc paraissant 10). Possède la particularité d'avoir une ligne de poils sur les entrenœuds changeant de côté d'une paire de feuilles à l'autre.

Les jeunes pousses, récoltées toute l'année, se consomment en salade, leur saveur douce rappelle celle des noisettes. Le mouron des oiseaux peut être ajouté à une salade composée printanière avec le lamier tacheté, le plantain, le laiteron... On peut aussi les cuire en potage avec d'autres légumes. Attention à ne pas confondre avec *Lysimachia arvensis* aussi appelé mouron, mais toxique.

■ ***Teucrium scorodonia*** L. [Lamiaceae]

Germandrée scorodaine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30402>

■ ***Tilia platyphyllos*** Scop. [Malvaceae]

Tilleul à grandes feuilles

Les graines sont comestibles. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fleur, écorce, aubier

■ ***Torilis arvensis*** (Huds.) Link [Apiaceae]

Torilis des champs au sens très large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14807>

Annuelle de taille très variable, à ombelles terminales longuement pédonculées et dépourvues d'involucres (parfois 1 ou 2 bractées) et à fruits sans côtes, couverts d'aiguillons terminés par une couronne de crochets (forte loupe !). Tige à partie inférieure glabre.

■ ***Trifolium dubium*** Sibth. [Fabaceae]

Trèfle douteux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3152>

Annuelle à tige couchée, rameuse. Folioles ne dépassant pas 1 cm de long, généralement toutes pétiolulées, la terminale la plus grande et à pétiolule plus long. Stipules largement ovales. Pédicelles plus courts que le tube calicinal. Fleurs jaune clair, longues de 3,5 à 4 mm, devenant brunâtres à la fructification (les corolles sèches sans tomber) ; étendard plié-caréné, à peine strié, à bord ± entier. Inflorescence large seulement de 0,5 à 1 cm, à 3-15 fleurs. Attention à ne pas confondre avec *Medicago lupulina* (à fleurs jaune citron et à corolle caduque à maturité).

■ ***Ulmus minor*** Mill. [Ulmaceae]

Orme champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14872>

■ ***Urtica dioica*** L. [Urticaceae]

Ortie Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14875>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, racine - L'étiquetage des compléments alimentaires contenant les parties souterraines de cette plante doit comporter une mention recommandant de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé ("Demander l'avis de votre médecin et /ou pharmacien").

■ ***Veronica chamaedrys*** L. [Plantaginaceae]

Véronique petit-chêne au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30423>

■ ***Veronica officinalis*** L. [Plantaginaceae]

Véronique officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5517>

Elle a des propriétés astringentes, eupeptiques et cicatrisantes. La présence d'aucuboside, un anti-inflammatoire, contribue à soigner l'arthrose. La véronique combat aussi l'artériosclérose et a un effet antioxydant qui aide à combattre le diabète ; elle protège le foie, pour lequel elle est citée en conjonction avec d'autres plantes (pissenlit, chicorée, aspérule) par l'herboriste renommée Maria Treben qui la cite également pour l'excès de cholestérol, les blessures enflammées à cicatrisation difficile, l'eczéma chronique (avec l'ortie), les vieilles bronchites, la jaunisse, les affections de la rate, les troubles intestinaux, la nervosité issue de surmenage intellectuel et les vertiges. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Vicia sepium*** L. [Fabaceae]

Vesce des haies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3266>

Mellifère

■ ***Viola odorata*** L. [Violaceae]

Violettes odorante au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5746>


Plante médicinale et comestible (fleurs et feuilles).

 **Insectes - Orthoptères**

■ ***Nemobius sylvestris*** Bosc subsp. ***sylvestris*** []

Grillon des bois

France - 27 : Muzy - Coteau du moulin d'Auger
avec : GALAND Christian, HACHE Maxime, DAUNAY Patrick,
BUISSON Daniel, BOIN Michel, MORICE Patrick & PETIT Alain



Lichens - Champignons

- *Panaeolus antillarum* (Fr. : Fr.) Morgan [Bolbitiaceae]



Gymnospermes

- *Juniperus communis* L. subsp. *communis* [Cupressaceae]

Genévrier commun des plaines

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12343>

- *Pinus nigra* J.F.Arnold [Pinaceae]

Pin noir

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7281>

- *Pinus sylvestris* L. [Pinaceae]

Pin sylvestre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7288>

Les vertus expectorantes, antiseptiques et calmantes des bourgeons sont utilisées en phytothérapie pour traiter les maladies des voies respiratoires telles que rhume, sinusite, laryngite, catarrhes bronchiques, grippe, affections pulmonaires chroniques.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - cône, aiguille, bourgeon, écorce, jeune pousse



Angiospermes Monocotylédones

- *Arum maculatum* L. [Araceae]

Arum tacheté

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5843>

Feuilles souvent tachées de noir et spadices normalement violacés, en forme de massue, porté sur un pédoncule.

Baies toxiques, Pl. vésicante, détersive et révolutive. Floraison protogyne. La massue est capable de thermogénèse (pic en soirée du jour de l'ouverture de la spathe) favorisant la dispersion des odeurs attirant les insectes pollinisateurs, dont le diptère *Psychoda phalaenoides*.

- *Brachypodium rupestre* (Host) Roem. & Schult. subsp. *rupestre* [Poaceae]

Brachypode commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43302>

- *Briza media* L. subsp. *media* [Poaceae]

Amourette des prés

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8828>

- *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr. subsp. *erecta* [Poaceae]

Brome-des-prés commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8832>

Vivace de 30 à 60 cm de haut, poussant en touffes, à feuilles de 2 sortes, les caulinaires larges et planes, les inférieures étroites et pliées, bordées de cils fins surtout visibles à contre-jour ; ce caractère permet toujours de reconnaître cette espèce qui est, par ailleurs très variable.

- *Carex flacca* Schreb. subsp. *flacca* [Cyperaceae]

Carex glauque commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9014>

Rhizomateuse hétérostachyée de 30 à 60 cm de haut, à feuilles de 3 à 4 mm de large de couleur typiquement glauque et à épillets femelles brunâtres composés d'utricules arrondis et dépourvus de bec.

- *Festuca marginata* (Hack.) K.Richt. [Poaceae]

Fétuque marginée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10058>

Cette fétuque ovine est la mieux caractérisée par ses feuilles souvent glauque chez le type à section en V présente un sclérenchyme disposé en 3 îlots aux 3 extrémités du V. Les feuilles sont moins rigides et plus faciles à rompre que celles des autres taxons.

- *Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco subsp. *pratensis* [Poaceae]

Avénule des prés

Plante vivace cespitueuse pouvant atteindre 1 m de haut surtout caractérisée par ses feuilles inférieures planes, ses gaines glabres, à ses panicules allongées et brillantes et ses arrêtes dorsales à base aplatie (qui donc une fois arrachées roulent très mal entre 2 doigts). Glumes atteignant au moins les deux tiers de la longueur des fleurs à lemnes jamais anthocyanées dans leur quart basal. Feuille caulinaire courte, glauque et terminée en carène, dressée contre la tige, à longue ligule triangulaire.

- *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [Orchidaceae]

Orchis bouc

himanto = lanière / glossa = langue / hircin = bouc

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30162>

plante robuste (30 à 70 cm) à grandes feuilles et inflorescences denses ; les fleurs sont tout à fait particulières avec des labelles dont le lobe médian est très allongé (4 à 6 cm) d'abord enroulé puis étalé et spiralé ; de plus cette plante a une odeur très forte et désagréable.

- *Koeleria pyramidata* (Lam.) P.Beauv. subsp. *pyramidata* [Poaceae]

Koélerie pyramidale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=42964>

- *Ophrys fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench subsp. *fuciflora* [Orchidaceae]

Orchis bourdon précoce

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12844>

- *Orchis purpurea* Huds. [Orchidaceae]

Orchis pourpre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6547>

- *Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. [Orchidaceae]

Platanthère verdâtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30287>

- *Trisetum flavescens* (L.) P.Beauv. subsp. *flavescens* [Poaceae]

Triseté jaunâtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7180>



Angiospermes Dicotylédones

- *Arenaria serpyllifolia* L. var. *serpyllifolia* [Caryophyllaceae]

Arénaire à feuilles de serpolet de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1994>

- *Asperula cynanchica* L. [Rubiaceae]

Herbe-à-l'esquinancie commune au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8683>

- *Bellis perennis* L. [Asteraceae]

Pâquerette vivace

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=493>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - inflorescences

- *Campanula rapunculus* L. [Campanulaceae]

Campanule raiponce

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30003>

- *Centaurea scabiosa* L. subsp. *scabiosa* [Asteraceae]

Centaurée scabieuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9194>

- *Cirsium acaulon* (L.) Scop. [Asteraceae]

Cirse acaule

A = privatif et CAUL = tige. En effet le capitule apparaît au raz du sol.

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30045>

- *Corylus avellana* L. var. *avellana* f. *avellana* [Betulaceae]

Noisetier commun sauvage

- *Eryngium campestre* L. [Apiaceae]

Panicaut champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=172>

On mangeait autrefois sa racine qui passe pour diurétique, apéritive, emménagogue. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - racine, jeune feuille, jeune pousse, foliole séchée - furocoumarines, polyines à surveiller

■ ***Euphorbia amygdaloides*** L. subsp. ***amygdaloides*** [Euphorbiaceae]

Euphorbe des bois
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2682>

■ ***Galium album*** Mill. [Rubiaceae]

Gaillet blanc
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5058>

■ ***Galium verum*** L. subsp. ***verum*** f. ***verum*** [Rubiaceae]

Gaillet jaune commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10196>

■ ***Helianthemum nummularium*** (L.) Mill. [Cistaceae]

Héliantheme nummulaire
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2430>

■ ***Helleborus foetidus*** L. [Ranunculaceae]

Hellébore fétide
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4455>

■ ***Hippocrepis comosa*** L. [Fabaceae]

Hippocrépis à toupet
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2929>

■ ***Hypericum perforatum*** L. [Hypericaceae]

Millepertuis commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3494>

■ ***Lathyrus pratensis*** L. [Fabaceae]

Gesse des prés
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2964>

■ ***Lathyrus sylvestris*** L. subsp. ***sylvestris*** [Fabaceae]

Gesse Grande commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12414>

■ ***Leontodon hispidus*** L. [Asteraceae]

Liondent commun au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1006>

■ ***Linum catharticum*** L. [Linaceae]

Lin purgatif au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3757>
Pl. amère et purgative

■ ***Linum tenuifolium*** L. [Linaceae]

Lin à feuilles fines
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3771>

■ ***Lonicera xylosteum*** L. [Caprifoliaceae]

Chèvrefeuille des haies
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1966>
Arbrisseau de 1 à 2 m, buissonnant (non grimpant), à rameaux fins munis de feuilles caduques, opposées, molles et densément velues, à fleurs jaunâtres géminées et à baies rouges à peine soudées par deux à leur base.

■ ***Lotus corniculatus*** L. subsp. ***corniculatus*** [Fabaceae]

Lotier corniculé
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12547>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - partie aérienne fleurie, jeune fruit, racine - hétérosides cyanogènes à surveiller

■ ***Malus sp.*** [Rosaceae]

Pommier

■ ***Medicago lupulina*** L. var. ***lupulina*** [Fabaceae]

Luzerne lupuline de Linné
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12634>

■ ***Melittis melissophyllum*** L. subsp. ***melissophyllum*** [Lamiaceae]

Mélitte à feuilles de mélisse
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3583>

■ ***Mercurialis perennis*** L. [Euphorbiaceae]

Mercuriale vivace
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2756>

■ ***Ononis pusilla*** L. subsp. ***pusilla*** [Fabaceae]

Bugrane fluette
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=45309>

■ ***Ononis spinosa*** subsp. ***procurrens*** (Wallr.) Briq. [Fabaceae]

Bugrane rampante
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3096>
Sous-espèce la plus courante, peu ou pas épineuse à tiges nettement traçantes

■ ***Onopordum acanthium*** L. subsp. ***acanthium*** [Asteraceae]

Onopordon commun de Linné
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12817>

■ ***Origanum vulgare*** L. subsp. ***vulgare*** [Lamiaceae]

Origan commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13115>
Plante aromatique. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, mais carvacrol à surveiller

■ ***Pentanema squarrosus*** (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort. [Asteraceae]

Inule conyze
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=973>

■ ***Pimpinella saxifraga*** L. subsp. ***saxifraga*** [Apiaceae]

Pimpinelle Petite saxifrage

■ ***Plantago media*** L. subsp. ***media*** [Plantaginaceae]

Plantain intermédiaire de Linné

■ ***Polygala vulgaris*** L. [Polygalaceae]

Polygale commun au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4207>

■ ***Poterium sanguisorba*** L. [Rosaceae]

Pimprenelle Petite
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4976>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Prunus mahaleb*** L. [Rosaceae]

Cerisier de sainte-Lucie
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4842>

■ ***Pulmonaria longifolia*** (Bastard) Boreau subsp. ***longifolia*** [Boraginaceae]

Pulmonaire à feuilles très allongées
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13579>

■ ***Pyrus communis*** L. [Rosaceae]

Poirier commun au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4852>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit

■ ***Ranunculus bulbosus*** L. [Ranunculaceae]

Renoncule bulbeuse
Vivace de 20 à 40 cm de haut, à tiges généralement renflées en bulbes à la base (sauf infrataxons), à feuilles velues, divisées en 3 lobes et à fleurs d'un jaune d'or dont les sépales velus sont fortement rabattus sur les pédoncules sillonnés. Peut-être confondue avec *R. sardous* dont elle se distingue par des akènes à faces lisses non tuberculées.

■ ***Reseda lutea*** L. subsp. ***lutea*** var. ***lutea*** [Resedaceae]

Réséda jaune de Linné

■ ***Rosa micrantha*** Borrer ex Sm. [Rosaceae]

Rosier à petites fleurs
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4878>

■ ***Rubia peregrina*** L. subsp. ***peregrina*** [Rubiaceae]

Garance voyageuse
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13967>

■ ***Scabiosa columbaria*** L. subsp. ***columbaria*** [Caprifoliaceae]

Scabieuse colombarie commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14372>

■ ***Seseli montanum*** L. subsp. ***montanum*** [Apiaceae]

Séséli des montagnes
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=292>

■ ***Sisymbrium officinale*** (L.) Scop. [Brassicaceae]

Sisymbre officinal
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14546>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Stachys recta*** L. [Lamiaceae]

Épiaire droite

■ ***Teucrium montanum*** L. [Lamiaceae]

Germandrée des montagnes
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3715>

■ ***Thesium humifusum*** DC. [Santalaceae]

Thésium couché au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=36301>
Hémiparasite

■ ***Thymus praecox*** Opiz [Lamiaceae]

Thym précoce

■ ***Tragopogon pratensis*** L. [Asteraceae]

Salsifis des prés

La racine en poudre était utilisée en médecine traditionnelle pour traiter les problèmes rénaux, les maladies de la peau et comme expectorant. Les racines, pousses et bourgeons peuvent être consommés cuits ou en salade et la racine torréfiée en remplacement du café.

■ ***Ulex europaeus*** L. subsp. ***europaeus*** var. ***europaeus***
[Fabaceae]

Ajonc d'Europe commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31174>

■ ***Veronica arvensis*** L. [Plantaginaceae]

Véronique des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5496>

■ ***Vicia cracca*** L. [Fabaceae]

Vesce craque

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14901>

Plante à tiges souples, ascendantes ou plus ou moins grimpantes, non zigzagantes aux noeuds, simples ou peu ramifiées ; à pilosité très variable ; feuilles à 6 à 15 paires de folioles, à stipules semi-hastées et folioles oblongues, généralement velues dessus ; fleurs de 8 à 12 mm, bleutées ou violettes à limbe de l'étendard égalant ou dépassant l'onglet disposées en longues grappes à pédoncule supérieur à 20% de la feuille adjacente et la dépassant peu (jusqu'à 1 fois et demi en fin de floraison). Gousses glabres, de 1 à 2,5 cm, brunes à maturité. mellifère, fourragère

■ ***Vicia segetalis*** Thuill. [Fabaceae]

Vesce des moissons

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7701>

■ ***Viola hirta*** L. [Violaceae]

Violette hérissée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5736>

myrmécochorie

■ ***Viola riviniana*** Rchb. [Violaceae]

Violette de Rivinus

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14920>



Oiseaux

■ ***Dryocopus martius*** [Picidae]

Pic noir

■ ***Erithacus rubecula*** [Muscicapidae]

Rougegorge familier

■ ***Phylloscopus collybita*** [Sylviidae]

Pouillot véloce



Reptiles

■ ***Anguis fragilis*** Linnaeus [Anguidae]

Orvet fragile

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13000208>



Insectes - Lépidoptères

Melanargia galathea Linnaeus []

Le Demi-Deuil

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001783>

Pieris brassicae Linnaeus []

La Piéride du Chou



Insectes - Orthoptères

Gryllus campestris Linnaeus []



Insectes - Odonates

Calopteryx splendens Harris []

Caloptéryx éclatant

Platycnemis latipes Rambur []

Agrion blanchâtre