

# Sortie SBCO (groupe drouais) du mardi 1er octobre 2024

Etat imprimé le 10 octobre 2024 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)

**mardi 1 octobre 2024**

## France - 78 : Condé sur Vesgre - Chemin du carefour des Barillets

avec : BUISSON Daniel, GALAND Christian, MORICE Patrick, VINGERE Hervé, GOJARD Laurent & BOCK Benoît



### ■ *Goodyera repens* (L.) R.Br. [Orchidaceae]

Goodyère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6466>

### ■ *Coprinus comatus* (O.F.Müller : Fr.) Pers. [Psathyrellaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2207490>

### ■ *Agrimonia procera* Wallr. [Rosaceae]

Aigremoine odorante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4631>

Grande rosacée (jusqu'à 1 m de haut) vivace à tige munie uniquement de poils longs (dans le haut) mêlés de poils glanduleux, à feuilles divisées en folioles séparées à odeur de pomme (glandes jaunes collées à la face inférieure des f.), à fleurs jaunes en longues grappes, et à curieux fruits surmontés de nombreux crochets à son extrémité et à hypanthium plus court que les crochets et sillonné sur au plus la moitié de leur longueur.

### ■ *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth subsp. *epigejos* [Poaceae]

Calamagrostis commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30538>

### ■ *Pinus sylvestris* L. [Pinaceae]

Pin sylvestre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7288>

Les vertus expectorantes, antiseptiques et calmantes des bourgeons sont utilisées en phytothérapie pour traiter les maladies des voies respiratoires telles que rhume, sinusite, laryngite, catarrhes bronchiques, grippe, affections pulmonaires chroniques.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - cône, aiguille, bourgeon, écorce, jeune pousse

### ■ *Mentha suaveolens* Ehrh. subsp. *suaveolens* [Lamiaceae]

Menthe suave commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12664>

### ■ *Peucedanum gallicum* Latourr. [Apiaceae]

Peucedan de France

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=247>

### ■ *Erica cinerea* L. [Ericaceae]

Bruyère cendrée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2657>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur, sommité fleurie

### ■ *Ulex europaeus* L. subsp. *europaeus* var. *europaeus* [Fabaceae]

Ajonc d'Europe commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31174>

### ■ *Prunella vulgaris* L. subsp. *vulgaris* [Lamiaceae]

Brunelle commune de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3630>

### ■ *Crataegus monogyna* Jacq. var. *monogyna* [Rosaceae]

Aubépine monogyne commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9590>

### ■ *Prunus serotina* Ehrh. [Rosaceae]

Padier tardif

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, écorce

### ■ *Ulex minor* Roth [Fabaceae]

Ajonc nain

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3224>

### *Hebeloma* sp. [Hymenogasteraceae]

Hébélome

### ■ *Carex hirta* L. [Cyperaceae]

Carex hérissé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5919>

### ■ *Epipactis helleborine* (L.) Crantz subsp. *helleborine* [Orchidaceae]

Épipactis helleborine majeur

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6450>

### ■ *Amanita muscaria* (L.: Fr.) Lamarck [Amanitaceae]

Amanite tue-mouche

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209286>

### ■ *Betula pubescens* Ehrh. [Betulaceae]

Bouleau pubescent

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8774>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fleur, bourgeon, écorce - salicylate de méthyle à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés

### ■ *Scleroderma citrinum* Pers. : Pers. [Sclerodermataceae]

Scléroderme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209923>

### ■ *Lactarius torminosus* (J.C.Sch. : Fr.) Pers. [Russulaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213476>

### ■ *Amanita citrina* (J.C.Sch.) Pers. [Amanitaceae]

Amanite citrine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209223>

En forêts. Chapeau jaune citron clair (parfois blanche) avec présence de plaques de voile concolores ou plus brunes. Stipe à bulbe nettement marginé. Forte odeur, de pomme de terre crue. Spores globuleuses ou presque, 7,5-9,5 µm.

### ■ *Imleria badia* (Fr. : Fr.) Vizzini [Boletaceae]

Bolet bai

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209773>

### ■ *Inocybe sublilacina* Matheny & A.Voitk [Inocybaceae]

### ■ *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen : Fr.) R.Maire [Hygrophoropsidaceae]

Fausse girolle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209853>

### ■ *Russula ochroleuca* Pers. [Russulaceae]

Russule ocre et blanche

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213854>

### ■ *Leccinum brunneogriseolum* Lannoy & Estades [Boletaceae]

Bolet rude gris-brun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209706>

Bolet à mèches sur le pied à chapeau grisâtre et base du pied légèrement bleue. Vit sous bouleaux.

### ■ *Laccaria laccata* (Scop. : Fr.) Cooke [Hydnangiaceae]

Laccaire laqué

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211088>

### ■ *Pseudoscleropodium purum* (Hedw.) M.Fleisch. [Brachytheciaceae]

■ ***Calocera viscosa*** (Pers. : Fr.) Fr. [Dacrymycetaceae]

Calocère visqueuse  
kalo = beau, keras = corne  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2210140>

■ ***Mentha aquatica*** L. [Lamiaceae]

Menthe aquatique  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3584>

■ ***Lycogala epidendrum*** (L.) Fr. [Reticulariaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-4000627>

■ ***Russula cyanoxantha*** (J.C.Sch.) Fr. [Russulaceae]

Russule charbonnière  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213649>

■ ***Tylopilus felleus*** (Bull. : Fr.) P.Karsten [Boletaceae]

■ ***Postia tephroleuca*** (Fr.:Fr.) Jülich [Fomitopsidaceae]

Polypore souris

■ ***Succisa pratensis*** Moench [Caprifoliaceae]

Succise des prés  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2624>

■ ***Molinia caerulea*** (L.) Moench subsp. ***caerulea*** [Poaceae]

Molinie bleue  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12705>

■ ***Amanita rubescens*** (Pers. : Fr.) Pers. [Amanitaceae]

Amanite rougissante  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209335>  
Comestible à condition de la cuire à plus de 75°C pour détruire les hémolysines, substances toxiques qui détruit les hématies. Organoleptiquement les avis sont partagés et son goût varierait selon les régions.

■ ***Russula lepida*** Fr. [Russulaceae]

Russule jolie  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213780>

■ ***Suillus bovinus*** (L.: Fr.) Roussel [Suillaceae]

Bolet des Bouviers  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209936>  
Très médiocre comestible

■ ***Lactarius chrysorrheus*** Fr. [Russulaceae]

Lactaire à lait doré  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213357>

■ ***Russula sardonia*** Fr. [Russulaceae]

Russule sardeine  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213986>  
Chapeau violacées à centre plus sombre. Chair piquante, blanche mais rouge sous la cuticule. Lames jaunes (jaunissant parfois après la récolte). Pied violet. Uniquement sous les pins sur sol non calcaire.  
Confusion possible : *R. torulosa*, *R. fuscorubra*, *R. fuscorubroides*, *R. cavipes*

■ ***Boletus edulis*** Bull. : Fr. [Boletaceae]

Cèpe de Bordeaux  
edulis = manger  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209620>  
Un des rares champignons à pouvoir se manger cru

■ ***Lactarius quieticolor*** Romagn. [Russulaceae]

■ ***Lycopus europaeus*** L. [Lamiaceae]

Lycpe d'Europe  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3576>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - coumarines, alcaloïdes à surveiller

■ ***Teucrium scorodonia*** L. [Lamiaceae]

Germandrée scorodone  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30402>

■ ***Digitalis purpurea*** L. subsp. ***purpurea*** [Plantaginaceae]

Digitale pourpre  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30976>  
Plante extrêmement toxique (10 g de feuilles sèches et 40 g de feuilles fraîches sont mortels pour l'homme) dont on extrait la digitaline ou digitoxine qui sont des glycosides cardiotoniques utilisés dans le traitement de la tachycardie et de l'arythmie cardiaque.

■ ***Dryopteris carthusiana*** (Vill.) H.P.Fuchs

[Dryopteridaceae]

Fougère-mâle des Chartreux  
De Cartusia [la Grande-Chartreuse près de Grenoble] ; espèce décrite du 13ème siècle d'après des plantes provenant de cet endroit.  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7375>

■ ***Amanita citrina*** f. ***alba*** (Price) Quéf. [Amanitaceae]

Amanite citrine forme blanche  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209224>

■ ***Castanea sativa*** Mill. [Fagaceae]

Châtaignier commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3279>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - bourgeon de feuille, feuille, fleur, tige, graine, écorce

■ ***Polypodium vulgare*** L. [Polypodiaceae]

Polypode commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7452>  
Limbe étroit (rapport largeur/longueur le plus souvent inférieur à 1/3), à bords plus ou moins parallèles, généralement brusquement réduit au sommet en une longue pointe. Pennes à marge entière, non dentée. Sores bruns, petits et ronds, dépourvus de paraphyses (microscope !). Identifiable de façon précise à la taille de ses sporanges, plus petits que ceux des autres espèces, et surtout au nombre de cellules (plus de 10) de l'anneau mécanique brun-rouge, bien différencié. Spores de 55 µm de diamètre.  
Pl. purgative, cholagogue. Taxon allotétraploïde qui se serait formée à partir d'une espèce américaine, *P. glycyrrhiza* et une boréale, *P. sibiricum*.

■ ***Lactarius necator*** (Bull. : Fr.) Pers. [Russulaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213481>

■ ***Amanita fulva*** (J.C.Sch. ?) Fr. [Amanitaceae]

Amanite fauve  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209254>

■ ***Aira praecox*** L. [Poaceae]

Aira précoce  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6610>

■ ***Betula pendula*** Roth [Betulaceae]

Bouleau verruqueux au sens large  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1325>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, écorce, bourgeon, sève - salicylate de méthyle à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés

■ ***Rana temporaria*** Linnaeus [Ranidae]

Grenouille rousse  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12000136>

■ ***Hygrocybe reidii*** Kühner [Hygrophoraceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214655>

■ ***Laccaria amethystina*** (Hudson ? Kummer) Cooke [Hydnangiaceae]

Laccaire améthyste  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211083>

**France - 78 : Gambaiseuil - Du carrefour des barillets au carrefour des fontaines blanches puis retour vers le carrefour des Pacages**

avec : BUISSON Daniel, GALAND Christian, MORICE Patrick, VINGERE Hervé, GOJARD Laurent & BOCK Benoît



■ ***Eupatorium cannabinum*** L. subsp. ***cannabinum*** [Asteraceae]

Eupatoire chanvrine  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9976>

■ ***Filipendula ulmaria*** var. ***denudata*** (J.Presl & C.Presl) Maxim. [Rosaceae]

Reine-des-prés Grande dénudée  
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4741>  
Plante herbacée très haute (plus de 1 m), à feuilles divisées en 3 à 5 paires de grandes folioles (6 x 3 cm) et à fleurs blanches, nombreuses, en corymbes amples. Fleurs à odeur de miel peu sucré. Face inférieure des feuilles vertes.

■ ***Pulicaria dysenterica*** (L.) Bernh. [Asteraceae]

Pulicaire dysentérique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1111>  
Pl. employée contre la dysentérie

■ ***Achillea ptarmica*** L. subsp. ***ptarmica*** [Asteraceae]

Achillée ptarmique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=372>

■ ***Lythrum salicaria*** L. [Lythraceae]

Salicaire commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3792>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires -  
sommité fleurie

■ ***Lotus pedunculatus*** Cav. [Fabaceae]

Lotier des fanges

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3004>  
vérifier si l'échantillon existe

■ ***Stachys sylvatica*** L. [Lamiaceae]

Épiaire des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3697>  
Pl. fétide

■ ***Stereum hirsutum*** (Willd.:Fr.) Pers. [Stereaceae]

Stérée hirsute

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212509>

■ ***Phragmites australis*** (Cav.) Trin. ex Steud. [Poaceae]

Roseau commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7063>

■ ***Scutellaria minor*** Huds. [Lamiaceae]

Scutellaire Petite

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3658>

■ ***Persicaria hydropiper*** (L.) Delarbre [Polygonaceae]

Persicaire poivre-d'eau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4230>  
Annuelle à tige dressée ou couchée, rameuse. Plante à saveur poivrée (la seule de ce genre). Feuilles lancéolées, atténuées aux 2 extrémités à largeur maximum vers la base, à pétiole court. Ochréas presque glabres avec quelques cils de 0,2 à 3 mm au bord. Fleurs verdâtres rarement roses ou blanches en épis grêles, lâches, généralement arqués-pendants. Péricone à 4 divisions, densément ponctué de glandes.

■ ***Equisetum arvense*** L. [Equisetaceae]

Prêle des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7397>  
Tiges fertiles non chlorophylliennes vite disparues et des tiges stériles vertes et ramifiées. Le premier article des rameaux est plus long que la gaine correspondante (différence avec *E. palustre*). La section des rameaux est en forme de +  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires -  
parties aériennes

■ ***Juncus effusus*** L. [Juncaceae]

Jonc épars

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6139>  
Grand jonc à tiges vertes et lisses et à gaines brunes mais non brillantes, à inflorescences irrégulièrement ramifiées assez denses, en position latérale, comportant de nombreuses fleurs petites (1 mm).

■ ***Scrophularia nodosa*** L. [Scrophulariaceae]

Scrofulaire noueuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5464>

■ ***Convolvulus sepium*** L. var. ***sepium*** [Convolvulaceae]

Liseron des haies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8901>

■ ***Deschampsia cespitosa*** (L.) P.Beauv. subsp. ***cespitosa*** var. ***cespitosa*** [Poaceae]

Deschampsie des montagnes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43324>

■ ***Fraxinus excelsior*** L. subsp. ***excelsior*** var. ***excelsior*** [Oleaceae]

Frêne élevé de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30618>  
Diurétique, hypotensive, antirhumatismal, antilithiasique.

■ ***Convallaria majalis*** L. [Asparagaceae]

Muguet de mai

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6297>

■ ***Scirpus sylvaticus*** L. [Cyperaceae]

Scirpe des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6061>

■ ***Fagus sylvatica*** L. var. ***sylvatica*** f. ***sylvatica*** [Fagaceae]

Hêtre commun des forêts

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10040>

■ ***Juncus conglomeratus*** L. [Juncaceae]

Jonc aggloméré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6138>

■ ***Juncus tenuis*** Willd. subsp. ***tenuis*** [Juncaceae]

Jonc ténu de Willdenow

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12328>

■ ***Rubus caesius*** L. [Rosaceae]

Ronce bleue

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4910>  
Ronce prostrée, à 3 folioles, sans poils sur les tiges et à pétiole sillonné sur toute sa longueur  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires -  
feuille, fruit

■ ***Lactarius serifluus*** (DC.: Fr.) Fr. [Russulaceae]

■ ***Iris pseudacorus*** L. [Iridaceae]

Iris des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6103>  
Plante robuste pouvant dépasser 1 m de haut, formant des colonies denses et importantes au bord des eaux, à larges feuilles (15 à 20 mm) glauques et à tiges portant plusieurs fleurs pédonculées d'un jaune vif.  
La fleur aurait inspiré le blason des rois de France sous le nom de fleur de Lys (soit en relation avec la rivière Lys, soit par déformation de fleur de Louis porté par le roi Louis VII notamment sur son sceau).

■ ***Russula nigricans*** (Bull. ?) Fr. [Russulaceae]

Russule noirissante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213840>  
Facile à reconnaître à ses lames espacées, épaisses et cassantes, à sa chair qui rougit avant de noircir, et à sa saveur douce.

■ ***Betonica officinalis*** L. subsp. ***officinalis*** [Lamiaceae]

Bétoine officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3691>  
Pl. stimulante, tonique, apéritive et sternutatoire

■ ***Potentilla sterilis*** (L.) Garcke [Rosaceae]

Potentille stérile

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4822>

■ ***Dryocopus martius*** [Picidae]

Pic noir

■ ***Lysimachia vulgaris*** L. [Primulaceae]

Lysimaque commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30227>

■ ***Lobelia urens*** L. **R** [Campanulaceae]

Lobélie brûlante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3778>  
Pl. antispasmodique, expectorante et dédative, vénéneuse à suc très acre

■ ***Potamogeton polygonifolius*** Pourr. **R** [Potamogetonaceae]

Potamot à feuilles de renouée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7237>

■ ***Myrica gale*** L. **R** [Myricaceae]

Myriche galé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3852>  
f. stimulantes, cordiales et stomatiques; éloigne les moustiques!

■ ***Gentiana pneumonanthe*** L. subsp. ***pneumonanthe*** var. ***pneumonanthe*** [Gentianaceae]

Gentiane pneumonanthe de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10246>

■ ***Erica tetralix*** L. [Ericaceae]

Bruyère des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2662>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires -  
fleur

■ ***Fomes fomentarius*** (L.: Fr.) Fr. [Polyporaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212282>

On tire de ce champignon l'amadou qui sert à allumer le feu et qui était utilisé dans les briquets à amadou.

■ ***Cirsium dissectum*** (L.) Hill [Asteraceae]

Cirse d'Angleterre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=669>

■ ***Pluteus cervinus*** (J.C.Sch. ?) Kummer [Pluteaceae]

Pluté des cerfs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211643>

■ **Russula densifolia** Gillet [Russulaceae]

Russule à lames serrées

Chapeau : 3-8 cm, non ou très peu visqueux, blanc puis brun surtout dans la zone centrale qui est infundibuliforme. Lames : assez décourantes, blanches à crème. Pied : 3-6 × 1,2-2,5 cm, blanc puis grisonnant et enfin brunissant. Chair : blanche, rougissant en 5 min puis noirissant. Saveur douce dans la chair et ± piquante dans les lames (parfois fortement!), odeur faible. Fer vert sombre. Gaïac bleu vif sur pied et lames. Sporée : Ia.

■ **Hydnum rufescens** Pers. : Fr. [Hydnaceae]

Pied de mouton rousissant

■ **Cirsium palustre** (L.) Scop. [Asteraceae]

Cirse des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=684>

■ **Persicaria lapathifolia** (L.) Delarbre [Polygonaceae]

Persicaire neuve

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4231>

Annuelle à tige rameuse à noeuds très épaissis. Feuilles à base cunéiforme à pétiole de 0 à 3 cm, à limbe parfois marqué d'une macule plus sombre et à plus grande largeur dans leur tiers inférieur, à face inférieure ponctuée de glandes. Épis de fleurs roses ou blanchâtres, dense, continus et retombants, généralement de plus de 5 mm d'épaisseur à pédoncule parsemé de microglandes jaunes paraissant posées sur l'épiderme (loupe). Ochréas à cils nuls ou < 0,8 mm.

■ **Sorbus torminalis** (L.) Crantz [Rosaceae]

Alisier torminal

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4996>

■ **Athyrium filix-femina** (L.) Roth [Athyriaceae]

Fougère-femelle commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7466>

■ **Osmunda regalis** L. **R** [Osmundaceae]

Osmonde royale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7448>

On distingue parfois 2 variétés : regalis à lobes non dentés et plumierii à lobes dentés.

■ **Struthiopteris spicant** (L.) Weiss var. **spicant** [Blechnaceae]

Fougère-en-épi commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8795>

■ **Dryopteris carthusiana** (Vill.) H.P.Fuchs [Dryopteridaceae]

Fougère-mâle des Chartreux

De Cartusia [la Grande-Chartreuse près de Grenoble] ; espèce décrite du 13ème siècle d'après des plantes provenant de cet endroit.

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7375>

■ **Hieracium umbellatum** L. [Asteraceae]

Épervière en ombelle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=947>

Plante à très nombreuses feuilles toutes caulinaires, serrées, toutes sessiles, linéaires à ovales, entières à pennatifides. Synflorescence ombellée à sa partie terminale, sauf sur les remontées après coupe où elle prend une forme irrégulièrement paniculée. Involucre souvent complètement glabre, rarement à quelques poils simples ou glanduleux, à bractées récurvées à l'apex. Réceptacle glabre. Akènes brun sombre. Floraison en fin d'été à vérifier

■ **Campanula rotundifolia** L. subsp. **rotundifolia** [Campanulaceae]

Campanule à feuilles rondes commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1902>

**France - 78 : Condé sur Vesgre - Chemin du carrefour des Pacages à la départementale**

avec : BUISSON Daniel, GALAND Christian, MORICE Patrick, VINGERE Hervé, GOJARD Laurent & BOCK Benoît



■ **Goodyera repens** (L.) R.Br. [Orchidaceae]

Goodyère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6466>

■ **Campanula rotundifolia** L. subsp. **rotundifolia** [Campanulaceae]

Campanule à feuilles rondes commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1902>

■ **Lactuca muralis** (L.) Gaertn. subsp. **muralis** [Asteraceae]

Laitue des murailles

■ **Hypholoma fasciculare** (Huds. : Fr.) Kummer [Strophariaceae]

Hypholome en touffes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208137>

Vit en touffe sur les souches mortes. La couleur jaune citron sale et son amertume le rend inconfondable.

■ **Tremella aurantia** Schw. : Fr. [Tremellaceae]

Trémelle orangée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214423>

Parasite de Stereum hirsutum

■ **Erica cinerea** L. [Ericaceae]

Bruyère cendrée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2657>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur, sommité fleurie

■ **Tricholoma sulphureum** (Bull. : Fr.) Kummer [Tricholomataceae]

Tricholome sulfureux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208949>

■ **Morganella pyriformis** (J.C.Sch. : Pers.) Kreisel & D. Krüger [Agaricaceae]

Vesse-de-loup en poire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2204243>

■ **Veronica officinalis** L. [Plantaginaceae]

Véronique officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5517>

Elle a des propriétés astringentes, eupeptiques et cicatrisantes. La présence d'aucuboside, un anti-inflammatoire, contribue à soigner l'arthrose. La véronique combat aussi l'artériosclérose et a un effet antioxydant qui aide à combattre le diabète ; elle protège le foie, pour lequel elle est citée en conjonction avec d'autres plantes (pissenlit, chicorée, aspérule) par l'herboriste renommée Maria Treben qui la cite également pour l'excès de cholestérol, les blessures enflammées à cicatrisation difficile, l'eczéma chronique (avec l'ortie), les vieilles bronchites, la jaunisse, les affections de la rate, les troubles intestinaux, la nervosité issue de surmenage intellectuel et les vertiges. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ **Coprinus picaceus** (Bull. : Fr.) S.F.Gray [Psathyrellaceae]

Coprin pie

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2207571>

Attention les spores peuvent être pathogènes pour l'Homme

**Tricholoma sp.** [Tricholomataceae]

Du grec ancien θριξ, τριχός, trix, trichos (« cheveu ») et λῶμα, lôma (« frange »).

■ ***Selinum carvifolia*** (L.) L. [Apiaceae]

Sélin carvifeuille

<http://www.photoflora.fr/FITaxMax.php?NumTaxon=280>