

# Sortie SBCO (groupe drouais) du mercredi 16 octobre 2024

Etat imprimé le 16 octobre 2024 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)

mercredi 16 octobre 2024

## France - 28 : Saint Jean de Rebervilliers - Forêt de Chateaufort-en-Thymerais

avec : 16 participants



### Lichens - Champignons

#### ■ *Amanita citrina* (J.C.Sch.) Pers. [Amanitaceae]

Amanite citrine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209223>

En forêts. Chapeau jaune citron clair (parfois blanche) avec présence de plaques de voile concolores ou plus brunes. Stipe à bulbe nettement marginé. Forte odeur, de pomme de terre crue. Spores globuleuses ou presque, 7,5-9,5 µm.

#### ■ *Amanita citrina* f. *alba* (Price) Qué. [Amanitaceae]

Amanite citrine forme blanche

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209224>

#### ■ *Amanita muscaria* (L.: Fr.) Lamarck [Amanitaceae]

Amanite tue-mouche

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209286>

#### ■ *Amanita rubescens* (Pers.: Fr.) Pers. [Amanitaceae]

Amanite rougissante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209335>

Comestible à condition de la cuire à plus de 75°C pour détruire les hémolysines, substances toxiques qui détruit les hématies. Organoleptiquement les avis sont partagés et son goût varierait selon les régions.

#### ■ *Armillaria mellea* (Vahl: Fr.) Kummer [Tricholomataceae]

Armillaire couleur de miel

mel = miel

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208301>

#### ■ *Boletus aereus* Bull.: Fr. [Boletaceae]

Bolet bronzé

#### ■ *Boletus edulis* Bull.: Fr. [Boletaceae]

Cèpe de Bordeaux

edulis = manger

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209620>

Un des rares champignons à pouvoir se manger cru

#### ■ *Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr. [Dacrymycetaceae]

Calocère visqueuse

kalo = beau, keras = corne

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2210140>

#### ■ *Clavulina cristata* var. *subrugosa* Corner [Clavulinaceae]

#### ■ *Clitocybe nebularis* (Batsch: Fr.) P.Kumm. [Tricholomataceae]

Clitocybe nébuleux

clito = pente, cybe = tête

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208585>

#### ■ *Collybia fusipes* (Bull.: Fr.) Qué. [Marasmiaceae]

Collybie à pied en fuseau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214950>

#### ■ *Coprinus saccharinus* Romagn. [Psathyrellaceae]

Coprin soupoudré de sucre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2207592>

#### ■ *Cortinarius torvus* (Fr.: Fr.) Fr. [Cortinariaceae]

Cortinaire à pied tordu

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206477>

#### ■ *Craterellus tubaeformis* (Bull.: Fr.) Qué. [Cantharellaceae]

Chanterelle en tube

Excellent comestible

#### ■ *Daedalea quercina* (L.: Fr.) Pers. [Fomitopsidaceae]

Dédalée du chêne

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211777>

#### ■ *Helvella crispa* (Scopoli ex Fr.) Fr. [Helvellaceae]

Helvelle crépue

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2202677>

#### ■ *Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) Kummer [Strophariaceae]

Hypholome en touffes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208137>

Vit en touffe sur les souches mortes. La couleur jaune citron sale et son amertume le rend inconfondable.

#### ■ *Imleria badia* (Fr.: Fr.) Vizzini [Boletaceae]

Bolet bai

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209773>

#### ■ *Laccaria amethystina* (Hudson ? Kummer) Cooke [Hydnangiaceae]

Laccaire améthyste

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211083>

#### ■ *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Cooke [Hydnangiaceae]

Laccaire laqué

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211088>

#### ■ *Lactarius chrysorrheus* Fr. [Russulaceae]

Lactaire à lait doré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213357>

#### ■ *Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers. [Lycoperdaceae]

Vesse-de-loup perlée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211491>

#### ■ *Mycena rosea* (Bull. ? Pers.) Gramberg [Mycenaceae]

Mycène rose

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215483>

#### ■ *Panellus stipticus* (Bull.: Fr.) P.Karsten [Mycenaceae]

Panelle styptique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215555>

Lignivore et bioluminescent chez la variété américaine uniquement

#### ■ *Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) P.Karsten [Fomitopsidaceae]

Polypore du Bouleau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211796>

Exclusif des troncs de bouleaux. Blanc et ferme il est très facile à reconnaître et très commun.

#### ■ *Rhodocollybia butyracea* (Bull.: Fr.) Lennox []

Collybie beurrée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214934>

#### ■ *Russula lepida* Fr. [Russulaceae]

Russule jolie

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213780>

#### ■ *Russula sardonia* Fr. [Russulaceae]

Russule sardoine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213986>

Chapeau violacées à centre plus sombre. Chair piquante, blanche mais rouge sous la cuticule. Lames jaunes (jaunissant parfois après la récolte). Pied violet. Uniquement sous les pins sur sol non calcaire.

Confusion possible : *R. torulosa*, *R. fuscocrubra*, *R. fuscocrubroides*, *R. cavipes*

■ ***Stereum hirsutum*** (Willd.:Fr.) Pers. [Stereaceae]

Stérée hirsute

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212509>

■ ***Tapinella atrotomentosa*** (Batsch : Fr.) Šutara [Tapinellaceae]

Paxille à pied noir

■ ***Tricholoma saponaceum*** (Fr. : Fr.) Kummer [Tricholomataceae]

Tricholome à odeur de savon

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208918>

■ ***Tricholomopsis rutilans*** (J.C.Sch. : Fr.) Singer [Tricholomataceae]

Tricholome rutilant

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208974>

■ ***Xylaria hypoxylon*** (L.ex Fr.) Greville [Xylariaceae]

Xyloaire du bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2204072>

Avec ses petits rameaux noirs à extrémités blanches aplaties comme les bois d'un minuscule élan, sa détermination ne prête guère à confusion