

Sortie SBCO (groupe drouais) du samedi 19 octobre 2024

Etat imprimé le 19 octobre 2024 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B.BOCC & al.)

samedi 19 octobre 2024

France - 78 : Saint Léger en Yvelines - Vallon en amont de l'étang Rompu

avec : DAMAS Louan, SALEME Noah, GALAND Christian, BOCK Benoît, CROLLA Antonin, DARDENNE Stéphanie, DARDENNE Philippe & LECOQ Alain



Lichens - Champignons

- **Armillaria mellea** (Vahl : Fr.) Kummer [Tricholomataceae]
Armillaire couleur de miel
mel = miel
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208301>
- **Auriscalpium vulgare** S.F.Gray [Auriscalpiaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2210957>
- **Calocera viscosa** (Pers. : Fr.) Fr. [Dacrymycetaceae]
Calocère visqueuse
kalo = beau, keras = corne
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2210140>
- **Cladonia coniocraea** (Flörke) Spreng. [Cladoniaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2000925>
- **Clitocybe nebularis** (Batsch : Fr.) P.Kumm. [Tricholomataceae]
Clitocybe nébuleux
clito = pente, cybe = tête
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208585>
- **Cortinarius violaceus** (L.: Fr.) Fr. [Cortinariaceae]
Cortinaire violet
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206599>
- **Evernia prunastri** (L.) Ach. [Parmeliaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2006582>
Utilisé en médecine traditionnelle, comme agent fermentant, pour teindre la laine en violet (toge romaine), par les embaumeurs de momies, comme bourre pour les pierres à fusil, pour blanchir les perruques et les protéger des mites, en biosurveillance de la qualité de l'air, en parfumerie pour apporter une note boisée aux parfums pour homme, mais serait aussi allergène.
- **Flavoparmelia caperata** (L.) Hale [Parmeliaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2002426>
- **Hymenopellis radicata** (Rehlan : Fr.) R.H.Petersen [Physalacriaceae]
Collybie radicante
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215614>
- **Lactarius blennius** (Fr. : Fr.) Fr. [Russulaceae]
Lactaire muqueux
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213347>
- **Lactarius quietus** (Fr. : Fr.) Fr. [Russulaceae]
Lactaire tranquille

■ **Panellus stipticus** (Bull. : Fr.) P.Karsten [Mycenaceae]
Panelle styptique
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215555>
Lignivore et bioluminescent chez la variété américaine uniquement

■ **Plicaturopsis crispa** (Pers. : Fr.) D.A.Reid [Atheliaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209478>

■ **Rickenella fibula** (Bull. : Fr.) Raitelhuber [Tricholomataceae]
Omphale épingle
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208799>

■ **Trametes versicolor** (L.: Fr.) Lloyd [Polyporaceae]
Tramète versicolore
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212387>

En 2011, une équipe de scientifiques du Queensland University of Technology ont découvert que ce champignon pouvait soigner le cancer de la prostate. Des tests sur des souris ont montré que la tumeur régressait de manière spectaculaire. De plus, aucun effet secondaire ne s'est manifesté.

■ **Tricholoma albidum** Bon [Tricholomataceae]



Bryophytes

■ **Atrichum undulatum** (Hedw.) P.Beauv. [Polytrichaceae]

■ **Bartramia pomiformis** Hedw. [Bartramiaceae]

■ **Brachythecium rutabulum** (Hedw.) Schimp. [Brachytheciaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-173>
Forme des tapis jaunâtres dans les pelouses

■ **Bryum capillare** Hedw. [Bryaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-218>

■ **Calliergonella cuspidata** (Hedw.) Loeske [Amblystegiaceae]

■ **Cephalozia bicuspidata** (L.) Dumort. [Cephaloziaceae]
Feuilles espacées, non décurrentes, et le sinus atteint la moitié de la feuille.

■ **Chiloscyphus pallescens** (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. [Geocalycaceae]

■ **Dicranum scoparium** Hedw. [Dicranaceae]

Dicrane en balais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-496>

■ **Eurhynchium striatum** (Schreb. ex Hedw.) Schimp. [Brachytheciaceae]

■ **Fissidens taxifolius** Hedw. [Fissidentaceae]

■ **Fontinalis antipyretica** Hedw. [Fontinalaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-664>

■ **Frullania dilatata** (L.) Dumort. [Jubulaceae]

Frullanie dilatée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-685>

La présence de lactones sesquiterpéniques peut la rendre très allergisante.

■ **Herzogiella seligeri** (Brid.) Z.Iwats. [Hypnaceae]

■ **Hylocomium splendens** (Hedw.) Schimp. [Hylocomiaceae]

■ **Hypnum cupressiforme** Hedw. var. **cupressiforme** [Plagiotheciaceae]

■ **Hypnum cupressiforme** var. **filiforme** Brid. [Plagiotheciaceae]

■ **Kindbergia praelonga** (Hedw.) Ochyra [Brachytheciaceae]

■ **Metzgeria furcata** (L.) Corda [Metzgeriaceae]

Orthotrichum sp. [Orthotrichaceae]

- ***Pleurozium schreberi*** (Willd. ex Brid.) Mitt. [Hylocomiaceae]
- ***Polytrichastrum formosum*** (Hedw.) G.L.Sm. [Polytrichaceae]
- ***Pseudoscleropodium purum*** (Hedw.) M.Fleisch. [Brachytheciaceae]

Pulviger a lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra
[]

- ***Radula complanata*** (L.) Dumort. [Radulaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-1357>
Contiendrait la radulanine A, une molécule aux propriétés herbicides en cours d'étude.

- ***Rhytidiadelphus squarrosus*** (Hedw.) Warnst. [Hylocomiaceae]
Hypne squarreux

- ***Sphagnum flexuosum*** Dozy & Molk. [Sphagnaceae]
- ***Thuidium tamariscinum*** (Hedw.) Schimp. [Thuidiaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-1707>

Ulota sp. [Orthotrichaceae]

Zygodon sp. [Orthotrichaceae]



Pteridophytes

- ***Dryopteris carthusiana*** (Vill.) H.P.Fuchs [Dryopteridaceae]
Fougère-mâle des Chartreux
De Cartusia [la Grande-Chartreuse près de Grenoble] ; espèce décrite du 13ème siècle d'après des plantes provenant de cet endroit.
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7375>



Gymnospermes

- ***Pinus sylvestris*** L. [Pinaceae]
Pin sylvestre
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7288>
Les vertus expectorantes, antiseptiques et calmantes des bourgeons sont utilisées en phytothérapie pour traiter les maladies des voies respiratoires telles que rhume, sinusite, laryngite, catarrhes bronchiques, grippe, affections pulmonaires chroniques.
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - cône, aiguille, bourgeon, écorce, jeune pousse



Angiospermes Dicotylédones

- ***Betula pendula*** Roth [Betulaceae]
Bouleau verruqueux au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1325>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, écorce, bourgeon, sève - salicylate de méthyle à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés
- ***Carpinus betulus*** L. [Betulaceae]
Charme commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1328>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, bourgeon de feuille
- ***Fagus sylvatica*** L. var. ***sylvatica*** f. ***sylvatica*** [Fagaceae]
Hêtre commun des forêts
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10040>
- ***Oxalis acetosella*** L. [Oxalidaceae]
Oxalis des bois
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4007>
Plante vivace peu élevée (10 cm) à feuilles composées de trois folioles cordées et à fleurs blanches veinées de rose lilas, isolées sur de fins pédoncules naissant de la base.

France - 78 : Saint Léger en Yvelines - Vallon en aval de l'étang Rompu

avec : DAMAS Louan, SALEME Noah, CROLLA Antonin & BOCK Benoît



Lichens - Champignons

- ***Amanita citrina*** f. ***alba*** (Price) Quéf. [Amanitaceae]
Amanite citrine forme blanche
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209224>
- ***Amanita muscaria*** (L.: Fr.) Lamarck [Amanitaceae]
Amanite tue-mouche
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209286>
- ***Ascocoryne sp.*** [Helotiaceae]
- ***Auriscalpium vulgare*** S.F.Gray [Auriscalpiaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2210957>
- ***Bisporella citrina*** (Batsch ex Fr.) Korf & S.E.Carp. [Helotiaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2201767>
- ***Boletus edulis*** Bull. : Fr. [Boletaceae]
Cèpe de Bordeaux
edulis = manger
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209620>
Un des rares champignons à pouvoir se manger cru
- ***Calocera viscosa*** (Pers. : Fr.) Fr. [Dacrymycetaceae]
Calocère visqueuse
kalo = beau, keras = corne
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2210140>
- ***Clathrus archeri*** (Berk.) Dring [Phallaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211580>
D'origine australienne ou néo-zélandaise, il aurait été introduit en France dans la région bordelaise puis près des filatures de Raon-l'Étape dans les Vosges avec des laines débarquées de l'hémisphère sud. À moins qu'il ne soit apparu dans la région de Saint-Dié pendant la Première Guerre mondiale par l'intermédiaire des chevaux des soldats australiens et de leur fourrage
- ***Clavulina cinerea*** (Bull. : Fr.) J.Schröter [Clavulinaceae]
Clavuline cendrée
Clavulina, clavulus = petit clou (ressemblant à un petit clou), cinerea = cendré
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209168>
- ***Clitocybe nebularis*** (Batsch : Fr.) P.Kumm. [Tricholomataceae]
Clitocybe nébuleux
clito = pente, cybe = tête
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208585>
- ***Clitocybe phyllophila*** (Pers. : Fr.) Kummer [Tricholomataceae]
Clitocybe des feuilles
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208481>
- ***Cortinarius sanguineus*** (Wulfen : Fr.) S.F.Gray [Cortinariaceae]
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206151>
- ***Cortinarius violaceus*** (L.: Fr.) Fr. [Cortinariaceae]
Cortinaire violet
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206599>

■ **Crepidotus sp.** [Crepidotaceae]

Crépidote

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206791>

■ **Cystoderma amianthinum** (Scop.) Fayod [Cystodermataceae]

Cystoderme furfuracé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214461>

Spores de 5,5 à 6 µm max

■ **Daedalea quercina** (L. : Fr.) Pers. [Fomitopsidaceae]

Dédalée du chêne

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211777>

Exidia sp. [Exidiaceae]

■ **Fomitopsis pinicola** (Swartz : Fr.) P.Karsten [Fomitopsidaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211784>

■ **Galerina marginata** (Batsch) Kühner [Cortinariaceae]

Galère marginée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206682>

Mortel

■ **Gymnopilus penetrans** (Fr. : Fr.) Murrill [Cortinariaceae]

Gymnopile pénétrant

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206751>

■ **Gymnopus perforans** (Hoffm.) Antonín & Noordel. [Marasmiaceae]

Chapeau : 0,5-1-5 cm, strié ou finement ridé, beige rosâtre puis blanchâtre un peu creusé et parfois avec une petite papille au centre. Lames: adnées, espacées, crème. Pied : 1,5-5 × 0,05-0,15 cm, finement velouté, crème à brun roussâtre à base noire, puis tout noir en vieillissant. Chair: très mince. Saveur douce, odeur peu agréable de chou ou d'eau croupie, surtout perceptible en écrasant un champignon entre les doigts.

Pied velouté, greffé sur des aiguilles de conifères et sa chair dégage une odeur désagréable. Il ne peut guère être confondu lors d'un examen superficiel qu'avec *Gymnopus androsaceus*, qui possède un pied lisse et brillant et dont la chair est inodore.

■ **Helvella lacunosa** Afz. ex Fr. [Helvellaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2202690>

■ **Helvella macropus** (Pers. ex Fr.) Karsten [Helvellaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2202695>

■ **Hydnum repandum** L.: Fr. [Hydnaceae]

Pied de mouton commun

■ **Hydnum rufescens** Pers. : Fr. [Hydnaceae]

Pied de mouton rousissant

■ **Hygrophoropsis aurantiaca** (Wulfen : Fr.) R.Maire [Hygrophoropsidaceae]

Fausse girofle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209853>

■ **Hymenochaete rubiginosa** (Dicks. : Fr.) Lévillé [Hymenochaetaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211146>

■ **Infundibulicybe gibba** (Pers. : Fr.) Harmaja [Tricholomataceae]

Clitocybe en entonnoir

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208432>

Champignon de 5 à 10 cm, à lames très décourantes, à chapeau de couleur crème, à chair peu épaisse, et à sommet ombiliqué. Pousse sous feuillus ou sous conifères.

■ **Lactarius blennius** (Fr. : Fr.) Fr. [Russulaceae]

Lactaire muqueux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213347>

■ **Lactarius necator** (Bull. : Fr.) Pers. [Russulaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213481>

■ **Lactarius torminosus** (J.C.Sch. : Fr.) Pers. [Russulaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213476>

■ **Lepista nuda** (Bull. : Fr.) Cooke [Tricholomataceae]

Pied-bleu

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208588>

■ **Lycoperdon nigrescens** Pers. : Pers. [Lycoperdaceae]

Vesce de loup noirâtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211480>

■ **Lycoperdon perlatum** Pers. : Pers. [Lycoperdaceae]

Vesse-de-loup perlée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211491>

■ **Macrolepiota procera** (Scop. : Fr.) Singer [Secotiaceae]

Lépiote élevée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208086>

■ **Mycena galopus** (Pers. : Fr.) Kummer [Mycenaceae]

■ **Mycena inclinata** (Fr.) Quél. [Mycenaceae]

Mycène incliné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215394>

■ **Mycena rosea** (Bull. ? Pers.) Gramberg [Mycenaceae]

Mycène rose

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215483>

■ **Otidea onotica** (Pers. ex Fr.) Fuckel [Pyronemataceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2203102>

■ **Phlebia tremellosa** (Schrad. : Fr.) K.K.Nakasone & H.H. Burdsall [Meruliaceae]

Mérule tremblante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212210>

■ **Piptoporus betulinus** (Bull. : Fr.) P.Karsten [Fomitopsidaceae]

Polypore du Bouleau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211796>

Exclusif des tronc de bouleaux. Blanc et ferme il est très facile à reconnaître et très commun.

■ **Plicaturopsis crispa** (Pers. : Fr.) D.A.Reid [Atheliaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209478>

■ **Pluteus leoninus** (J.C.Sch. : Fr.) Kummer [Pluteaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211671>

■ **Pseudohydnum gelatinosum** (Scop. : Fr.) P.Karsten [Exidiaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209572>

■ **Rhodocollybia butyracea** (Bull. : Fr.) Lennox []

Collybie beurrée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214934>

■ **Russula densifolia** Gillet [Russulaceae]

Russule à lames serrées

Chapeau : 3-8 cm, non ou très peu visqueux, blanc puis brun surtout dans la zone centrale qui est infundibuliforme. Lames : assez décourantes, blanches à crème. Pied : 3-6 × 1,2-2,5 cm, blanc puis grisonnant et enfin brunissant. Chair : blanche, rougissant en 5 min puis noirissant. Saveur douce dans la chair et ± piquante dans les lames (parfois fortement!), odeur faible. Fer vert sombre. Gaïac bleu vif sur pied et lames. Sporée : Ia.

■ **Russula nigricans** (Bull. ?) Fr. [Russulaceae]

Russule noirissante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213840>

Facile à reconnaître à ses lames espacées, épaisses et cassantes, à sa chair qui rougit avant de noircir, et à sa saveur douce.

■ **Russula ochroleuca** Pers. [Russulaceae]

Russule ocre et blanche

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213854>

■ **Scleroderma citrinum** Pers. : Pers. [Sclerodermataceae]

Scléroderme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209923>

■ **Stereum hirsutum** (Willd.:Fr.) Pers. [Stereaceae]

Stérée hirsute

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212509>

■ **Xerocomus chrysenteron** (Bull.) Quél. [Boletaceae]

Bolet à chair jaune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209775>



Bryophytes

■ **Neckera complanata** (Hedw.) Huebener [Neckeraceae]

■ **Polytrichum juniperinum** Hedw. [Polytrichaceae]



Ptéridophytes

■ **Asplenium ruta-muraria** L. [Aspleniaceae]

Asplénie des murailles

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8688>



Gymnospermes

■ **Picea abies** (L.) H.Karst. subsp. **abies** [Pinaceae]

Épicéa commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7276>