

## Contributions à l'inventaire de la flore (Contributions collectées par André TERRISSE)

### Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 15 février**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune** (si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;

- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;

- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

N.B. : Les départements sont rangés par ordre alphabétique.

### Alpes-de-Haute-Provence

Contribution de : Robert AMAT

\* : taxons non mentionnés par le *Catalogue des Basses-Alpes* de LAURENT, DELEUIL *et al.*, catalogue dont Pierre DONADILLE a entrepris la refonte complète.

► \**Achillea millefolium* subsp. *millefolium* var. *pedemontanum* Briq. & Cav.

- Ongles, aven de la Belette, 655 m, 24 août 1997.

Cette gracieuse variété de millefeuille à fleurs roses est décrite très précisément (diagnose) par BURNAT dans son Catalogue des Alpes-Maritimes (*cf.* aussi le *Catalogue de l'Herbier BURNAT*, par CHARPIN et SALANSON), qui déclare l'avoir rencontrée aux environs de Gap, dans les prairies. PIGNATTI mentionne pour l'Italie une plante qui lui ressemble beaucoup et qui possède selon lui la même écologie (*prati falciati*) — il s'agit de l'*A. roseo-alba* —, on peut se poser la question du rapport entre les deux taxons.

► \**Amaranthus blitoides*

- La Brillanne, friche au lieu-dit les Plantiers, 385 m, 7 octobre 1997.

Cette mauvaise herbe des cultures, introduite de l'Amérique du Nord, est connue en Provence : GIRERD la mentionne près d'Orange (en soulignant l'irrégularité de sa présence) et MOLINIER la donnait pour adventice à Marseille et à Berre. Sans doute de la même façon fugitive, cette plante prostrée fait son apparition ici. A suivre...

► \**Allium neapolitanum*

- Lurs, abondant sur toute la falaise qui supporte le cimetière (d'où il s'est sans doute échappé), 570 m, 23 mars 1997.

On ne mentionnerait pas cette plante ornementale, qu'on ne rencontre dans les départements plus méridionaux qu'à l'état subsponané, s'il ne s'agissait, de par l'abondance et l'étendue de la population constatée, d'une avancée importante vers l'intérieur des terres et peut-être d'un signe avant-coureur de naturalisation ?

► \**Aster squamatus*

- Montpezat, grève détrempeée au bord du Verdon (avec *Cyperus eragrostis*, *Sisymbrella aspera* subsp. *aspera*, etc.) en bas du ravin des Vignasses, 400 m, 3 octobre 1997.

Encore une plante introduite ; venue d'Amérique du Sud, elle est depuis longtemps naturalisée sur le littoral du Languedoc, d'où elle a gagné la Camargue. Remontant les rivières, elle est, semble-t-il, en train de s'installer sur le Verdon, où je l'ai vue pour la première fois le 20 septembre 1988, mais n'est pas encore sur la Durance.

► \**Ceratophyllum demersum* subsp. *demersum*

- Manosque : étang de la Forestière (près du pont suspendu), 295 m, 22 juin 1997.

Très présent dans le cours inférieur du Rhône (MOLINIER le donne pour fréquent en Camargue, GIRERD le cite, mais plus rare, dans le Vaucluse), cette plante aquatique n'a jusqu'ici pas été signalée dans la Durance. A rechercher (Durance, Verdon...).

► \**Cuscuta australis* subsp. *cesattiana* (= *C. scandens* Brot.)

- Oraison, graviers de la Durance au niveau des Buissonnades, 325 m, 18 juillet 1997.

Déjà signalée par GIRERD (*Nouvel Inventaire*, 1991) dans le Vaucluse, où elle « parasite en masse les *Xanthium* et les *Bidens* des bords de la Durance et du Rhône » ; on n'est pas étonné de la trouver jusque dans notre département (tout le Val de Durance) dans les mêmes conditions.

► \**Epilobium tetragonum* s. l.

- Manosque, dans la partie négligée d'une pépinière, à Paguemaou, cote 351, 19 juin 1997.

Présent dans les départements voisins, dans les parties humides des étages inférieur et collinéen (bords de cours d'eau, ravins, etc.). CHAS, dans son *Atlas des Hautes-Alpes*, la cite, mais en remarquant qu'elle est peut-être méconnue. Ce doit être le cas dans notre département, puisque le Catalogue de LAURENT l'ignore.

► \**Euphorbia esula* subsp. *tommasiniana* (= *E. virgata* Waldst. & Kit.)

- Reillanne (bord d'un chemin vicinal), Saint-Mitre, 510 m, 25 juin 1997 : en masse sur une vingtaine de mètres le long du talus ; mais station très endommagée et même menacée (tout avait disparu trois jours plus tard !) par l'entretien de la voirie communale.

Cette rudérale (steppique dans son pays d'origine) est l'occasion d'un de ces quiproquos qui font le charme de la taxonomie : à ne pas confondre avec *E. tenuifolia* Lam., fréquente chez nous, mais très différente par son aspect et son écologie. GIRERD, qui l'a étudiée, établit nettement cette différence, mais ne donne pas *E. virgata* comme présente dans le Vaucluse. Elle n'est pas citée non plus par les flores des départements voisins (MOLINIER, CHAS, JAHANDIEZ). Est-ce à cause de cet imbroglio taxonomique, ou parce qu'elle a pu être négligée ? BONNIER d'ailleurs ne la citait pas pour la France. C'est donc une espèce (ou sous-espèce) à réétudier sérieusement.

► \**Glycyrrhiza glabra*

- Les Mées, bord du canal du Trou du Laurent (zone agricole irriguée), avec *Calystegia sepium* subsp. *sepium*, *Clematis vitalba*, *Humulus lupulus*, *Phalaris arundinacea* subsp. *arundinacea*, *Phragmites australis*, *Rubus caesius*, etc. Planté il y a plus de 40 ans ; se reproduit depuis, sans s'étendre.

La réglisse était très cultivée autrefois dans les départements du littoral méditerranéen, où elle n'existe dans la nature qu'à l'état subspontané. La station la plus proche d'ici est signalée par MOLINIER dans les iscles de la Durance à Meyrerargues. Il n'est peut-être pas inintéressant de noter sa présence aux Mées, car la plante fleurit, produit des graines et se reproduit toute seule.

► \**Lemna gibba*

- Oraison, la Durance, (au niveau des Buissonnades), 325 m, 2 novembre 1997.

Signalée par MOLINIER dans la moitié occidentale des Bouches-du-Rhône et par GIRERD dans le Vaucluse (une station au bord du Rhône) ; absente des Hautes-Alpes (CHAS). A-t-elle échappé aux observateurs ? La population que j'ai vue est pure, occupant environ 2 m<sup>2</sup> au-dessus d'un petit herbier de *Zannichellia palustris* et de *Chara* sp. Il est à penser que d'autres sites existent dans le Val de Durance (*Lemna minor* s'y trouve en plusieurs endroits).

► \**Leucanthemum cuneifolium*

- Saint-Etienne-les-Orgues, combe du Château (talus rocailleux ensoleillé), avec *Aquilegia atrata*, *Scrophularia lucida*, *Thalictrum minus* subsp. *pubescens*, etc., 1 300 m, 13 mai 1997.

Donnée par *FLORA EUROPAEA* comme endémique des Hautes-Alpes (où elle est fréquente selon CHAS), cette belle marguerite semble assez répandue dans notre département aux lisières des forêts claires de l'étage montagnard (hêtre) : montagne de Lure, préalpes dignoises.

► \* *Melilotus sulcata*

- Lurs, olivette (route de Peyruis au nord du village), 550 m, 13 mai 1997.

Cette eu-méditerranéenne, comme le remarque GIRERD, « s'éloigne peu du littoral » : il la cite du sud du Vaucluse. Elle est bien sûr présente dans les Bouches-du-Rhône (MOLINIER) et le Var (JAHANDIEZ). Voici donc qu'elle remonte assez loin dans la vallée de la Durance, sur les coteaux particulièrement bien exposés (culture de l'olivier) : je la connais de Lurs depuis 1987.

► \* *Ophrys fusca* s. l.

- Saint-Martin-de-Brômes, coteau xérique près du lieu-dit Basset (0,25 km au sud-ouest de la cote 360), 13 mars 1997. Garrigue clairsemée à *Buxus sempervirens*, *Juniperus oxycedrus* subsp. *oxycedrus*, *Quercus coccifera*, *Rosmarinus officinalis*.

Cette orchidée, présente dans tout le Midi, et qui remonte dans le Sud-Ouest jusqu'à la Vendée, n'est pas citée par le *Catalogue des Basses-Alpes*, mais JACQUET la fait figurer parmi la flore de notre département ; elle y est effectivement présente dans sa partie méridionale, au moins jusqu'à Lurs.

► \* *Orobanche lavandulacea*

- Redortiers (montagne de Lure), coteau rocailleux très ensoleillé (exposition sud), sous le village en ruines : chênaie pubescente très dégradée (arbustes dispersés : *Quercus pubescens* subsp. *pubescens*, *Acer monspessulanum*, *Rhamnus catharticus*) et pelouse écorchée à *Bromus erectus* subsp. *erectus*, *Trisetum flavescens* subsp. *flavescens*, etc., 970 m, 17 juin 1997.

Cette gracile parasite, d'une très belle couleur, comme son nom l'indique, se reconnaît à ses anthères très velues. C'est une méditerranéenne signalée sur la Sainte-Victoire (MOLINIER), et qui atteint vraisemblablement ici sa limite septentrionale.

► \* *Poa trivialis* subsp. *sylvicola*

- Draix, lit du torrent (gravier), au gué du Bouinenc, cote 976, 8 juin 1997.

Cité par CHAS d'après LINDB. f., « très répandue dans la ville de Gap et aux alentours ». Rare, ou peu observée, elle se distingue de la sous-espèce type par un port plus gracile, une teinte bleutée et surtout de très courts stolons moniliformes.

► \* *Rhinanthus alectorolophus*

- Saint-Geniez, près des sources du Jabron, prairie mésophile (*Anthoxanthum odoratum*, *Leucanthemum praecox*, *Plantago media*, *Trifolium pratense*, *Lathyrus filiformis*, etc.), cote 1 138, 19 mai 1997.

Il est étonnant de ne pas voir mentionné dans le *Catalogue des Basses-Alpes* cet hôte si commun des prairies montagnardes, abondant dans les Hautes-Alpes (CHAS). A rechercher.

► \* *Rosa subcanina*

- Oraison, iscles des Matherons, lisière externe de la ripisylve, 350 m, 8 juillet 1997 (en fruits).

Du groupe de *R. canina*, elle se particularise par son aspect glauque, son absence complète de tomentum et de glandes, ses pédoncules allongés, son disque étroit. C'est un très bel églantier, assez fréquent dans le Val de Durance, qui semble affectionner le voisinage des cours d'eau et des canaux d'irrigation.

► \* *Silene vulgaris* subsp. *commutata*

- Lurs, haie en talus, les Pierras, 555 m, 3 juin 1997.

Il s'agit d'un taxon méridional, à très grandes feuilles, signalé par CHAS comme possible dans le sud du département des Hautes-Alpes. Rien d'étonnant par consé-

quent de le voir dans le Val de Durance. Il est à rechercher en particulier dans la région de Manosque.

► \* *Teucrium rouyanum* Coste et Soulié

- Lurs, coteau xérique (buxaie), Rabourine, 450 m, 14 juin 1997.

Non retenu par *FLORA EUROPAEA*, ce taxon du Languedoc figure en bonne place dans la *Flore des Causses* de Christian BERNARD. GUINOCHET ("*Flore du C.N.R.S.*", t. 2, p. 683) étend son aire à la Provence, mais GIRERD ne le signale pas dans le Vaucluse, ni MOLINIER dans les Bouches-du-Rhône... Il s'agit certes d'un taxon critique, vraisemblablement simple variation entre *T. polium* s. str. et *T. polium* subsp. *aureum*.

► \* *Verbascum densiflorum*

- Redortiers, terre-plein pierreux au bas d'une lavandaie (ouest du village en ruines), 995 m, 17 juin 1997.

Voisin du *V. phlomoïdes* dont il se distingue par des feuilles non décurrentes, il est signalé dans tous les départements voisins. On le trouve assez fréquemment sur la montagne de Lure (et sans doute ailleurs) en populations localisées mais souvent abondantes, dans les terrains bouleversés par l'homme (coupes, chemins nouvellement tracés, etc.).

► \* *Verbascum pulverulentum*

- Redortiers, même station que le précédent (en mélange, certains individus paraissent hybrides).

Il est lui aussi très fréquent sur les pelouses xériques de tout le pays de Forcalquier, autour de Sisteron, etc. C'est sans doute par oubli qu'il ne figure pas dans le *Catalogue des Basses-Alpes*, car on le trouve dans tous les départements voisins.

► \* *Veronica anagalloïdes*

- Grèoux, sables humides du Verdon en aval du barrage, 295 m, 15 juin 1997.

Signalée (comme rare ou assez rare) le long de la Durance depuis les Hautes-Alpes jusqu'au Rhône, il eût été étonnant de ne pas la trouver ici. Je l'ai vue aussi à Lurs, le long d'un fossé de drainage au milieu d'un champ. Voisine de *V. anagallis-aquatica*, il semble que les populations observées ici soient bien typées (cf. PIGNATTI, *Flora d'Italia*, t. 2, pp. 572-573), en particulier par leur taille réduite (sans doute liée à leur formule chromosomique ?).

► *Viola alba*

Dans mon relevé de l'an dernier (*Bull. S.B.C.O.* 28 de 1997, p. 189), une malencontreuse intervention de termes (*lapsus calami* de mon fait) rend le texte fautif. Il faut donc le rétablir ainsi :

- *V. dehrnhardtii* est de beaucoup la plus répandue à l'étage du chêne vert, etc...

- *V. scotophylla* est beaucoup plus rare.

### Aude

Contribution de : Michel BOUDRIE

► *Polypodium xmantoniae*

- Talus en sous-bois, sur substrat calcaire, bords de la D 212, entre Auriac et Savignan (avril 1988 ; coord. U.T.M. 31T DH 55). Population *inter parentes*. **Nouveau pour le département**. Cette mention vient en complément de l'article suivant : BOUDRIE M., 1994. - Observations ptéridologiques dans le département de l'Aude. *Le Monde des Plantes*, n° 451 : 1-6.

### Aveyron

Contribution de : Jean-Pierre JACOB

➤ *Conyza blakei* (Cabr.) Cabrera

- Plante disséminée, qui semble assez commune sur les talus rocheux, de nature siliceuse, des portions de la route D 911 aménagées dans une période récente entre Rieupeyrroux et Villefranche-de-Rouergue, en particulier :

1/ sur le bord droit de la descente entaillée dans une roche très claire, une dizaine de kilomètres après Rieupeyrroux ;

2/ sur le bord gauche de la descente deux kilomètres environ avant l'entrée de Villefranche, avec *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker, dont elle se distingue très bien grâce en particulier aux silhouettes bien différentes (inflorescence étroite et feuilles de la base à divisions linéaires chez *C. blakei*) (21 septembre 1997 pour les deux populations).

Plante méconnue, indiquée rare en Aveyron.

Un premier exemplaire isolé, confirmé par C. BERNARD, avait été trouvé dans les mêmes conditions, fin août 1997, le long de la D 911, au début de la ligne droite qui franchit une roche blanche cristalline (non loin de La Périère), sur le côté gauche de la route, au milieu d'autres conyzas (*C. bonariensis*, *C. canadensis*), un kilomètre avant la première population.

### Charente

Contribution de : Yves BARON

➤ *Carex pallascens*

- Braconne, le Gros Fayant, parcelle 161, 28 avril 1997.

➤ *Sanguisorba officinalis*

- Saint-Yriex, Grande prairie, avec *Cirsium tuberosum*, *Euphorbia villosa*, *Senecio aquaticus* subsp. *aquaticus*, *Thalictrum flavum*. Ce site à Râle des Genêts est en cours d'acquisition par le Conservatoire des espaces naturels, 12 septembre 1997.

➤ *Ulmus glabra*

- Braconne, Grande Fosse, avec *Tilia platyphyllos* s. l. et *Carex digitata*, représentant un rudiment de tillaie-acéraie sur éboulis calcaires mieux exprimé dans le nord de la France, 28 avril 1997.

Contribution de : J.-F. BEAUVAIS, R. BÉGAY, G. CHERGUI, Ch. YOU

➤ *Aceras anthropophorum*

- Juillaguet, à 1 km au nord du bourg, berme et fossé longeant un bois (mai 1997).

➤ *Althaea hirsuta*

- Blanzac, à l'ouest du bourg, bord de la route Barbezieux-Blanzac (avril 1997).

➤ *Anchusa azurea*

- Gurat, talus surplombant le sentier pédestre près du hameau de Puyrateau (mai 1997).

➤ *Argyrolobium zanonii*

- Saint-Félix, 1 km au sud du bourg, sur un petit coteau pierreux en haut de talus, bord de la D 20 (mai 1997).

- *Astragalus monspessulanus*
    - Roulet, talus pierreux, bord de la D 22 (avril 1997).
  - *Cardamine impatiens* subsp. *impatiens*
    - "Le Gros Roc", la Braconne (Rivière) (mai 1997).
  - *Cephalanthera longifolia*
    - Saint-Félix, lisière de pré-bois (mai 1997).
  - *Cephalanthera rubra*
    - Saint-Félix, coteaux calcaires (mai 1997).
  - *Chamaecytisus supinus*
    - Juillaguet, 1 km au nord du bourg, fossé ouest, en contrebas de la D 19 (mai 1997).
  - *Coeloglossum viride*
    - Carrefour de la D 19 au lieu-dit "La Chèvre Blanche" (mai 1997).
- [Note de A. T. : cette station se maintient depuis au moins 25 ans, puisque je l'ai vue pour la première fois le 6 mai 1972 ; elle m'avait été signalée par J. DELAMAIN]
- *Crepis pulchra*
    - Gurat, talus du sentier pédestre près du hameau de Puyrateau (mai 1997).
  - *Dactylorhiza elata* subsp. *sesquipedalis*
    - "Le Mouyaud" (Saint-Amant de Montmoreau), prairie humide (juin 1997).
- [Note de A. T. : même remarque que celle concernant *Coeloglossum viride* : à la suite de J. DELAMAIN, j'ai pu observer cette plante, au Mouyaud, il y a plus de 25 ans]
- *Epipactis helleborine*
    - Saint-Félix et Gurat, sous-bois à chêne pubescent (mai 1997).
  - *Epipactis muelleri*
    - Saint-Félix et Gurat, sous-bois à chêne pubescent ; mis en évidence par Guillaume BILLET, de Saint-Félix (juin 1997).
  - *Epipactis palustris*
    - Saint-Amant de Montmoreau, prairie humide (juin 1997).
  - *Galium odoratum*
    - "Le Gros Roc", la Braconne (Rivière) (mai 1997).
  - *Gladiolus italicus*
    - Montmoreau, à l'ouest d'un talus bordant la D 24, en limite de cultures (mai 1997).
  - *Hypericum montanum*
    - "Le Gros Roc", la Braconne (Rivière) (mai 1997).
  - *Inula salicina* subsp. *salicina*
    - Juillaguet, D 19, en bordure de bois (mai 1997).
  - *Laburnum anagyroides*
    - "Le Mouyaud" (Saint-Amant de Montmoreau) (mai 1997).
- [Note de A. T. : l'arbuste se maintient sur ces coteaux depuis plusieurs dizaines d'années]
- *Limodorum abortivum*
    - Saint-Félix, bord de la route de Saint-Félix à Chalais (mai 1997).
  - *Nigella damascena*
    - Gurat, hameau de Puyrateau, talus du sentier pédestre longeant les coteaux (mai 1997).
  - *Ophrys santonica* Mathé et Melki
    - "Les Bouchauds" (Saint-Cybardeaux) (août 1997).
  - *Orchis militaris*
    - Juillaguet, bord de la D 119 (mai 1997).
  - *Orchis xjacquintii* (*O. militaris* × *purpurea*)
    - Saint-Félix, coteaux (mai 1997).

- *Phyteuma* cf. *orbiculare*
    - Juillaguet, bord de la D 19, en bordure de bois (mai 1997).
  - *Serapias lingua*
    - Carrefour de la D 19 au lieu-dit "La Chèvre Blanche" (mai 1997).
- [Note de A. T. : même station, et même remarque que pour *Coeloglossum viride*]
- *Solidago graminifolia*
    - Juillaguet, 1 km au nord du bourg, clairière du bois de chênes pubescents et de pins : 1 ha entièrement couvert par la plante !
  - *Stachelina dubia*
    - "Chez Néreau" (Saint-Félix) (mai 1997).

Contribution de : Jean TERRISSE

- *Avenula marginata* subsp. *sulcata* (= *A. lodunensis* subsp. *lodunensis*)
  - Saint-Romain, vers la Font de Mondoux, AC en lisière de pinède à Pin maritime (17 juillet 1997). Revue également cette année en deux localités où elle avait déjà été notée : bois de Chantemerle (Condéon) et Brandes de Jallevert, le long de la D 21 (Deviat).
- *Betula pubescens* subsp. *pubescens*
  - Brigueuil, étang de Roudareix, pas rare dans la tourbière boisée de la rive sud (24 juillet 1997).
- *Campanula patula* subsp. *patula*
  - Médillac, carrière vers le Rocher, avec *Equisetum xmoorei*, *Drosera rotundifolia*, déjà signalés dans une précédente contribution (16 juillet 1997).
  - Condéon, Bois de Chantemerle, AC dans l'ourlet de la chênaie calcifuge (16 juillet 1997).
  - Saint-Romain, pas rare sur les talus des chemins traversant les landes (17 juillet 1997).

Cette espèce, proposée dans la première version de la Liste Rouge Régionale de la Flore menacée du Poitou-Charentes, ne semble pas si rare et devra probablement être déclassée : elle se rencontre en effet çà et là dans les ourlets calcifuges de la partie charentaise de la Double, où elle peut être localement abondante ; elle semble par contre se raréfier dans l'extrémité occidentale (partie Charente-Maritime) de cette petite région naturelle, où elle atteint toutefois Bussac.
- *Campanula rotundifolia*
  - Montrollet, Etang de la Négeade, quelques pieds fleuris sur la levée en bout d'étang. Il s'agit ici du taxon calcifuge (caractérisé morphologiquement ?), de statut peu connu en Poitou-Charentes, alors que le taxon calcicole possède une distribution limitée sur les pelouses xérophiles et les falaises calcaires de Charente et de Charente-Maritime (23 juillet 1997).
- *Cardamine flexuosa*
  - Chenon, coteau du Moulin de Roche, une station de 300 pieds sur 5 m<sup>2</sup> en bordure de la Charente, avec *Cardamine impatiens* subsp. *impatiens* (16 avril 1997).
- *Carduus crispus* subsp. *multiflorus*
  - Lichères, coteau de Puychenin, une cinquantaine de pieds en bord de Charente (16 avril 1997).
  - Chenon, coteau du Moulin de Roche, plus d'un millier de pieds dans une coupe récente en bas du coteau boisé (16 avril 1997).

La découverte simultanée de deux importantes stations de cette espèce méconnue fait supposer une répartition moins localisée que ne le laissaient penser les données



récentes. Ce *Carduus* est donc à rechercher systématiquement dans la moyenne vallée de la Charente, notamment en amont d'Angoulême.

- *Carex binervis*
  - Montravellet, le Sanadie de la Lande, une station (23 juillet 1997).
- *Carex laevigata*
  - Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang au nord-est de l'Age, environ 50 pieds (24 juillet 1997).
  - Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang dans une combe au nord d'Etagnac, plus d'une centaine de pieds (24 juillet 1997).
- *Carex rostrata*
  - Brigueuil, Forêt de Brigueuil, rives d'un étang au nord-est de la Jaraudie, au moins une centaine de pieds (24 juillet 1997).
- *Catananche caerulea*
  - Plaizac, Bois Maton, au moins 200 individus disséminés dans des pelouses en voie d'ourlification dans l'ouest du bois (2 juillet 1997). Présents également dans le bois : *Anthericum ramosum*, *Chamaecytisus supinus*, *Geranium sanguineum*, *Cephalanthera rubra*, *Odontites lutea*, etc...
- *Corrigiola litoralis* subsp. *litoralis*
  - Condéon, Bois de Chantemerle, quelques individus dans la zone de marnage d'une petite mare récente (16 juillet 1997).
- *Drosera rotundifolia*
  - Brigueuil, Forêt de Brigueuil, une colonie de plus d'un millier de pieds en bordure d'un petit étang situé à l'ouest du Grand Etang de la Boulonnie (24 juillet 1997).
- *Elatine hexandra*
  - Brigueuil, Etang de Brigueuil, forme des colonies denses en eaux peu profondes, où il fleurit abondamment sous 20 cm d'eau (23 juillet 1997).
- *Eleocharis ovata*
  - Montravellet, étang des forges du Bois Belet, 10 pieds sur les vases exondées d'un étang en voie d'assèchement (23 juillet 1997).
- *Epilobium angustifolium*
  - Montravellet, le Sanadie de la Lande, 3 pieds en bordure de chemin (23 juillet 1997).
- *Epilobium palustre*
  - Montravellet, Etang de la Nègeade, pas rare sur les rives tourbeuses de l'étang, avec *Viola palustris* subsp. *palustris*, *Potentilla palustris*, etc...) (23 juillet 1997).
- *Euphrasia nemorosa*
  - Brigueuil, Forêt de Brigueuil, une cinquantaine de pieds dans une pelouse calcifuge pionnière sur la bonde récemment "décapée" d'un petit étang situé à l'ouest du Grand étang de la Boulonnie (24 juillet 1997).
- *Exaculum pusillum*
  - Saint-Romain, vers la Font de Mondoux, une station d'une cinquantaine d'individus dans un chemin défoncé par les véhicules d'exploitation forestière (17 juillet 1997).
- *Festuca tenuifolia*
  - Condéon, Bois de Chantemerle, ourlet de la chênaie calcifuge (16 juillet 1997) ; espèce au statut peu connu en Poitou-Charentes.
- *Galium saxatile*
  - Montravellet, Landes de la Borderie, pas rare sur les chemins et pistes forestières (23 juillet 1997).
  - Brigueuil, Forêt de Brigueuil, prairie maigre en bordure d'un petit étang vers le Grand Genêt (24 juillet 1997).

► *Inula helvetica*

Des prospections plus ou moins systématiques réalisées dans les anciens marais de l'Aume ont permis de trouver de nouvelles stations de cette très rare espèce en aire disjointe, qui n'était connue jusqu'ici que des rives du ruisseau de la Couture (sur les communes d'Oradour et de Saint-Fraigne) :

- Lupsault, rives du Ruisseau du Gouffre des Loges, vers le Moulin de Loraud (30 juin 1997).

- Les Gours, rives du Ruisseau du Gouffre des Loges, vers le Marais de Cornet (30 juin 1997).

► *Leersia oryzoides*

- Montrollet, étang des forges du Bois Belet, quelques pieds sur les vases exondées d'un étang en voie d'assèchement (23 juillet 1997).

► *Ludwigia palustris*

- Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang au nord-est de l'Age, une station d'au moins 500 pieds en queue d'étang (24 juillet 1997).

- Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang dans une combe au nord d'Etagnac (24 juillet 1997).

► *Luzula sylvatica* subsp. *sylvatica*

- Etagnac, Forêt d'Etagnac, une petite station d'1 m2 sous chênaie calcifuge à l'entrée d'une combe au nord d'Etagnac (24 juillet 1997).

► *Menyanthes trifoliata*

- Brigueuil, étang de Roudareix, RR rive sud (vu un seul individu) (24 juillet 1997).

► *Nardus stricta*

- Montrollet, Etang de la Nègeade, quelques pieds en bordure de lande (23 juillet 1997).

- Brigueuil, Etang de Brigueuil, abondant dans une prairie maigre dominant la rive sud-est de l'étang (23 juillet 1997).

- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, rives d'un étang au nord-est de la Jaraudie (24 juillet 1997).

► *Osmunda regalis*

- Chillac, Etang de la Rode, une touffe (17 juillet 1997).

► *Poa chaixii*

- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, une touffe sous chênaie-hêtraie acidophile à l'ouest du Grand étang de la Boulonnie (24 juillet 1997).

► *Potamogeton gramineus*

- Chillac, Etang de la Rode, près d'une centaine d'individus (17 juillet 1997). C'est la première fois que nous rencontrons cette espèce dans la Double.

► *Potentilla palustris*

- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, abondant (plusieurs centaines de pieds) sur les rives d'un étang au nord-est de la Jaraudie (24 juillet 1997).

► *Pyrus cordata*

- Montrollet, Etang de la Nègeade, quelques pieds en bordure de lande (23 juillet 1997).

► *Ranunculus omiophyllus*

- Montrollet, petit étang à proximité de l'Etang de la Nègeade : colonie très dense de plus de 500 pieds formant un groupement très caractérisé avec *Callitriche stagnalis*.

► *Salix aurita*

- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, une vingtaine de pieds en bordure d'un petit étang situé à l'ouest du Grand étang de la Boulonnie (24 juillet 1997).

► *Salix caprea*

- Brigueuil, Forêt de Brigueuil, un pied dans une coupe (24 juillet 1997).

- *Trifolium patens*
  - Brigueuil, Etang de Brigueuil, R dans une prairie maigre en bordure de l'étang (23 juillet 1997).
- *Utricularia australis*
  - Médillac, carrière vers le rocher (16 juillet 1997).
  - Brigueuil, Forêt de Brigueuil, petit étang vers le Grand Genêt, environ 300 pieds (24 juillet 1997).
- *Viola palustris* subsp. *palustris*
  - Brigueuil, Etang de Roudareix, rive sud, avec *Wahlenbergia hederacea* et *Carex rostrata* (24 juillet 1997).
- *Wahlenbergia hederacea*
  - Brigueuil, Etang de Brigueuil, moins d'une centaine de pieds dans une prairie humide (bas-marais acide) située au nord de l'étang (23 juillet 1997).
  - Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang au nord-est de l'Age, environ 200 pieds (24 juillet 1997).
  - Etagnac, Forêt d'Etagnac, petit étang dans une combe au nord d'Etagnac (24 juillet 1997).

### Charente-Maritime

Contribution de : M. CARRIÈRE

- *Apium inundatum*
  - Saint-Savinien, prairie de Montalet, mare de tonne : abondant (23 avril 1997).
- *Euphorbia palustris*
  - Port-d'Envaux, la Palue, près du viaduc de la Charente : quelques pieds (8 avril 1997).
- *Hippuris vulgaris*
  - Port-d'Envaux, pré de l'Aubrée, mare prairiale : abondant (4 avril 1997).
- *Lathraea squamaria*
  - Archingeay, lieu-dit Grand Village, en sous-bois près d'une source rejoignant le ruisseau Le Pépin : plusieurs dizaines de pieds (5 mars 1994, revue le 10 avril 1997).
- *Lathyrus pannonicus* subsp. *asphodeloides*
  - Nantillé, Les Patrières : abondant (19 avril 1997).
- *Orchis militaris*
  - Taillebourg, Le Bouron, sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée: une trentaine de pieds (9 mai 1997).
- *Ranunculus ophioglossifolius*
  - Saint-Savinien, prairie de Montalet (23 avril 1997).
  - Saintes, marais de Narcejac, à Port Berteau (29 avril 1997).
  - Cabariot, prairie de Saint-Clément, au nord de la voie ferrée (30 avril 1997).

Contribution de : Ch. LAHONDÈRE et R. DAUNAS

- *Adonis flammea* :
  - Breuil-Magné ; quelques pieds en bordure de moissons près de la Cabane de Moins. Mai 1997. Cet *Adonis* a des sépales pourvus de poils blancs à leur face inférieure et une dent arrondie derrière le bec de l'akène, d'où une échancrure entre la dent et le bec. J. LLOYD dit cette espèce "pas commune ; ça et là en Charente-Maritime et Deux-Sèvres". C'est une espèce des moissons calcaires.

- *Artemisia alba* :
  - Le Douhet, près du Grand Roc, en lisière de la chênaie pubescente. Mai 1995. Quelques stations éparses sont connues depuis très longtemps sur les communes de Le Douhet, Saint-Vaize et Taillebourg. Cette Armoise est beaucoup moins commune en Charente-Maritime qu'en Charente. J. LLOYD la disait commune dans les "carrières et rochers de Saint-Vaize à Taillebourg". Elle s'est sans doute raréfiée.
- *Asphodelus albus* subsp. *albus* :
  - Juicq, dans les bois de Château-Gaillard, où elle est rare. Mai 1995.
- *Blackstonia perfoliata* subsp. *imperfoliata* :
  - Grand-Village-Plage à l'île d'Oléron, aux Allassins ; sables humides d'une dépression de l'arrière-dune, quelques pieds. Juin 1997.
- *Calamintha nepeta* subsp. *glandulosa* :
  - Taillant, à l'Aubrée (entre Grand-Jean et Les Nouillers). Localisé en plusieurs points mais pas abondant. Ourlet forestier et bord de la route. Octobre 1995.
- *Carex digitata* :
  - Saint-Savinien, bois de Chadin, entre Chadin et les Auzes. Mai 1996.
- *Carex distans* :
  - Grand-Village-Plage à l'île d'Oléron, aux Allassins ; plusieurs touffes sur les sables humides de l'arrière-dune. Juin 1997.
- *Cistus salvifolius* :
  - Juicq, entre Etray et Le Douhet, au bord de la route ; forme un manteau bas d'une lisière de chêne pubescent. Avril 1995.
- *Crataegus laevigata* subsp. *laevigata* :
  - Juicq, dans les bois de Château-Gaillard, où l'espèce est beaucoup plus rare que *Crataegus monogyna* subsp. *monogyna*. Avril 1995.
- *Crepis bursifolia* :
  - Angoulins, à la Pointe du Chay, pelouse sèche. Mai 1996.
- *Crepis nicaeensis* :
  - Juicq, dessous Château-Gaillard près du ruisseau. Avec *Crepis capillaris* mais beaucoup plus rare. *Crepis nicaeensis* a des tiges et des feuilles hérissées de poils et les bractées externes de ses capitules sont étalées. *Crepis capillaris* est glabre et les bractées externes de ses capitules sont dressées. 1995.
- *Crypsis aculeata* :
  - Bordure d'une petite dépression allongée dans les Prés des Aiguières, à Marans. Individus nombreux mais très localisés dans ces prés. Avec G. DENIS. Août 1997.
- *Epipactis muelleri* :
  - Juicq, dans les bois de Château-Gaillard, en lisière. Quelques pieds. Août 1995.
- *Festuca rubra* subsp. *litoralis* :
  - Saint-Bonnet-sur-Gironde au Port de Conac, vases de l'estuaire de la Gironde. Septembre 1997. M. KERGUÉLEN et F. PLONKA situent la limite sud de cette plante "à Royan (à peu près)" ; cette limite doit donc être reportée plus au sud.
- *Inula helenium* :
  - Marans, marais de Landelène. 12 à 15 pieds près d'une ancienne ferme. Avec G. DENIS. Juillet 1997.
- *Leontodon hispidus* subsp. *hispidus* :
  - Juicq, Château-Gaillard. Assez commun dans les pelouses sèches. J. LLOYD cite cette plante "ça et là, arrondissement de Saint-Jean d'Angély".
- *Melampyrum cristatum* :
  - Juicq, Château-Gaillard. Ourlet de la Chênaie pubescente, pas commun. Mai 1995.

- *Mentha longifolia* :
  - Juicq, Château-Gaillard. Cette menthe n'est pas rare dans la vallée, sous le château, en bordure et dans le ruisseau. Mai 1995.
- *Ononis pusilla* :
  - Juicq, Château-Gaillard. Pelouses sèches. Quelques pieds.
- *Oenanthe aquatica* :
  - Breuil-Magné, près de la Cabane de Moins, quelques pieds dans l'eau d'un fossé. Mai 1997.
- *Oenanthe foucaudii* :
  - Marans, marais de Landelène. Quelques pieds. Avec G. DENIS. Juillet 1997.
- *Plantago major* subsp. *intermedia* :
  - Saint-Bonnet-sur-Gironde, vases du port de Conac. Avec G. DENIS. Septembre 1997. Cette sous-espèce, dont le pétiole est plus long que le limbe (ou égal), qui a un limbe glabre présentant souvent des lobes à sa base, se trouve suivant la Flore de Belgique sur les "sols dénudés, étangs mis à sec, berges et graviers des rivières ... sites peu piétinés et moins rudéralisés que ceux occupés par la subsp. *major*".
- *Puccinellia fasciculata* subsp. *fasciculata* :
  - Marans, marais de Landelène, avec G. DENIS. Juillet 1997. C'est une espèce cespiteuse, dépourvue de stolons, des marais saumâtres, alors que *Puccinellia maritima* est une espèce cespiteuse émettant des stolons feuillés et qui se rencontre dans les marais salés.
- *Potamogeton coloratus* :
  - Juicq, Château-Gaillard, dans le ruisseau sous le château. Mai 1995.
- *Potamogeton lucens* :
  - Breuil-Magné, à la Cabane de Moins, dans l'eau des canaux, avec *Potamogeton crispus* et *Potamogeton pectinatus*, mais beaucoup plus rare que ces derniers. Mai 1997.
- *Ranunculus gramineus* :
  - Saint-Savinien, Clairière du Bois des Gorets. Mai 1996.
- *Veronica austriaca* subsp. *vahlit* :
  - Yves, au nord des Chaudières, entre la route N 137 et la mer. Mai 1996.

Contribution de : Ch. LAHONDÈRE

- *Agrostis curtisii* :
  - Saint-Sornin, "landes de Cadeuil" ; sables et graviers secs, le long des sentiers. Juillet 1996.
- *Carex binervis* :
  - Les Gonds, marais de Langlade, pas commun. Mai 1995.
- *Carex distans* :
  - Angoulins, marais saumâtres. Sans doute s'agit-il de la var. *viçingensis* Gadec. à utricules à bec presque lisse sur le bord externe et à épis plus larges que le type. Mai 1996.
- *Cistus laurifolius* :
  - Saint-Georges d'Oléron, Forêt des Saumonards, station nouvelle située à 1 kilomètre environ à l'ouest de la plage de Boyardville, un peu au nord du sentier longeant le sud de la forêt. Quelques très beaux individus sur environ 200 m<sup>2</sup> dans un secteur "éclairci" par les agents de l'O.N.F. qui ont respecté le ciste et vraisemblablement contribué à sa vitalité actuelle. Septembre 1997.

- *Cytinus hypocistis* subsp. *hypocistis* :
  - Dolus, à la Passe d'Avail ; station déjà connue, mais les individus étaient particulièrement abondants en mai 1995.
- *Dianthus gallicus* :
  - Saint-Georges de Didonne, dans une clairière du **Pino - Quercetum ilicis**, vers le château d'eau de la forêt de Suzac. Octobre 1994.
  - Meschers, sous les pins de la dune boisée des Vergnes, bois transformé par sa propriétaire en parking. Octobre 1994.
 Ces deux stations sont particulièrement menacées.
- *Eleocharis multicaulis* :
  - Saint-Sornin, "landes de Cadeuil", sables argileux humides ; beaucoup moins commun ici que dans les "landes de Montendre". Juillet 1996.
- *Epipactis palustris* :
  - Saint-Sornin, "landes de Cadeuil", réserve S.E.P.R.O.N.A.S., quelques individus mal venus. Juillet 1996.
- *Hainardia cylindrica* :
  - Saint-Laurent de la Prée, Pointe de la Parpagnole sur les alluvions de la Charente. Juin 1996.
  - La Couarde, île de Rê, à l'est du Centre Nautique, dans une dépression recevant de l'eau de mer par infiltration, avec *Parapholis strigosa* ; localisé mais abondant. Juin 1997.
- *Limonium ovalifolium* :
  - Même station, même date.
- *Linaria thymifolia* :
  - Les Mathes, sur la flèche limitant la baie de Bonne Anse ; l'espèce y est en extension vers le sud. Cette flèche correspond à la limite nord du **Sileno thorei - Ammophiletum** dont la linaria est l'une des caractéristiques. Juillet 1997.
  - La Tremblade, à la Pointe Espagnole, où la plante, peu abondante et localisée, se trouve à sa limite nord sur les côtes charentaises continentales. Juillet 1997.
- *Panicum capillare* :
  - Royan, boulevard Garnier ; quelques pieds isolés dans les parterres. Août 1996.
- *Phillyrea latifolia* :
  - Saint-Georges d'Oléron, forêt des Saumonards avec *Cistus laurifolius* (voir ci-dessus). Un très bel individu qui a profité de l'éclaircissement de la forêt mais qui avait beaucoup souffert auparavant. Septembre 1997.
- *Plantago arenaria* :
  - Saint-Trojan, à l'île d'Oléron, sables de la baie de Gatseau. Juin 1997.
- *Prunus mahaleb* :
  - Avy ; manteau d'un bois à *Pirus nigra*. Avec Ch. YOU. Mai 1997.
- *Ranunculus ophioglossifolius* :
  - Royan, marais de Pousseau, à l'ouest de la rocade. Très localisé. Mai 1996.
  - Breuil-Magné, à la Cabane de Moins. Abondant. Mai 1997.
- *Ranunculus trilobus* :
  - Saint-Denis d'Oléron, champ en friche à la Pointe de Chassiron. Mai 1995.
- *Scirpus lacustris* subsp. *tabernaemontani* :
  - Royan, marais de Pousseau, en bordure des canaux de la partie du marais située à l'ouest de la rocade. Mai 1996.
- *Scorzonera hirsuta* :
  - Avy, assez commun dans les pelouses du **Catanancho - Festucetum timbalii**. Avec Ch. YOU. Mai 1997.

➤ *Senecio inaequidens* :

- Saint-Georges de Didonne, même station que *Dianthus gallicus*, voir ci-dessus. Mai 1994.

➤ *Silene uniflora* subsp. *thorei* :

- Saint-Palais sur Mer, dune de la Grande Côte : cette endémique a été considérée comme ayant disparu de cette station ; en 1997 elle est au contraire très abondante, l'évolution de la population s'est donc inversée. Juin 1995, 1996, 1997.

- Les Mathes, sur la flèche limitant la baie de Bonne Anse, où la plante semble en extension.

Le silène de Thore était autrefois très commun (LLOYD) ; il est considéré comme une espèce en danger (tome 2 du Livre Rouge National, en préparation).

➤ *Verbascum sinuatum* :

- Royan, marais de Pousseau ; très rares individus en bordure d'un sentier de la partie occidentale du marais. Mai 1996.

➤ *Vivia bithynica* :

- Royan, bordure sud du marais de Pousseau. Mai 1996.

Contribution de : P. LE GALL

Les notes qui suivent concernent toutes deux l'île de Ré.

➤ *Hyoscyamus niger* :

- Un pied qui a maintenant fini de fleurir dans le creux du bord de la route 735, entre le carrefour de Loix et le marchand de vêtements (XS 1818). Cette zone a été nettoyée l'hiver dernier, me semble-t-il, ce qui a sans doute favorisé une germination. Mais d'où vient la graine ? (début juillet 1997).

Note de A.T. : Je n'avais jamais rencontré sur l'île la Jusquiame, qui jadis ne devait pas être rare, si l'on en croit LLOYD : "AC calc. et région maritime". J'ai vu le pied ci-dessus en place début septembre 1997 ; quoique sec il était encore bien reconnaissable, et il avait commencé à répandre quelques-unes de ses innombrables graines. Cette plante figure une seule fois auparavant dans les "contributions", pour la région Poitou-Charentes : *Bull. S.B.C.O.* n°16, p.132 : 2 pieds au port du Douhet (17), Jean TERRISSE, 1984.

➤ *Zostera noltii*

- Cette zostère est très fréquente en place dans les baies de la côte nord. Elle couvre de grandes surfaces dans tous les secteurs du Fier d'Ars, ainsi que dans la Fosse de Loix, presque jusqu'à Saint-Martin. Elle est très présente sur les plages de La Clavette et de l'Arnerault à La Flotte (XS 2916). Elle couvre de grandes surfaces sur une bonne partie ouest de la plage nord de Rivedoux (XS 3313 surtout).

C'est cette espèce que les Bernaches cravant recherchent en priorité lorsqu'elles arrivent pour l'hivernage, et avant qu'elles ne passent sur les "champs" d'algues vertes de la côte sud (Entéromorphes et Ulves).

Contribution de : André TERRISSE

Les notes qui suivent concernent toutes l'île de Ré.

➤ *Berberis vulgaris*

- Un beau pied, robuste, très rameux, à proximité du carrefour giratoire au sud de La Flotte (Commune de La Flotte, XS 2815, 8 octobre 1997).

➤ *Boussingaultia cordifolia*

- Abondant, en bordure de la forêt de la Combe à l'Eau, dans un terrain récemment

clôturé et planté de robiniers (Commune d'Ars-en-Ré, XS 1319, 1 juin 1997). Les longues tiges rampantes ne fleuriront qu'à l'automne (octobre).

► *Convolvulus lineatus*

- Quelques pieds en rebord de falaise au-dessus de la plage du Marchais (au nord des Portes-en-Ré, XS 1523, 10 octobre 1997). A cette époque, la plante n'est évidemment visible que par ses rosettes.

► *Cynanchum acutum*

- Sur la falaise au-dessus de la plage du Marchais (au nord des Portes-en-Ré, XS 1523, 10 octobre 1997).

► *Glycyrrhiza glabra*

- « Existe toujours à la Couarde à l'emplacement où je l'avais trouvée dans les années 70. Des maisons et un rond-point giratoire sont apparus, mais la réglise est restée (juillet 1997). » (Communication écrite de J.-M. TISON).

► *Limonium ovalifolium* subsp. *gallicum*

- Base nautique de La Couarde, dans un petit bassin abandonné, en bordure d'un chemin à l'écart de la piste cyclable (Commune de La Couarde-sur-Mer, XS 2118, 24 juin 1997). Peuplement dense au sein duquel on note quelques pieds de *Limonium vulgare* et des plaques de *Frankenia laevis*.

Dans mon Inventaire de la Flore de Ré, j'avais attribué cette station à *Limonium auriculae-ursifolium* subsp. *auriculae-ursifolium* ; persuadé que j'étais alors que *L. ovalifolium* est uniquement une plante des falaises littorales (comme dans sa station classique de l'île d'Aix), je m'étais contenté d'un examen superficiel.

Mais en novembre 1994, J.-M. TISON m'informait qu'il avait trouvé, à la Base Nautique de La Couarde, en juillet 1977, *L. ovalifolium*, ajoutant qu'il était sûr de la détermination. Nous avons vérifié qu'il s'agissait de la même station. Une nouvelle visite en juillet 1997 lui a permis de constater qu'en 20 ans le peuplement s'était étendu.

► *Lophochloa cristata* (= *Koeleria phleoides*)

- Base nautique de La Couarde, sur la berme de la piste cyclable (Commune de La Couarde-sur-Mer, XS 2118, 30 mai 1997).

- Sur la berme de la "Montée des Prises", qui relie la D 735 au Bois Henri IV (Commune de La Couarde-sur-Mer, XS 1917, 2 juin 1997).

Cette espèce méditerranéenne semble se répandre sur Ré.

► *Polypogon viridis* (= *Agrostis verticillata*)

- Adventice dans un pot de pélagonium aux pépinières de la Serre des Ouches (La Noue, commune de Sainte-Marie-de-Ré, XS 2813, 28 mai 1997). Ce printemps, quelques pieds sont apparus dans la cour où le pot de pélagonium avait été placé, à Sainte-Marie (XS 3012). Dès l'époque de LLOYD, il y a donc plus d'un siècle, cette espèce du Sud-Est était naturalisée dans quelques ports bretons et, récemment encore, plusieurs localités bretonnes ont été citées (Cf. *Erica* 2, p. 69 et 7, p. 65).

► *Silybum marianum*

- Une vingtaine de pieds à Bel-Air, à proximité du carrefour giratoire au sud de La Flotte (Commune de La Flotte, XS 2815, 9 juin 1997).

► *Tragus racemosus*

- Sur la berme, côté est de la route de la Grande Jetée, à proximité du parking de la Patache, à quelques dizaines de mètres de la station précédemment signalée (*Bull. S.B.C.O.* 26, p. 266) (Commune des Portes-en-Ré, XS 1620, 19 septembre 1997). Environ 200 pieds, bien fleuris. Les touffes sont fournies : jusqu'à 15-20 tiges qui parfois s'enracinent sur 1 à 2 cm au-dessus du collet.



Contribution de : Jean TERRISSE

- *Adiantum capillus-veneris*
    - Meschers, une colonie d'au moins 200 individus sur les falaises de la Conche des Cadets (17 juin 1997).
  - *Althaea hirsuta*
    - Talmont, falaise du Pilou, jachères pierreuses (16 juin 1997).
  - *Apera interrupta*
    - Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, quelques pieds sur une pelouse sablonneuse en voie de rudéralisation (station signalée par P. JOURDE, vue J.T. le 14 mai 1997).
  - *Aristolochia rotunda* subsp. *rotunda*
    - Meschers, marais des Barrails, au moins deux stations totalisant plus de 200 pieds (nous avons déjà vu cette espèce dans ce marais en 1984) (15 juin 1997).
  - *Armeria alliacea*
    - Les Mathes, pelouses sablonneuses entre Montravail et la Prise des Landes, plus d'un millier de pieds (24 juin 1997).
  - *Asparagus maritimus*
    - Angoulins, Pointe du Chay, 3 touffes dans un roncier séparant deux parcelles en jachère. Il s'agit de la limite nord absolue pour la petite exclave régionale de cette espèce méditerranéenne en aire disjointe (16 mai 1997).
    - Saint-Georges d'Oléron, en lisière du bois de l'Acheneau, un seul individu (10 juin 1997).
    - Saint-Denis d'Oléron, les Seulières, une touffe en bordure de route (10 juin 1997).
    - Saint-Denis d'Oléron, Falaises de la Vitrierie, une dizaine de pieds dans une pelouse (11 juin 1997).
  - *Blackstonia perfoliata* subsp. *imperfoliata*
    - Les Mathes, Lerpine, quelques pieds dans une pelouse psammo-hygrophile (24 juin 1997).
  - *Coronilla scorpioides*
    - Talmont, falaises de la Roche, au moins une centaine de pieds (15 juin 1997). Vue également ce même mois dans sa localité "classique" des anciennes carrières du Labeur en Oléron, où elle est toutefois beaucoup plus rare (à peine une dizaine de pieds).
  - *Crepis pulchra*
    - Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, quelques individus sur un talus dominant un fossé (14 mai 1997).
  - *Crypsis aculeata*
    - Meschers, marais des Barrails, très abondant localement (plusieurs milliers de pieds) (15 juin 1997).
    - Talmont, marais de Talmont, au moins deux stations, l'une de 100 et l'autre de plus de 200 pieds (15 juin 1997).
- Avec ces nouvelles découvertes, la distribution de cette espèce sur le littoral charentais se précise et s'étoffe, puisque nous connaissons désormais le *Crypsis* de tous les grands marais arrière-littoraux de Charente-Maritime : marais de Rochefort, marais de l'estuaire de la Charente — qui constitue le "bastion" régional de l'espèce avec plus d'une dizaine de stations —, marais de Brouage, marais de l'estuaire de la Gironde ; le *Crypsis* reste toutefois paradoxalement encore à découvrir en marais de Seudre, marais saumâtre a priori pourtant favorable à l'espèce.

- *Cucubalus baccifer*
  - Meschers, marais des Barrails, bord de haie en fond du marais, une petite station (15 juin 1997).
- *Cynanchum acutum*
  - Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, une colonie de plus d'une centaine de pieds sur un enrochement littoral (avec *Crithmum maritimum* !) (14 mai 1997).
- *Echium asperrimum*
  - Talmont, falaises du Pilou, quelques pieds (16 juin 1997).
  - Meschers, pelouses sommitales de la Conche des Cadets, une quinzaine de pieds (17 juin 1997).
- *Epipactis phyllanthes*
  - Saint-Georges d'Oléron, Bois de l'Acheneau, quelques pieds (10 juin 1997).
  - Saint-Georges de Didonne, Forêt de Suzac, 2 pieds sur le talus de la rocade (17 juin 1997).
  - Saint-Trojan les Bains, Forêt de Saint-Trojan, quelques pieds sur un talus sablonneux bordant la route d'accès à la plage ; également présent sur les talus de la piste cyclable (10 juin 1997).

Espèce affectionnant manifestement les milieux neufs, ou, tout au moins, susceptible de les coloniser rapidement.
- *Euphorbia serrata*
  - Angoulins, Pointe du Chay, entre 100 et 300 pieds en bordure d'une jachère de céréales (station signalée par P. JOURDE, vue J. T. le 16 mai 1997). Il s'agit actuellement de la station la plus importante sur le littoral charentais pour cette espèce méditerranéenne en aire disjointe.
- *Galium murale*
  - Saint-Denis d'Oléron, vers Chardonnière, au moins une cinquantaine d'individus (10 juin 1997).
- *Galium neglectum*
  - Saint-Pierre d'Oléron, dunes de la Menounière, quelques dizaines de pieds (10 juin 1997).
- *Hainardia cylindrica*
  - Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrierie, plus d'un millier de pieds sur les pelouses piétinées autour des bancs mis en place sur les terrains du département (11 juin 1997).
- *Hordeum hystrix* (= *H. maritimum* subsp. *gussoneanum*)
  - Meschers, marais des Barrails, abondant en fond du marais (15 juin 1997).
- *Hypochoeris maculata*
  - Thairé, bois du Jaud, quelques individus dans un ourlet interne de chênaie pubescente (23 juin 1997).
- *Linaria arenaria*
  - Saint-Denis d'Oléron, dunes vers Chardonnière, 34 pieds (10 juin 1997).

Vu également ce même mois deux localités où l'espèce avait déjà été notée : dunes du Lizay sur l'île de Ré (près d'une centaine de pieds en deux micro-stations) et dunes des Seulières sur Oléron (une quinzaine de pieds).
- *Linum strictum* subsp. *strictum*
  - Angoulins, Pointe du Chay, quelques dizaines de pieds dans les pelouses rases au bord des falaises (16 mai 1997).
  - Talmont, falaises de la Roche, au moins 50 pieds (15 juin 1997).
  - Talmont, falaises du Pilou, abondant : plus de 500 pieds (16 juin 1997).
  - Mortagne, Combe d'Armel, quelques pieds (16 juin 1997).

- Puyrolland, Terrier de Puyrolland, pas rare dans les pelouses du **Mesobromion** pas encore trop "ourliifiées" (22 juillet 1997).

➤ *Lophochloa cristata* (= *Rostraria* c.)

- Les Portes-en-Ré, forêt du Lizay : quelques pieds en bordure d'un parking récemment aménagé (21 mai 1997).

- Meschers, pointe nord de la Conche des Cadets, quelques pieds (17 juin 1997).

➤ *Lythrum tribracteatum*

- Talmont, marais de Talmont, une station de 250 pieds (15 juin 1997).

La découverte du *Lythrum* en marais de l'estuaire de la Gironde étend considérablement vers le sud l'aire régionale de cette rare espèce, que nous n'avions vue jusqu'à ce jour qu'en marais de Rochefort et dans l'estuaire de la Charente ; des prospections complémentaires seront à effectuer pour combler les lacunes géographiques, notamment en marais de Brouage, où les biotopes favorables à cette espèce ne manquent pas.

➤ *Najas marina*

- La Gripperie-Saint-Symphorien, étang du château de Blénac, abondant (9 octobre 1997).

➤ *Neotostema apulum*

- Angoulins, Pointe du Chay, station classique — et unique localité du Poitou-Charentes ! — : 590 pieds fleuris comptés cette année (16 mai 1997).

➤ *Ononis reclinata*

- Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrierie, quelques pieds (11 juin 1997).

➤ *Ophrys santonica* Mathé et Melki

- Puyrolland, Terrier de Puyrolland, pelouses du **Mesobromion**, au moins 20 pieds en 3 micro-stations (22 juillet 1997).

➤ *Orchis laxiflora* subsp. *palustris*

- Les Mathes, Rivière de Cravans, un unique pied dans une prairie tourbeuse (24 juin 1997).

➤ *Papaver hybridum*

- Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrierie, quelques pieds apparus sur les terres remuées lors de travaux en lisière des terrains acquis par le département (11 juin 1997).

➤ *Poa infirma*

- Angoulins, Pointe du Chay, une petite station à proximité d'un parking récemment aménagé (3 avril 1997).

➤ *Potamogeton coloratus*

- Les Mathes, Rivière de Cravans, plus d'un millier de pieds dans les fossés et étangs sur sol tourbeux (24 juin 1997).

➤ *Scabiosa atropurpurea*

- Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrierie, plusieurs centaines d'individus sur les pelouses et en bordure de route (11 juin 1997).

➤ *Scorpiurus muricatus*

- Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrierie, une centaine de pieds (11 juin 1997).

Vu également ce même jour en sa localité "classique", aux anciennes carrières du Labeur.

➤ *Scorzonera hirsuta*

- Avy, coteau au sud de Le Renclos, 2 pieds en bordure de saignées produites par des motos tout-terrain (15 mai 1997).

- Saint-Georges de Didonne, pelouses calcicoles dans une clairière du **Phillyreo** - **Quercetum ilicis** de la face sud de la Pointe de Suzac, 4 pieds (17 juin 1997).

- Puyrolland, Terrier de Puyrolland, au moins 200 pieds dans une pelouse-ourlet envahie par le Brachypode (22 juillet 1997).

➤ *Scorzonera hispanica*

- Thairé, Bois du Jaud, plusieurs dizaines d'individus sur le talus de la D113, en compagnie de *Tanacetum corymbosum* subsp. *corymbosum*, *Geranium sanguineum*, *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*, etc... (23 juin 1997).

- Puyrolland, Terrier de Puyrolland, un unique individu en bordure de haie (22 juillet 1997).

➤ *Scorzonera laciniata*

- Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, au moins une centaine de pieds sur une pelouse sablonneuse rudéralisée (digue) (14 mai 1997).

➤ *Senecio doronicum* subsp. *ruthenensis*

- Thairé, Bois du Jaud, 33 individus recensés sur le talus de la route et le long d'un chemin pénétrant le bois (23 juin 1997).

Il s'agit de la troisième station régionale actuellement connue pour cette rare endémique française. Comme souvent en botanique de terrain, sa découverte doit beaucoup au hasard, puisqu'elle est le fait d'A. DOUMERET, apprenti récent en botanique, qui m'a apporté un exemplaire d'une "composée à ligules jaunes" qu'il n'arrivait pas à déterminer !

➤ *Stipa pennata* subsp. *pennata*

- Meschers, pointe nord de la Conche des Cadets, au moins une quinzaine de touffes sur des vires inaccessibles ; il s'agit de la station classique, connue depuis plus d'un siècle (unique localité du Centre-Ouest) (17 juin 1997).

➤ *Stratiotes aloides*

- Les Mathes, Rivière de Cravans, quelques individus dans un fossé à proximité d'un étang "aménagé", probablement introduit à partir de la station classique du Marais de Bréjat (découvert par P. JOURDE et J.-M. THIRION, vu J.T. le 24 juin 1997).

➤ *Taraxacum palustre*

- Les Mathes, Rivière de Cravans, RR dans une prairie tourbeuse (24 juin 1997).

➤ *Teucrium scordium* subsp. *scordioides*

- Les Mathes, Rivière de Cravans, abondant dans une prairie tourbeuse (24 juin 1997).

➤ *Torilis* cf. *webbii* Jury

- Saint-Denis d'Oléron, falaises de la Vitrierie, plus d'une centaine de pieds (11 juin 1997).

La découverte récente de ce taxon méridional en Bretagne (voir E.R.I.C.A. n°4, octobre 1993, p. 23) nous a incité à un examen plus attentif des *Torilis* gr. *nodosa* présents sur le littoral de Charente-Maritime. La découverte au printemps de populations d'individus homéocarpes sur la côte ouest de l'île d'Oléron, en compagnie d'autres espèces à forte tonalité thermophile (*Scorpiurus muricatus*, *Ononis reclinata*, *Asparagus maritimus*, etc...), nous laisse penser que ce taxon est peut-être présent en région Poitou-Charentes ; néanmoins, les caractères distinctifs autres que ceux des carpelles nous paraissant peu nets, il sera nécessaire de revoir d'autres individus et de les comparer avec des échantillons-types pour confirmer — ou infirmer — la présence du *Torilis webbii* sur le littoral centre-atlantique.

➤ *Trifolium patens*

- Meschers, Marais des Barrails, pas rare dans le fond du marais (15 juin 1997).

➤ *Trigonella gladiata*

- Châtellaillon, Saint-Jean des Sables, deux pieds sur une pelouse sablonneuse en voie de rudéralisation (station signalée par P. JOURDE, vu J.T. le 14 mai 1997).

- Angoulins, Pointe du Chay, un unique individu (16 mai 1997). Station déjà connue mais "à éclipses", la plante ne fleurissant pas tous les ans.

- *Utricularia vulgaris*
  - Les Mathes, Rivière de Cravans, au moins 200 pieds dans un des étangs sur sol tourbeux (24 juin 1997).
- *Verbascum sinuatum*
  - Talmont, falaises de la Roche, un pied (15 juin 1997).
- *Vicia bithynica*
  - Meschers, Marais des Barrails, une belle colonie en bordure de chemin, en fond de marais (15 juin 1997).
- *Vulpia ciliata* subsp. *ambigua*
  - Saint-Georges de Didonne, Forêt de Suzac, abondant sur les talus de la rocade (17 juin 1997).

### Cher

Contribution de : Thierry GAUTROT

- *Drosera rotundifolia*
  - Commune de Neuilly-en-Sancerre, hameau des Petits ; environ 100 pieds. U.T.M. : DN 73. A 100 mètres de la D 231. (Présence d'un pied d'*Erica tetralix*). Juin 1997.
- *Orchis ustulata*
  - Commune d'Achères, pelouse de la maison forestière des Fougères. U.T.M. : DN 53. Environ 40 pieds (sur 1 500 m<sup>2</sup> ; accroissement constant de la population depuis 4 ans). Mai-juin 1997.
- *Spiranthes spiralis*
  - Commune de Méry-ès-Bois, forêt domaniale de Saint-Palais. U.T.M. : DN 53, en bordure du périmètre sur la ligne séparative de parcelle 70-76. Photos et localisation envoyées à la Soc. Fr. d'Orchidophilie. 1 pied.
  - Un pied dans la pelouse de la maison forestière des Fougères à Achères. Septembre 1997.
- *Ulmus laevis*
  - Commune de Méry-ès-Bois, forêt domaniale de Saint-Palais. U.T.M. : DN 53, à environ 200 m de la maison forestière des Loges, 1 pied dans l'étage dominant d'un peuplement (âgé d'environ 60 ans) de *Quercus petraea* traité en futaie régulière et 3 pieds dans le même type de peuplement mais plus âgé en bordure de la route forestière des Poteries. Mai 1997.
  - Commune d'Allogny, forêt domaniale d'Allogny. U.T.M. DN 42. Deux pieds en bordure du périmètre de la forêt domaniale, à environ 200 mètres de la route forestière de Belle Borne. Janvier 1998.
- *Viscum album* sur *Quercus rubra*
  - Commune d'Allogny, forêt domaniale d'Allogoy. U.T.M. : DN 53, en bordure de la CD 20, 100 m avant le carrefour de la ligne séparative de parcelle 15-24. Mars et novembre 1997.
- *Viscum album* sur *Acer campestre*
  - Commune de Saint-Eloy de Gy, forêt domaniale d'Allogny. U.T.M. : DN 52, canton de la Main Ferme. Mars et novembre 1997.

## Corrèze

Contribution de : Eric BRUGEL

➤ *Anogramma leptophylla*

- Abris sous roche gréseux, alt. 150 m, vallon d'orientation nord-est - sud-ouest situé au nord d'un ruisseau longeant l'autoroute A 20, au sud-ouest de Siaurat, commune de Brive (E. B. et I. SCHMIDT, février 1998 ; coord. UTM 31T CK 89). Avec *Adiantum capillus-veneris* et *Asplenium obovatum* subsp. *lanceolatum*.

➤ *Asplenium scolopendrium*

- Digue de l'étang de Sèchemaille, au milieu de blocs ensoleillés, alt. 650 m, commune de Meymac (E. B., juillet 1997 ; coord. UTM 31T DL 34). Station insolite en Haute-Corrèze. Une touffe de petite taille.

➤ *Equisetum sylvaticum*

- Bords de la petite route reliant Cheyssac à la Forêt Noire, alt. 670 m, commune de Neuvis (station découverte par P. GRIMONPREZ et D. MASSON en 1997 ; revue E. B. septembre 1997 ; coord. UTM 31T DL 42). Station relativement étendue, en 2 peuplements de part et d'autre de la petite route dans une saulaie.

- Saulaie marécageuse au sud-ouest de l'Arbre du Renard, alt. 630 m, commune de Sérandon (station découverte par P. GRIMONPREZ et D. MASSON en 1997 ; revue E. B. septembre 1997 ; coord. UTM 31T DL 42). Station plus restreinte que la précédente, 200 tiges stériles environ.

➤ *Lycopodiella inundata*

- Étang de l'Ozéloux, alt. 850 m, commune de Bonnefond (S. MORELON, été 1997 ; coord. UTM 31T DL 24).

- Petite dépression tourbeuse et sablonneuse en bordure de chemin, étang de Chabannes, alt. 790 m, commune de Tarnac (E. B. et J. BOEUFGRAS, août 1997 ; coord. UTM 31T DL 25). Station très limitée de quelques tiges, avec *Drosera rotundifolia*.

➤ *Lycopodium clavatum*

- Bois clair de pins sylvestres en bordure de l'étang du Pilard, alt. 540 m, commune de Clergoux (E. B. et L. CHABROL, avril 1997 ; coord. UTM 31T DL 11). Peuplement de plus de 50 mètres carrés, stérile.

## Corse

Contribution de Jean-François MARZOCCHI

➤ *Leucanthemum corsicum* subsp. *corsicum*

- Massif du Rinosu, Monte Rinosu, versant nord-est, arête s'étendant du replat de Pozzolu à celui de Capannelle, commune de Ghisoni ; fruticée naine du **Berberido - Genistetum lobelioidis**, vers la limite des étages montagnard et subalpin ; sur le bord du sentier conduisant au lac de Bastani, non loin et en aval du piton rocheux, à 1 750 m d'altitude environ ; quelques exemplaires en fleurs passent presque inaperçus, à l'abri d'une plaque de nanophanérophytes et de chaméphytes épineux, végétation constituée principalement de *Juniperus communis* subsp. *alpina* (= subsp. *nana*) et *Berberis vulgaris* subsp. *aetnensis*. Observation du 17 juillet 1994.

La Marguerite corse, endémique stricte d'origine oro-sud-européenne, est une plante protégée, présente en plus ou moins grand nombre sur la plupart des

principaux massifs, de l'étage montagnard au subalpin. La forme *eschenlohrianum* Gamisans (à laquelle semblent appartenir nos plantes), assurant la transition vers le subsp. *fenzlii*, aurait été récoltée dans le massif du Rinosu (voir GAMISANS, *Candollea* 27, 1972 : 194).

### Creuse

Contributions de Michel BOUDRIE, Eric BRUGEL et Isabelle SCHMIDT

#### ➤ *Pilularia globulifera*

- Rives nord-est de l'étang des Landes, alt. 380 m, près de Lussat (M. B., E. B. et I. S., août 1997 ; coord. U.T.M. 31T DM 41). Deux populations de quelques mètres carrés, en bordure de la rive, soit légèrement exondées sur la terre boueuse, soit immergées sous une dizaine de centimètres d'eau et mêlées à des scirpes et des joncs.

- Queues de l'étang de la Bastide, alt. 380 m, également près de Lussat (E. B., I. S. et M. BARATAUD, août 1997 ; coord. U.T.M. 31T DM 41). Beau peuplement de plusieurs dizaines de mètres carrés, sous une quinzaine de centimètres d'eau, en bordure des *Phalaris*.

Contribution de : Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

#### ➤ *Drosera intermedia*

- Plusieurs dizaines d'individus dans la zone humide périphérique de l'extrémité sud du bras nord-ouest du lac de la Vaud-Gelade, observés en septembre 1995. Commune de Royère-de-Vassivière.

### Dordogne

Contribution de : Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

#### ➤ *Gymnocarpium robertianum*

- Moins de cinq individus, observés le 1<sup>er</sup> mai 1997, sur les parois bordant la voie de chemin de fer passant à hauteur de Sybanque. Commune de Sarlat-la-Caneda.

#### ➤ *Pilularia globulifera*

- Extrêmement abondante, formant de vastes tapis, observée en juin 1995, en compagnie de *Littorella uniflora*, *Drosera intermedia*, *Drosera rotundifolia*, *Rhynchospora alba* pour les espèces les plus remarquables, au sein d'un étang et d'une zone tourbeuse du Bois du Tendeix. Commune de Saint-SaudLacoussière.

### Gard

Contributions de : Michel BOUDRIE, Georges et Marie-Françoise MEJEAN

#### ➤ *Asplenium xalternifolium* nothosubsp. *alternifolium*

- Rochers siliceux en bordure de maquis, vallée de la Cèze, rive gauche, en aval du moulin du Roure, alt. 270 m, à 1,5 km au sud-est d'Aujac (M. B., G. M., M.-F. M., mai 1996 ; coord. UTM 31T EK 80). Plusieurs pieds, avec les parents, *A. septentrionale* et *A. trichomanes* subsp. *trichomanes*. Ont été également observés le long de la vallée, dans les rochers siliceux et en lisière de maquis : *Anogramma leptophylla*, *Asplenium*

*onopteris*, *Dryopteris ardechensis* Fraser-Jenkins, *Osmunda regalis*, *Polypodium vulgare* et *Polystichum setiferum*.

➤ *Asplenium xcostei*

- Rochers siliceux en bordure de maquis, vallée de la Cèze, rive gauche, près et en aval du moulin du Roure, alt. 270 m, à 1,5 km au sud-est d'Aujac (M. B., G. M., M.-F. M., mai 1996 ; coord. UTM 31T EK 80). Deux pieds, avec les parents, *A. foreziense* et *A. septentrionale*. **Nouveau pour le département du Gard.**

➤ *Asplenium xsleepiae*

- Rochers siliceux en bordure de maquis, vallée de la Cèze, rive gauche, en aval du moulin du Roure, alt. 270 m, à 1,5 km au sud-est d'Aujac (M. B., G. M., M.-F. M., mai 1996 ; coord. UTM 31T EK 80). Plusieurs pieds, avec les parents, *A. foreziense* et *A. obovatum* subsp. *lanceolatum*.

➤ *Cheilanthes tinaei*

- Murettes de pierres sèches, le long des terrasses situées au-dessus et à l'ouest du Mas-Herm, versant exposé au sud de la vallée du Luech, alt. 250 m, à 700 m au nord-ouest de Peyremale (M. B., G. M., M.-F. M., mai 1996 ; coord. UTM 31T EK 80). En compagnie de *Notholaena marantae* (voir ci-dessous), d'*Anogramma leptophylla* et de plusieurs *Asplenium* : *A. foreziense*, *A. trichomanes* subsp. *trichomanes*, *A. onopteris* et l'hybride *A. xalternifolium* nothosubsp. *alternifolium*.

➤ *Notholaena marantae*

- Murettes de pierres sèches, le long des terrasses situées au-dessus et à l'ouest du Mas-Herm, versant exposé au sud de la vallée du Luech, alt. 250 m, à 700 m au nord-ouest de Peyremale (M. B., G. M., M.-F. M., mai 1996 ; coord. UTM 31T EK 80 ; même localité que celle de *Cheilanthes tinaei* indiquée ci-dessus). A notre connaissance, il s'agirait ici de la deuxième station de cette espèce connue actuellement dans le Gard, la première se situant à Anduze au confluent des Gardons (Cf. AUBIN et BOUDRIE, 1992 : "Catalogue des plantes vasculaires du Gard : Compléments aux Ptéridophytes". *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, **61** (1) : 25-32).

➤ *Ophioglossum azoricum*

- Vallée de la Cèze, rive gauche, en aval du moulin du Roure, alt. 270 m, à 1,5 km au sud-est d'Aujac (découvert en février 1996 par G. M. et M.-F. M. ; revu et confirmé M. B., G. M., M.-F. M., en mai 1996 ; coord. UTM 31T EK 80). Deux populations, dont l'une riche de plusieurs centaines de pieds et sur plusieurs mètres carrés, sur des pelouses rases humides développées sur des plages sablonneuses en bordure de rivière et au pied des rochers siliceux en falaises.

**Nouveau pour le département du Gard.**

Cette station s'ajoute à celles découvertes récemment dans le département de la **Lozère**, en mai 1994 à Cabrespic, commune de Saint-Etienne-Vallée-Française (Cf. BOUDRIE, 1995, *Le Monde des Plantes*, n° 454 : 14-15 ; coord. UTM 31TEJ 68), en mai 1995 à Fabrègues, commune de Saint-Martin-de-Lansuscle (découverte par J. MOLINA, comm. pers. ; coord. UTM 31T EJ 59) et en mai 1996, au Mas-Bonnet, commune du Pompidou (découverte par J. P. MALAFOSSE ; comm. pers. Y. MACCAGNO ; coord. UTM 31T EJ 59). Cet ensemble de populations de ce rare ophioglosse, protégé au plan national, met encore une fois en évidence les influences méditerranéennes et atlantiques nettes de la région des Gardons et souligne l'intérêt et la richesse botanique de cette partie des Cévennes.

➤ *Ophioglossum vulgatum*

- Vallée de la Cèze, rive gauche, en aval du moulin du Roure, alt. 270 m, à 1,5 km au sud-est d'Aujac (M. B., G. M., M.-F. M., mai 1996 ; coord. UTM 31T EK 80). Une population non loin, mais séparée, des populations d'*O. azoricum* (voir ci-dessus).



**Gironde**

Contribution de : Pamela LABATUT

➤ *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii*

- Parc forestier de l'Eau Borde (commune de Canéjan), à 300 m du Pont Palanque, en allant vers le Moulin de Rouillac. De chaque côté du chemin du sous-bois : belle station avec *Cardamine impatiens* subsp. *impatiens* et *Equisetum telmateia* (11 mai 1997).

**Landes**

Contribution de : Marcel ROGEON

➤ *Eleusine tristachya*

- Aire sur l'Adour, gare de marchandises SNCF, abords des voies de garage (29 octobre 1997). Plusieurs dizaines d'épis, en compagnie de *Paspalum dilatatum*. A cette date, l'époque de la maturité est dépassée, et beaucoup de graines sont tombées.

Note de A. T. : C'est également au voisinage immédiat d'une gare, celle de Bédenac (Charente-Maritime), que nous avons trouvé cette espèce le 8 septembre 1974, lors d'une herborisation, dirigée par A. BOURASSEAU, dans la région de Montendre-Bédenac. Seul des participants à cette sortie, G. BOSC connaissait la plante et avait pu l'identifier.

**Loir-et-Cher**

Contribution de : Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

➤ *Epipactis microphylla*

- Un individu fleuri en juin 1995 sur la réserve naturelle de la Grand'Pierre et Vitain, non loin du Petit Vitain et de la Cisse. Commune d'Averdon.

➤ *Pulicaria vulgaris*

- Quelques individus en bordure du Cher, en juillet 1995, au niveau de l'intersection de cette rivière avec la D. 956, à Selles-sur-Cher.

**Lot**

Contribution de : F. ACHARD

➤ *Iberis saxatilis* subsp. *saxatilis*

- Environs de Couzou, flanc sud-est de l'"Échine de l'âne". Population assez importante de plusieurs hectares, sur tout le pierrier qui recouvre le versant. Découvert en février 1996 et revu mainte fois depuis. Détermination confirmée par J.-P. JACOB. Cette espèce n'a été retrouvée nulle part ailleurs dans les vallées de l'Ouyssse et de l'Alzou.

Contribution de : Jean-Pierre JACOB

➤ *Dryopteris affinis* subsp. *affinis*

- Saint-Denis-Catus : une grande touffe le long de la route qui longe le petit ravin au sud de la Garonne (CK 73, 14 mai et 1<sup>er</sup> septembre 1997).

- Etangs du Frau de Lavercantière : deux touffes dans une saussaie longeant le ruisseau en bas de l'étang sud ; avec une population d'*Equisetum telmateia* (CK 64, 29 août 1997). (Confirmé par M. BOUDRIE).

➤ *Dryopteris affinis* subsp. *borreri*

- Touffes disséminées sur les flancs escarpés d'un petit ravin au sud de la Garonne, Saint-Denis-Catus (CK 73, 1er septembre 1997). (Confirmé par M. BOUDRIE).

➤ *Dryopteris carthusiana*

- Etangs du Frau de Lavercantière : dans une saussaie longeant le ruisseau qui alimente l'étang sud ; une dizaine de touffes ; également le long du ruisseau en bas de l'étang sud (CK 64, 29 août 1997) (Confirmé par M. BOUDRIE).

➤ *Dryopteris dilatata*

- Etangs du Frau de Lavercantière : dans une saussaie longeant le ruisseau qui alimente l'étang sud ; deux touffes (CK 64, 29 août 1997) (Confirmé par M. BOUDRIE).

➤ *Dryopteris filix-mas*

- Catus, bois de Salvezou : un exemplaire (CK 63, 18 mars 1997).

- Saint-Denis-Catus. Population disséminée dans un petit ravin au sud de la Garonne (CK 73, 14 mai 1997).

➤ *Equisetum palustre*

- Saint-Denis-Catus, la Brousse. Fossé le long de la D 12 (CK 73, 24 avril 1997).

➤ *Narcissus poeticus* subsp. *poeticus*

- Une cinquantaine d'individus en sous-bois, sur un lapiaz, en bordure de la D 146, donc en milieu apparemment sec, avec *Asphodelus albus* subsp. *albus*. (Caniac-du-Causse, CK 94, 24 mai 1997).

On fera pour cette station de la Brauhnie les mêmes remarques que M. SERONIE-VIVIEN (*Bull. Soc. linn. Bordeaux*, **22** (3), 1994 : 167-174) : *Narcissus poeticus* trouve dans l'argile des anfractuosités du lapiaz humidité et humus ; André TERRISSE, dans une contribution (*Bull. S.B.C.O.*, 1987, **18**, p. 95), avait noté aussi avec étonnement une station "sèche" de ce *Narcissus*, bien différente des stations des prés humides du Limargue.

➤ *Ophioglossum vulgatum*

- Boissières : petite population de 4 individus, en bordure de chênaie-charmaie, sur sol siliceux, près du hameau de Brugas (à 300 m d'une population bien plus importante, reconnue dès 1980, installée dans le même secteur dans une carrière d'argile abandonnée et boisée) (CK 73, juin 1997).

➤ *Polystichum setiferum*

- Quelques pieds disséminés, de petite taille, entre Cènevières et Crégols (CK 92, 13 mars 1997).

- Des centaines de pieds sur les flancs escarpés d'un petit ravin au sud de la Garonne, Saint-Denis-Catus (CK 73, 14 mai 1997).

➤ *Scorzonera hirsuta*

- Trois plantes, sur le bord droit de la D 146, dans la Brauhnie, entre Quissac et Fontanes-du-Causse (CK 94, 24 mai 1997).

### Pyrénées-Orientales

Contribution de : André TERRISSE

➤ *Avenula marginata* subsp. *pyrenaica* (= *A. sulcata*)

- Forêt de la Mathe, où elle est abondante (66, DH 2614 et 2615, 1 550 m, Jean TERRISSE, 20 août 1997).

Cette espèce, réputée atlantique, est probablement proche ici de sa limite orientale.

➤ *Chenopodium foliosum* (= *Blitum virgatum*)

- En Cerdagne espagnole, au col de la Creueta, sur la route qui va de la Molina à Castellar de N'Hug, 1900 m, en haut du talus qui borde la route côté est : un seul pied mais vigoureux et très rameux (une trentaine de tiges) (Jean TERRISSE, 17 août 1997 ; vu, A.T., le 23 août).

L'"Épinard Fraise" était autrefois cultivé, et se rencontrait assez souvent à l'état spontané : selon GAUTIER "AR, vallée de la Têt, Vernet-les-Bains, Montlouis, etc." A ma connaissance, la seule autre découverte récente dans la région est le fait de A. BAUDIÈRE à La Cabanasse (66, DH 2706, 1 480 m, août 1991) : un seul pied également.

➤ *Dianthus armeria* subsp. *armeria*

- Talus près de la piste qui mène de Dorres à N.D. de Belloch (66, DH 1203, 1480 m, 21 juillet 1997). C'est la 2<sup>e</sup> fois seulement que je rencontre cette espèce en Cerdagne (Cf. *Bull. S.B.C.O.* n° 22, p. 241) : une dizaine de tiges.

➤ *Equisetum sylvaticum*

Cette espèce ne figurait pas dans le *Catalogue* de GAUTIER (1898), qui excluait le Capcir. Elle est rare dans les Pyrénées, et n'est pas signalée dans le *Catalogue des plantes vasculaires de l'Ariège* publié en 1991 par L. GUERBY. Il faut certainement atténuer l'appréciation de L. CONILL dans ses *Observations sur la flore des Pyrénées-Orientales* (1932) : « Cette plante est assez répandue dans les forêts de la région montagneuse. » Après avoir cité le col de Jau à 1 500 m et la vallée de la Galbe à 1 800 m, il ajoute : « Trouvée aussi à Matemale, par COSTE et SOULIÉ. » C'est cette dernière station qui est la plus connue : elle compte des milliers de pieds et elle est visible au bord même de la D 118, comme peut le constater même le botaniste qui passe en voiture sans s'arrêter, et dont le regard est attiré par une autre plante encore bien plus spectaculaire, du moins lors de sa floraison, *Ligularia sibirica* ! Elle s'étend entre cette route et la route forestière à l'est de Matemale, et même plus à l'est (DH 27 14, entre 1 550 et 1 620 m). Deux nouvelles stations, découvertes cette année, de part et d'autre de Matemale, sont séparées par une distance de 9,5 km :

- Bord est de la piste qui longe la rive est de l'étang de Puyvalador : peuplement dense de plusieurs ares (DH 28 21, 1 440 m, 27 juillet 1997).

- Au sud de la piste qui contourne le lac de Matemale dans sa partie sud-ouest, en deux points sous bois de pins à crochets et en lisière (DH 2512, 1 540 m, 2 août 1997).

➤ *Gagea lutea* subsp. *burnatii* (Terrac.) Lainz

- Et non *G. pratensis*, comme indiqué précédemment (*Bull. S.B.C.O.* n° 19, p. 149) : entrée des Gorges du Sègre, au-dessus du Mas Girves (66, DH 22 00, 1 400 m, 22 avril 1982 et vu plusieurs fois depuis). Cf., dans ce même Bulletin, l'article sur "Le genre *Gagea* en Cerdagne française et Conflent".

- Bord du chemin qui va de la route forestière d'Osséja vers le hameau Lo Puig (66, DG 16 94, 1 440 m, 11 avril 1988 ; cf. *Bull. S.B.C.O.* n° 20, p. 130).

➤ *Lathyrus sylvestris*

- Gorges du Sègre, entre la route et le torrent (66, DH 23 00, 1 480 m, 16 juillet 1997).

Je n'ai jamais rencontré en Cerdagne notre "Pois de Senteur" du Centre-Ouest (*L. latifolius*), que GAUTIER indiquait commune en Roussillon. De ce groupe des gesses robustes à folioles larges, que FOURNER rassemble sous le binôme de *L. sylvestris*, la plus commune ici est *L. cirrhosus*. Le statut de *L. sylvestris* s. str. est intermédiaire : rare. En plus de la station ci-dessus :

- Début du sentier qui mène de Porte au Lanous (23 juillet 1981).

- Piste qui mène de Llo au Mas Patiras, c'est-à-dire à peu de distance au-dessus des gorges du Sègre (17 juillet 1987).

➤ *Linum austriacum* subsp. *collinum*

- Au nord-ouest d'Enveitg, dans une pelouse rocailleuse schisteuse : une dizaine de touffes disséminées (66, DH 10 02, 1 460 m, 17 juillet 1997).

L'espèce est rare pour la région : VIGO indique une seule station pour la Vall de Ribes ("vora Toses, 1 500 m"), et la *Flora Manual dels Països catalans* indique "rrr, pâturages de l'étage montagnard, **Xerobromion**, 1 000-1 500 m").

La répartition géographique de cette plante est faite d'aires disjointes, comme l'indique l'article de *FLORA EUROPAEA* (t. II, p. 209) : "A heterogenous subspecies comprising a few very disjunct populations". On la rencontre en effet aussi bien dans le Vaucluse (Cf. GIRERD, qui note, dans la 2<sup>e</sup> édition de son inventaire de la Flore du département de Vaucluse que "sa chorologie est un peu énigmatique...") que sur les coteaux calcaires du sud d'Angoulême (Cf. A. TERRISSE, Compte rendu de la sortie botanique du 20 mai 1979 sur les Chaumes calcaires au sud d'Angoulême, in *Bull. S.B.C.O.* **10**, 1979, p. 292 et V. BOULLET, "Première contribution à l'étude des pelouses du Crétacé des Charentes", in *Colloques Pytosociologiques*, **XI**, 1982, p. 36). Toutefois, un examen des exemplaires d'herbier montre que si la plante du Vaucluse est tout à fait semblable à celle d'Enveitg, celle d'Angoulême en diffère par ses pédicelles non ou peu recourbés, ses feuilles moins étroites et ses capsules légèrement plus grandes. Je me rappelle d'ailleurs qu'É. CONTRÉ n'était pas entièrement satisfait du nom qu'il avait attribué, faute de mieux, à cette plante...

➤ *Lysimachia ephemera*

- Dans une anfractuosité de la roche, côté nord de la route, au bord de la N 116, au nord-est de Thuès-les-Bains, à quelques centaines de mètres au nord du carrefour avec la route de Canaveilles : quelques pieds bien fleuris (66, DH 38 10, 700 m, 31 juillet 1997).

Petite station "classique" : depuis plus de 20 ans, je la vois au passage presque chaque année : elle se maintient, mais sans espoir de s'étendre, étant donnée la configuration du terrain.

➤ *Melica nutans*

- Quelques pieds, une trentaine en tout, en deux points, entre la route et le torrent, dans les gorges du Sègre (66, DH 00 23, 1 440 et 1 480 m, 16 juillet 1997).

➤ *Rorippa palustris*

C'est ainsi qu'il faut nommer - plutôt que *R. islandica* - l'espèce qui avait envahi l'étang asséché de Puyvalador (cf. *Bull. S.B.C.O.* **27**, 1996, p. 59 et contributions sur les *Bull. S.B.C.O.* **21**, 1990, p. 200 et **22**, 1991, p. 242).

Les deux espèces sont en fait considérées comme synonymes sur les flores classiques : COSTE, FOURNIER, et même le 1<sup>er</sup> supplément à la flore de COSTE (et sa révision, le 6<sup>e</sup> supplément), ou la première édition du tome I de *FLORA EUROPAEA*, ou la *Flora Manual dels Països catalans*.

Mais les deux espèces sont distinguées dans la 2<sup>e</sup> édition du tome I de *FLORA EUROPAEA* et dans *FLORA IBERICA*, vol. IV, p. 111, avec, dans ce dernier ouvrage, l'observation suivante : « *R. palustris* et *R. islandica* sont très voisines. Les caractères mentionnés dans la clé sont utiles dans la majorité des cas, mais la détermination de certains spécimens, qui présentent des caractères de l'une et de l'autre, peut s'avérer douteuse ».

Deux caractères assez nets permettent de nommer *R. palustris* la plante de Puyvalador :

- la longueur des sépales : supérieure à 1,6 mm (inférieure à 1,6 mm chez *R. islandica* s. str.),

- la longueur du fruit : inférieure à deux fois celle du pédicelle, souvent même seulement presque égale à celle-ci (2 à 3 fois celle du pédicelle chez *R. islandica*).

Je remercie vivement P. AYMERICH, de Berga (Catalogne espagnole), qui a attiré mon attention sur la distinction à faire entre les deux taxons.

► *Secale montanum*

- Près du col de Mantet, au bord de la route (66, DH 43 03, 1750 m, 31 juillet 1997).

- A l'ouest de Sauto, au bord de la "route basse" (66, DH 30 06, 1 620 m, 5 août 1997), etc.

Le Seigle vivace, en quelques années, s'est répandu au bord de nombreuses routes de la Cerdagne et du Conflent.

► *Silene otites* subsp. *otites*

- A quelques mètres de la station de *Linum austriacum*, au nord-ouest d'Enveitg (66, DH 10 02, 1 460 m, 17 juillet 1997), mais dans une partie de la pelouse encore plus rocailleuse : une dizaine de tiges.

L'espèce est rare en Cerdagne : RR pour le département selon GAUTIER qui, après avoir cité quelques stations en Roussillon, ajoute « Se retrouve en Cerdagne, à Ur, Villeneuve ». De fait, je ne l'ai rencontrée que dans la partie ouest de la Cerdagne :

- Vallée de l'Angoustrine, près du pont mégalithe (8 août 1976).

- Route forestière d'Estavar, près de la carrière (2 août 1981).

- Au sud d'Irivals (Latour-de-Carol, 1<sup>er</sup> juillet 1987).

- Lieu-dit "els Querrots" (Bajande, 14 août 1991).

### Deux-Sèvres

Contributions de : Yves BARON (Y.B.),  
Patrick GATIGNOL (P.G.), Didier PERROCHE (D.P.),  
S.B.C.O.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

► *Astragalus monspessulanus*

- Availles-Thouarsais, vallée de Fourbeau, abondant, avec *Diploxys muralis*, *Trinia glauca* subsp. *glauca*, *Bombacillaena erecta*, *Fumana procumbens*, *Thesium humifusum*, *Vincetoxicum hirundinaria* subsp. *hirundinaria* ; Availles-Thouarsais, vallée des Veaux, Y.B., 24 juin 1997.

► *Bupleurum falcatum* subsp. *falcatum*

- Tourtenay, sur la butte, avec *Melica ciliata* subsp. *ciliata*, Y.B., 10 juillet 1997.

► *Carex depauperata*

- Ménigoute, chaos de la Vonne, Y.B., 5 mai 1997.

► *Carex laevigata*

- Vasles, bois de l'Abbesse, tourbière à *Sphagnum palustre* avec *Scutellaria minor*, *Veronica scutellata*, Y.B., 1<sup>er</sup> mai 1997.

► *Carex pallescens*

- Vasles, bois de l'Abbesse, S.B.C.O.-86, 8 mai 1997.

► *Carex pendula*

- Arçay, fosses de tourbage au sud de l'Île Malo, avec *Hottonia palustris*, *Samolus valerandi*, *Thalictrum flavum*, S.B.C.O.-86, 22 juin 1997.

► *Carex pseudocyperus*

- Vasles, bois de l'Abbesse, S.B.C.O.-86, 8 mai 1997.

► *Caucalis platycarpus*

- Availles-Thouarsais, vallée des Veaux, importante colonie dans un champ de la partie aval du thalweg, avec *Euphorbia exigua* et *E. falcata*, Y.B., 24 juin 1997.

- *Chamaecytisus supinus*
  - Availles-Thouarsais, vallée des Veaux, Y.B., 24 juin 1997.
- *Convallaria majalis*
  - Etang du Bois Pouvreau, 19 juin 1997, P.G.
- *Daphne laureola* subsp. *laureola*
  - Vasles, bois de l'Abbesse, 1 pied, insolite sur substrat siliceux, Y.B., 26 mai 1997.
- *Diplotaxis muralis*
  - Availles-Thouarsais, vallée Fourbeau, 2<sup>e</sup> mention en Poitou-Charentes, Y.B., 24 juin 1997.
- *Helleborus viridis* subsp. *occidentalis*
  - Plante déjà connue près de l'étang de Bois Pouvreau à la Grimaudière avec *Hottonia palustris*, A.C., 25 mai 1997.
- *Hippuris vulgaris*
  - Oiron, vers Chantebrault, S.B.C.O.-86, 22 juin 1997.
- *Hottonia palustris*
  - Etang du Bois Pouvreau, 19 juin 1997, P.G.
- *Luzula sylvatica* subsp. *sylvatica*
  - Etang du Bois Pouvreau, 19 juin 1997, P.G.
- *Oenanthe silaifolia*
  - Avon, Camp d'Avon, quelques pieds au bord d'une mare, 31 mai 1997, P.G.
- *Omalotheca sylvatica*
  - Etang du Bois Pouvreau, quelques pieds, 19 juin 1997, P.G.
- *Osmunda regalis*
  - Vasles, bois de l'Abbesse, magnifique station dans une aulnaie à sphaignes sur plus de 100 m. Avec *Dryopteris carthusiana*, *D. dilatata*, *Athyrium filix-femina*, *Carex laevigata* et, curieusement, *Digitalis purpurea* subsp. *purpurea* le pied dans l'eau, Y.B., 1<sup>er</sup> mai 1997.
- *Oxalis acetosella*
  - Etang du Bois Pouvreau, une belle population le long d'un ruisseau dans une pente boisée, 19 juin 1997, P.G.
- *Parentucellia viscosa*
  - Etang de Beaurepaire, D.P., 13 juillet 1997.
- *Pimpinella major*
  - Etang du Plessis-Cherchemont près de Saint-Martin du Fouilloux avec *Carex rostrata*, *Hottonia palustris* et *Equisetum fluviatile*. Plante signalée dans la flore de SOUCHÉ, A.C., 4 mai 1997.
- *Ranunculus omiophyllus*
  - Vasles, bois de l'Abbesse, S.B.C.O.-86, 8 mai 1997.
- *Ranunculus nodiflorus*
  - Argenton-Château, Les Oeufs Durs, toujours présent dans plusieurs points, 22 février 1997, P.G.
- *Ranunculus sceleratus* subsp. *sceleratus*
  - Pas-de Jeu, fosse de tourbage, S.B.C.O.-86, 22 juin 1997.
- *Sisymbrella aspera* subsp. *aspera*
  - Bougon, Fosse Ronde, Y.B., 12 mai 1997.
- *Symphytum tuberosum* subsp. *tuberosum*
  - Saint-Jacques de Thouars, vallée de Pommiers, Y.B., 1<sup>er</sup> mars 1997.
- *Thalictrum minus* subsp. *minus*
  - Sainte-Blandine, Fief Brillant, Y.B., 14 mai 1997.
  - Availles-Thouarsais, vallée des Veaux, Y.B., 24 juin 1997.

- *Tilia cordata*
  - Vasles, bois de l'Abbesse, avec de rares *Fagus sylvatica* subsp. *sylvatica* et *Convallaria majalis* abondant, Y.B., 1<sup>er</sup> mai 1997.
  - Ménigoute, chaos de la Vonne, Y.B., 5 mai 1997.
- *Tilia platyphyllos* s. l.
  - Ménigoute, chaos de la Vonne, Y.B., 5 mai 1997.
- *Trifolium patens*
  - Bougon, Fosse Ronde, Y.B., 12 mai 1997.
- *Trifolium squamosum*
  - Bougon, Fosse Ronde, Y.B., 12 mai 1997.
- *Trinia glauca* subsp. *glauca*
  - Availles-Thouarsais, vallée Fourbeau, vallée des Veaux, Y.B., 24 juin 1997.
- *Utricularia* sp.
  - Etang de Beaurepaire, plusieurs pieds observés dans l'eau, en bordure de l'étang, au niveau de la prairie à *Gratiola officinalis*, *Alisma plantago-aquatica*, *Hydrocotyle vulgaris*, etc... L'absence de fleurs n'a pas permis une détermination plus précise, D. P., 13 juillet 1997.
- *Veronica montana*
  - Etang du Bois Pouvreau, 19 juin 1997, P.G.
- *Viola xscabra* = *odorata* x *hirta*
  - Thouars, Cascade des Pommiers, plusieurs pieds en compagnie des parents, 22 février 1997, S.B.C.O.-86,
- *Xeranthemum cylindraceum*
  - Pamproux, côte Belet, dans une vigne, Y.B., 12 mai 1997.
  - Bougon, le Grand Champ, Y.B., 12 mai 1997.

Contributions de : Gaston BONNIN et Gaétan ROBERT  
 ( Cercle des NATURALISTES, section scientifique  
 de DEUX-SEVRES - NATURE - ENVIRONNEMENT)

- *Adoxa moschatellina*
  - Fenioux. Vallée du Saumort. A l'entrée du chemin du moulin de Gaschet (20 mars 1997).
- *Ajuga chamepitys* subsp. *chamepitys*
  - Quelques petites colonies dans une parcelle d'orge, non déchaumée, au sud-ouest du bois de Beaulieu, à la limite de la Charente-Maritime. Cette espèce messicole était accompagnée de *Stachys annua*, *Euphorbia exigua*, communes (14 mai 1997).
- *Apium inundatum*
  - Périgné. Fossés de la prairie communale, près de la ferme "Le Boulassier" (13 septembre 1997).
- *Aster linosyris*
  - Thorigny, Bois de Beaulieu ; abondant dans les clairières et faibles dépressions peu boisées (5 septembre 1997).
- *Baccharis halimifolia*
  - Niort-Souché ; planté en bordure dans une haie de l'aérodrome. Beaux spécimens dont les fruits ont bien sorti leurs aigrettes décoratives ;
  - Prahecq ; ce "sèneçon en arbre" a été utilisé pour restaurer une haie d'Aubépine au bord d'un fossé ( 23 et 24 octobre 1997).
- *Bromus madritensis*
  - Niort ville, Impasse du Clou-Bouchet : deux petites stations oubliées par les

pulvérisations systématiques des services de voirie (20 août 1997).

➤ *Bupleurum baldense* subsp. *baldense* (= *B. aristatum*).

- Thorigny, Bois de la Prise, au sud du Bois de Beaulieu, sentier en direction de Coupigny. Rare (14 mai 1997).

➤ *Carex hallerana*

- Thorigny. Bois de Beaulieu, pelouses et bois clairs. Assez rare (14 mai 1997).

➤ *Catananche caerulea*

- Thorigny. Bois de Beaulieu et bois de la Prise. Colonies abondantes (14 mai 1997).

➤ *Centaurea calcitrapa*

- Amuré (marais Poitevin) : dans le village même, dans un délaissé en pente, parmi des constructions récentes (8 octobre 1997).

➤ *Conium maculatum*

- Commune de Sainte-Blandine entre Prahecq et Saint-Médard.

- Route D 740, entre Niort et Prahecq, dans la commune de Sainte-Blandine. La "Ciguë" de Socrate a fait une apparition spectaculaire sur le talus en bordure des parcelles de Colza. Sur environ 400 m on voyait des pieds isolés dont les ombelles étaient formées, puis de petites colonies linéaires et des alignements plus importants plus ou moins mêlés à du Sureau yèble qui avait du mal à conserver la place qui avait toujours été la sienne.

Revenu 10 jours plus tard pour faire une photo, j'eus de la peine à constater l'évidence. Tout avait été tondu de près sans laisser de vestige. Il y a une explication possible mais d'où provenaient les graines ?

➤ *Daphne laureola* subsp. *laureola*

- Commune d'Aiffres, près de Niort. Bois du Grand-May. Ce bois est en grande partie établi sur un ancien parc abandonné et ne présente pas d'arbres remarquables. Les plus beaux sujets sont des Erables champêtres mais l'Erable de Montpellier est bien représenté. Le Daphné à feuilles de laurier est commun ici, alors qu'il manque dans une grande partie du sud des Deux-Sèvres.

➤ *Epipactis helleborine*

- Thorigny : Bois de Beaulieu, proche de La Gaubertière. De superbes exemplaires dans une jeune coupe (5 août 1997).

➤ *Euphorbia platyphyllos*

- Périgné : Prairie communale de Prérault. En bordure de la route de Brolain, sur la crête du fossé souvent entamée par les charrues (14 mai 1997).

➤ *Galium boreale*

- Périgné en dehors des terrains humides de l'ancienne Z.N.I.E.F.F. Une jeune station s'est installée à mi-pente dans une pelouse mésophile (14 mai 1977).

➤ *Geranium pusillum*

- Niort ville : Impasse du Clou Bouchet (20 août 1997).

➤ *Glyceria maxima*

- Saint-Hilaire-la-Palud : "Le Grand-Port", importante colonie qui occupe un coin du port (7 juin 1997).

➤ *Hypericum montanum*

- Thorigny : Bois de Beaulieu. Beaux spécimens sur un talus laissé en place après l'élargissement de l'allée centrale du bois. Nouvelle donnée. (Plante signalée à Doeuil dans la flore de LLOYD, 5<sup>ème</sup> édition 1895).

➤ *Isopyrum thalictroides*

- Fenioux, rives boisées du Saumort, près de Gaschet (20 mars 1997).

➤ *Myosotis laxa* subsp. *caespitosa*

- Périgné. Anciennes fosses d'extraction d'argile (23 juillet 1997).



- *Odontites lutea*  
- Thorigny. Bois de Beaulieu et de la Prise. Clairières et bois clairs (5 septembre 1997).
- *Petrorhagia prolifera*  
- Niort-Souché. Bordure de la chaussée de la route D 948 le long de l'aérodrome parmi le tapis de *Plantago coronopus* subsp. *coronopus* qui colonise une étroite bande siliceuse.
- *Pimpinella saxifraga*  
- Thorigny : Bois de Beaulieu et de La Prise. Pelouses sèches (14 mai 1997).
- *Scirpus holoschoenus*  
- Périgné et Brûlain : dans les fossés bordant la route dans la traversée de la prairie communale de Périgné. Quelques touffes dans la partie inondable du chemin de la ferme du Theil.
- *Scirpus sylvaticus*  
- Augé : Vallon de Cathelogne. Une seule station (8 mai 1997).
- *Scorzonera hirsuta*  
- Thorigny : Bois de Beaulieu, localisé pelouses et taillis clairs pierreux. Signalé à Doeuil dans la flore de SOUCHÉ (14 mai 1997).
- *Seseli libanotis* subsp. *libanotis*  
- Thorigny : Bois de Beaulieu et de La Prise. (14 mai 1997).
- *Tetragonolabus maritimus*  
- Saint-Martin de Bernegoue : une belle colonie sur la berme et dans le fossé de la route en montée vers Saint-Martin (7 juin 1997).
- *Thalictrum minus* subsp. *minus*  
- Thorigny : Bois de Beaulieu, sur un talus avec affleurements calcaires (5 septembre 1997).  
- Niort - Saint-Florent : Talus de la voie ferrée Niort-Saintes (20 août 1997).
- *Trifolium angustifolium*  
- Thorigny : Bois de La Prise, spécimens desséchés mais identifiables. L'espèce est signalée dans la flore de LLOYD (5<sup>e</sup> édition) à La Rochénard, Epannes et Vallans (L.-J. GRELET).

Contribution de : M. CARRIÈRE

- *Hippuris vulgaris*  
- Pas-de-Jeu, le Grand Etang (15 juin 1997).
- *Lamium maculatum*  
- Brie, le Grand Marais (15 juin 1997).
- *Thelypteris palustris*  
- Pas-de-Jeu, le Grand Etang (15 juin 1997).
- *Utricularia vulgaris*  
- Boussais, queue de l'étang Fourreau (15 juin 1997).  
- Pas-de-Jeu, le Grand Etang (15 juin 1997).

### Vendée

Contribution de : M. CARRIÈRE

- *Apium inundatum*  
- Saint-Martin-des-Noyers, abondant sur les bords de l'étang Les Creux Jaunes (21 mai 1997).

- *Campanula glomerata*
  - Mortagne-sur-Sèvre, lieu-dit Saint-Hilaire-de-Mortagne, dans une friche près de La Garde : 31 mai 1997 (signalée autrefois à Mortagne par GENEVIER, 1866).
- *Centaurea cyanus*
  - Les Herbiers, près du lieu-dit La Lande, en bordure de champs : au moins une centaine de pieds (29 mai 1997).
- *Equisetum telmateia*
  - Saint-André-Goule-d'Oie, La Brossière, plusieurs dizaines de pieds autour d'une mare récemment aménagée en aire de loisirs (28 mai 1997).
- *Euphorbia hyberna*
  - La Merlatière, bois des Chaumes : 28 mai 1997 (près des limites nord-occidentales de son aire).
- *Filipendula vulgaris*
  - Saint-Laurent-sur-Sèvre, La Guérivière, vallée de la Sèvre nantaise (31 mai 1997).
- *Gratiola officinalis*
  - Saint-Laurent-sur-Sèvre, abords de l'étang Le Blanc : plusieurs dizaines de pieds (2 juillet 1997).
- *Luronium natans*
  - La Chaize-le-Vicomte, La Chapelière, abondant dans une petite mare prairiale non loin du bois de Château-Fromage (7 juillet 1997).
- *Menyanthes trifoliata*
  - Saint-Laurent-sur-Sèvre, abords de l'étang Le Blanc : près d'une centaine de pieds (29 mai 1997).
- *Sedum rubens*
  - Les Herbiers, lieu-dit La Belletière, en bordure d'un chemin sablonneux, près du Grand Ry (29 mai 1997).

### Vienne

Contributions de : Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.),  
Patrick GATIGNOL (P.G.), Didier PERROCHE (D.P.),  
S.B.C.O.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

- *Ammi majus*
  - Charrais, abondant dans un champ de tournesol entre Neuville et Charrais, D.P., 17 août 1997.
- *Anagallis minima*
  - Forêt de Vouillé dans une allée après un gyrobroyage avec *Cicendia filiformis*, *Exaculum pusillum*, *Lythrum hyssopifolia* et *Scutellaria minor*, A.C., 30 juin 1997.
  - Lac de la Goumaie au sud de la Forêt de Vouillé avec *Cicendia filiformis*, A.C., 29 juin 1997.
- *Apera spica-venti* subsp. *spica-venti*
  - Liniers, Bois-Bernard, au nord de la D 6, Y.B., 20 juin 1997.
- *Arabis glabra*
  - Lençloître, quelques pieds en lisière d'un bois avec *Moehringia trinervia*, *Sedum cepaea*, 1<sup>er</sup> juillet 1997, P.G.
  - Roiffe, déjà cité par P. PLAT, 3 juillet 1997, P.G.
- *Astragalus glycyphyllos*
  - Mairé, D5 au pied du parc de Rocreuse, S.B.C.O.-86, 14 juin 1997.

- *Avenula marginata* subsp. *sulcata*
  - Roiffe, quelques pieds disséminés dans la lande, déjà cité par P. PLAT, 3 juillet 1997, P.G.
- *Bombycilaena erecta*
  - Archigny, la Cantière, S.B.C.O.-86, 24 mai 1997.
- *Bromus arvensis*
  - Chauvigny, Saint-Pierre-les-Eglises, Y.B., 20 juin 1997.
  - Saint-Benoît, à la Varenne, au bord du petit étang, Y.B., 29 juin 1997.
- *Bromus racemosus*
  - Ligugé, à Mezeaux, avec *Carex paniculata* subsp. *paniculata*, Y.B., 29 mai 1997.
- *Bupleurum baldense* subsp. *baldense*
  - Saint-Chartres, coteau de Chollet, avec *Bombycilaena erecta* et *Teucrium botrys*, S.B.C.O.-86, 18 juin 1997.
- *Caucalis platycarpus*
  - La Grimaudière, vallée Brigaud, avec *Bifora radians*, *Euphorbia falcata*, etc., S.B.C.O.-86, 18 juin 1997.
- *Cerastium arvense* subsp. *arvense*
  - Vouillé, vallée aux Morts, en lisière d'un champ de colza, en abondance, 2<sup>ème</sup> mention récente en Poitou-Charentes, A.C., 12 mai 1997.
- *Chaememelum mixtum*
  - Lençloître, de belles populations dans un champ sablonneux, 1<sup>er</sup> juillet 1997, P.G.
- *Chamaespartium sagittale*
  - Archigny, la Cantière, S.B.C.O.-86, 24 mai 1997.
- *Chenopodium ambrosioides*
  - Le Petit Félin, Espèce en voie d'expansion avec *Amaranthus lividus* et *Mentha xverticillata*, 18 septembre 1997, P.G.
- *Cicendia filiformis*
  - Forêt de Vouillé dans une allée après un gyrobroyage, A.C., 30 juin 1997.
  - Lac de la Goumaie, au sud de la Forêt de Vouillé, avec *Cicendia filiformis*, A.C., 29 juin 1997.
- *Corydalis solida* subsp. *solida*
  - Lussac (forêt de ...), rond-point de Saint-Hubert, indication A. BARBIER, une vingtaine de pieds, au-dessus d'une grotte, Y.B., 21 avril 1997.
- *Daphne laureola* subsp. *laureola*
  - Poitiers, bois du Déffend, Y.B., 22 octobre 1996.
  - Château-Larcher, Jarrige, Y.B., 28-3-97.
- *Datura stramonium* var. *tatula*
  - Saint-Cyr, à Bondilly, dans un champ de maïs au bord de la D. 82 en direction du Pinail, D.P., septembre 1996, revu en 1997.
  - Saint-Cyr, à Traversais, au lieu dit "la Canneterie", au bord d'un champ, D.P., 11 novembre 1996, non revu en 1997.

Cette variété se distingue du type par la couleur mauve de ses fleurs et de ses tiges. Elle est plutôt signalée dans le midi de la France (cf. la flore de COSTE et la flore des champs cultivés de P. JAUZEIN).
- *Dianthus carthusianorum*
  - Les Roches Prémaries, un pied dans une prairie calcaire située en face des étangs, D.P., 2 septembre 1996.

- *Dianthus caryophyllus*
  - Vendeuvre, ruines du château de Bonnavet, Y.B., 4 juillet 1997.
- *Digitalis lutea* subsp. *lutea*
  - Château-Larcher, Jarrige, Y.B., 28 mars 1997.
  - Vouneuil-sous-Biard, la Roche, Y.B., 21 avril 1997.
- *Digitalis purpurea* subsp. *purpurea*
  - Forêt de Vouillé, plusieurs pieds dans une parcelle située entre la route forestière des Trois Chênes et celle de Varailles, au lieu dit "La Clairière", D.P., 17 juillet 1997.
  - Saint-Leomer, au lieu dit "Les Bruyères de la Pierre Soupèze", dans une lande au sud du camp militaire de Montmorillon, à l'emplacement de l'ancienne décharge de la Loge, D.P., 21 août 1997.
- *Dittrichia graveolens*
  - Le lac, à Châtellerault, avec *Utricularia australis*, A.C., 27 septembre 1997.
  - Pinail, nouvelle station située sur le pare-feu entre les parcelles 301 et 302, au niveau du rivau d'Aillé : abondant et fleuri, D.P., 29 août 1997.
- *Epilobium angustifolium*
  - Forêt de Vouillé, quelques pieds dans une parcelle située à l'est de la route forestière des Trois Chênes, entre le carrefour des Lacs Jumeaux et celui de Saint-Hilaire, D.P., 17 juillet 1997.
- *Epipactis muelleri*
  - Mairé, D5, au pied du parc de Rocreuse, S.B.C.O.-86, 14 juin 1997.
- *Erigeron karwinskianus*
  - Moulin de Chitré et dans Châtellerault, A.C., 5 mai 1997.
- *Euphorbia angulata*
  - Lussac (forêt de...), Y.B., 21 avril 1997.
- *Euphorbia hyberna* subsp. *hyberna*
  - Lussac (forêt de...), Y.B., 17 avril 1997.
- *Euphorbia serrulata*
  - Chauvigny, Saint-Pierre-les-Eglises, Y.B., 20 juin 1997.
- *Euphorbia villosa*
  - Lussac, les Grandes Brandes, Y.B., 17 avril 1997.
- *Exaculum pusillum*
  - Forêt de Vouillé dans une allée après un gyrobroyage, avec *Anagallis minima*, *Cicendia filiformis*, *Lythrum hyssopifolia* et *Scutellaria minor*, A.C., 30 juin 1997.
  - Lac de la Goumaie au sud de la Forêt de Vouillé avec *Cicendia filiformis*, A.C., 29 juin 1997.
- *Fagus sylvatica* subsp. *sylvatica*
  - Lussac (forêt de...), quelques individus, en pente nord, Y.B., 21 avril 1997.
  - Béruges, la Tour de Guyenne, Y.B., 29 août 1997.

En Poitou, le Hêtre est assez fréquent dans ce type de biotope à microclimat frais où il peut être spontané.
- *Fallopia dumetorum*
  - Le Petit Fêlin, petite population au bord de la Vienne de cette espèce rarement mentionnée, 18 septembre 1997, P.G.
  - Vallée des Bouteilles de la forêt de Vouillé, A.C., 7 septembre 1997.
- *Fragaria viridis* subsp. *viridis*
  - Lussac, 26 avril 1997, P.G.
  - Chauvigny, Coteau du Trait, 3 mai 1997, P.G.
  - Migné, Bois de Paché, 11 mai 1997, P.G.

- *Galeopsis tetrahit*
  - Chauvigny, Coteau du Trait, espèce rarement mentionnée, 3 mai 1997, P.G.
- *Groenlandia densa*
  - Gençay, Source de Puyrabier, où il est abondant, D.P., 2 septembre 1996.
- *Hippuris vulgaris*
  - Berrie, Pont-Jacquet, importante colonie dans deux anciennes fosses de tourbage, Y.B., 10 juillet 1997.
- *Hornungia petraea*
  - Saint-Chartres, coteau de Chollet, S.B.C.O.-86, 22 juin 1997.
- *Illecebrum verticillatum*
  - Saint-Leomer, au lieu dit "Les Bruyères de la Pierre Soupèze", dans une lande au sud du camp militaire de Montmorillon, où il est abondant localement sur une parcelle dénudée, sur sol sablonneux, à l'emplacement de l'ancienne décharge de la Loge. A signaler aussi sur les chemins attenants, un très joli **Radiolo - Cicendietum** avec *Radiola linoides*, *Exaculum pusillum*, *Hypericum humifusum*, *Kickxia elatine* subsp. *elatine*, *Filaginella uliginosa* subsp. *uliginosa* abondants, *Mentha pulegium* et *Cicendia filiformis* plus rares. Un pied observé seulement pour cette dernière espèce. *Scilla autumnalis* fleurissait abondamment aussi dans ce secteur, D.P., 21 août 1997.
- *Lamium album*
  - Bonnes, coteau du Trait, S.B.C.O.-86, 3 mai 1997.
- *Laserpitium latifolium*
  - Roiffe, 3 juillet 1997, P.G.
- *Lathyrus sphaericus*
  - La Grimaudière, vallée Brigaud, S.B.C.O.-86, 22 juin 1997.
- *Lathyrus tuberosus*
  - Avanton, une belle colonie le long de la route de Lencloître, 1<sup>er</sup> juillet 1997, P.G.
- *Legousia hybrida*
  - Vouillé, vallée aux morts, avec le *Cerastium arvense*, Y.B., 12 mai 1997.
- *Leontodon hispidus* subsp. *hispidus*
  - Mairé, D5, au pied du parc de Rocreuse, S.B.C.O.-86, 14 juin 1997.
- *Lilium martagon*
  - Lussac (forêt de...), rond-point de St-Hubert, nouvelle et importante station, signalée par P. MOREAU, Y.B., 17 avril 1997.
  - 2 pieds en versant nord près de Cornouin, avec *Cephalanthera rubra*, Y.B., 21 avril 1997. L'espèce était déjà connue sur le versant ouest de la forêt.
  - Bonnes, vallée de Theil, 9 pieds signalés par J.-P. RING, Y.B., 26 juin 1997.
- *Misopates orontium*
  - Chauvigny, Saint-Pierre-les-Eglises, Y.B., 20 juin 1997.
- *Myriophyllum verticillatum*
  - Masseuil, étang Guissabeau, Y.B. 16 août 1997.
  - Espèce rarement signalée, peut-être méconnue.
- *Neottia nidus-avis*
  - Lussac (forêt de...), Chemin de Pérofin, Y.B., 29 mai 1997.
- *Odontites jaubertiana* subsp. *jaubertiana*
  - Amberre, Faluns d'Amberre, où il est localisé au bord d'un chemin, D.P., 1<sup>er</sup> septembre 1996 (confirmation car fleuri le 12 septembre 1996, revu non fleuri fin août 1997).
  - Poitiers, Côte de Montbernage, dans une friche sur sol superficiel où il est localisé. Quel avenir peut-on espérer pour cette station située sur un chantier interdit au public, qui plus est en milieu urbain ? Fort heureusement, le site n'a pas été perturbé

depuis des années, mais pour combien de temps encore ? D.P., 13 septembre 1996, revu en 1997.

- *Petrorhagia prolifera*
  - Amberre, Faluns d'Amberre, D.P., 12 septembre 1996.
- *Peucedanum oreoselinum*
  - Roiffe, 3 juillet 1997, P.G.
- *Phyteuma spicatum* subsp. *spicatum*
  - Forêt de Vouillé, en bordure de l'Allée de Saint-Hilaire, après le carrefour du même nom, en direction de Poitiers, D.P., 8 mai 1997.
- *Pitularia globulifera*
  - Bois de Chitré, 5 juillet 1997, S.B.C.O.-86.
- *Polygonatum odoratum*
  - Migné, Bois de Paché, quelques pieds en lisière, 11 mai 1997, P.G.
- *Potamogeton nodosus*
  - Le Petit Félin, belle population dans la Vienne, 18 septembre 1997, P.G.
- *Prunella grandiflora* subsp. *grandiflora*
  - Mairé, bord de la D5, au bas du parc de Rocreuse, S.B.C.O.-86, 14 juin 1997.
- *Quercus ilex*
  - Lussac-les-Châteaux, la Barbotterie, S.B.C.O.-86, 26 avril 1997.
  - Vouneuil-sur-Vienne, landes de Chitré à la Grange-Neuve, 3 jeunes pieds, inattendus — du moins dans le Centre-Ouest — sur substrat siliceux, Y.B., 5 juillet 1997.
- *Rhamnus catharticus*
  - Poitiers, bois du Déffend, Y.B., 22 octobre 1997.
  - La Grimaudière, vallée Brigaud, S.B.C.O.-86, 18 juin 1997.
  - Bonnes, vallée de la Bonnetailière, Y.B., 26 juin 1997.
- *Salvia verbenaca*
  - Les Rochereaux, toute une population sur une centaine de mètres le long d'un chemin, 11 mai 1997, P.G.
- *Scilla autumnalis*
  - Saint-Chartres, coteau de Chollet, Y.B., 16 juillet 1997.
- *Sparganium minimum*
  - Bois de Chitré, plusieurs points, 5 juillet 1997, S.B.C.O.-86.
- *Tanacetum corymbosum* subsp. *corymbosum*
  - Lussac-les-Châteaux, bord de la N 749, au pied de la forêt, à mi-longueur environ, sur 1 m<sup>2</sup>, probablement la station signalée par A. BARBIER, Y.B., 29 mai 1997.
- *Thalictrum flavum*
  - Ligugé, îles de Pont, Y.B., 7 avril 1997.
  - Berrie, Pont-Jacquet, au bord des fosses de tourbage, avec *Myosoton aquaticum*, *Rhamnus catharticus*, et *Populus alba* × *nigra*, Y.B., 10 juillet 1997.
- *Thalictrum minus* subsp. *minus*
  - Buxerolles, vallée au Lait, Y.B., 22 mai 1997.
- *Thelypteris palustris*
  - Smarves, Moulin des Dames, Y.B., 26 juin 1997.
- *Thymelaea passerina*
  - Saint-Chartres, coteau de Chollet. Un exemplaire en compagnie de *Thesium humifusum*, S.B.C.O.-86, 22 juin 1997.
- *Tilia cordata*
  - Ligugé, Bois du Grand Aiguillon, Y.B., 10 avril 1997.
  - Vouneuil-sous-Biard, bois de la Queue du Renard, Y.B., 12 avril 1997.

- La Roche, Y.B., 21 avril 1997.
- Lussac (forêt de...), Y.B., 17 avril 1997.
- Béruges, la Raudière, Y.B., 19 avril 1997.

► *Tilia platyphyllos* s.l.

- Ligugé, bois du Grand Aiguillon, Y.B., 10 avril 1997.
- Béruges, la Raudière, Y.B., 19 avril 1997.
- Vouneuil-sous-Biard, la Roche, Y.B., 21 avril 1997.
- Cloué, à Malvaux, Y.B., 25 avril 1997.
- Bonnes, coteau du Trait, abondant, S.B.C.O.-86, 3 mai 1997.
- Vallée de la Bonnetailière Y.B 26 juin 1997.

Ce taxon, ignoré de SOUCHÉ..., et de beaucoup d'autres après lui, s'avère pourtant répandu dans la Vienne, et probablement la région (cf. Braconné...). Parmi ses caractères, qui semblent les mêmes un peu partout, certains sont bien de *T. platyphyllos* (rameaux velus), d'autres le rapprocheraient de *Tilia xintermedia* DC. (feuilles moyennes à poils devenant roussâtres aux ramifications de nervures). Toutefois, cette forme est ignorée par la Flore forestière de RAMEAU, et considérée comme un hybride *cordata* × *platyphyllos* par FLORA EUROPAEA et la Flore de Belgique : or le *platyphyllos* type semble manquer dans la région, et la forme en question, se montrant en plein bois, loin des zones habitées, n'a guère un comportement d'échappée de culture.

► *Tussilago farfara*

- Forêt de Vouillé, 3 pieds sur une pelouse au bord de la D. 40, vers "les Lacs Jumeaux", D.P., 17 juillet 1997.

► *Utricularia minor*

- Bois de Chitré, 5 juillet 1997, S.B.C.O.-86.

► *Veronica filiformis*

- Bonnes, Moulin de la Ronde, P.G., 3 mai 1997.

► *Veronica montana*

- La Bussière, la Bodétrie, Y.B., 19 avril 1997.

► *Vulpia membranacea*

- Lençloître, quelques exemplaires bien développés dans un champ sablonneux en compagnie de *Vicia villosa* s. l., *Corrigiola litoralis*, *Chondrilla juncea* et d'une forme très robuste d'*Hypochoeris glabra*, 1<sup>er</sup> juillet 1997, P.G.

**Rectificatif** : Dans la contribution 1996 à l'inventaire de la Vienne (Bull. S.B.C.O. 28, p. 221), lire *Spiranthes spiralis*, et non *S. aestivalis*.

### Haute-Vienne

Contributions de Eric BRUGEL

► *Asplenium scolopendrium*

- Mur d'un vieux moulin au défilé de l'Aurence, alt. 230 m, Le Meynieux, commune d'Isle (L. CHABROL, novembre 1995! ; coord. UTM 31T CL 57). 5 touffes.

- Bord de ruisseau dans le parc du château de Nieul, alt. 300 m (I. SCHMIDT, février 1998 ! ; coord. UTM 31T CL 58). Plusieurs dizaines de pieds.

► *Gymnocarpium dryopteris*

- Vallée du ruisseau de la Ribière, alt. 540 m, près du hameau du Bas-Neuvialle, à 1 km environ au sud-sud-est de Plainartige, commune de Nedde (E. B., octobre 1997 ; coord. UTM 31T DL 05). Plusieurs populations en sous-bois de sapins le long de la rivière et de la D 940, ainsi que sur les pentes forestières (avec *Phegopteris*

*connectilis*). Cette observation confirme l'existence actuelle de cette espèce montagnarde dans la partie sud-est de la Haute-Vienne. Hormis la station observée jusqu'en 1978 dans un puits de la commune de Châlus, dans le sud-ouest du département (BOUDRIE, 1988, *Bull. Soc. bot. Centre-Ouest*, n.s., **19**, p. 80 ; station détruite dans les années 1980), la plante n'avait jamais été revue à une période récente dans ses stations naturelles indiquées par LE GENDRE (Catalogue des plantes du Limousin, 1922).

► *Lycopodium clavatum*

- Queues de l'étang de Maillaufargueix, alt. 570 m, commune de Bersac-sur-Rivalier (station découverte par G. FILET en août 1997; revue E. B. et I. SCHMIDT, octobre 1997 ; coord. UTM 31T CM 70). Station de 30 à 40 mètres carrés, à nombreux épis fertiles, en bordure de fond tourbeux, avec polytric, sphaignes, callune et sous couvert de bouleau.

► *Ophioglossum vulgatum*

- Prairie sèche transformée en verger, alt. 400 m, entre Les Petites Maisons et Cheval Blanc, commune de Saint-Bonnet-Briance (E. B., avril 1996 ; coord. UTM 31T CL 86). Une dizaine de pieds.