

## Contributions à l'inventaire de la flore

### Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 31 mars**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune en premier lieu**, puis du lieudit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- les contributions seront **classées par département** (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et **à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique des genres**.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de

doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

#### 04 - Département des Alpes-de-Haute-Provence

Contribution de Didier PERROCHE

##### ➤ *Bifora testiculata*

- Mane, dans une parcelle cultivée à l'ouest de Forcalquier, au bord du GR 6 passant en bordure nord de la commune. Dans le Tome 1 du Livre Rouge, la plante est signalée dans ce département sur les communes de Vachères, Reillanne et Mane. Station apparemment nouvelle, communiquée au Parc naturel régional du Luberon. 23-05-2005.

#### 05 - Département des Hautes-Alpes

Contribution de Martine BRÉRET

##### ➤ *Chamorchis alpina*

- Commune de Saint-Véran. Queyras. Au moins cinq pieds en fleurs au bord du chemin, entre l'ancienne mine du cuivre et la chapelle de Clausis. 21 juillet 2004.

Contribution de Dominique PATTIER

##### ➤ *Gagea minima*

- Commune d'Abriès, Col Lacroix, Queyras. Quelques pieds fleuris (peut-être beaucoup plus à l'état végétatif) à proximité de la frontière italienne, au sein d'une abondante population de *Gagea fragifera* (= *G. liotardii*). 18 juillet 2004.

A. BOREL & J.-L. POLIDORI ont confirmé la présence de ce taxon en France, dans les Alpes-Maritimes, en Haute-Tinée, dans le Parc National du Mercantour (*Le Monde des Plantes* n° 441, 1991). D'après *FLORA EUROPAEA*, cette espèce eurasiatique est présente dans une grande partie de l'Europe, à l'exception du Sud-Ouest et des îles. Très rare en Italie, elle est mieux représentée en Suisse.

En France, en dehors de la station de Haute-Tinée, elle a été signalée en Haute-Savoie mais sa présence reste douteuse. Elle semble donc se cantonner le long de la frontière italienne, en quelques rares stations. Mais la discrétion de cette plante et sa floraison parcimonieuse pourraient réserver des surprises.

## 16 - Département de la Charente

Contribution de Étienne HÉRAULT

- *Adiantum capillus-veneris* (déterminante Poitou-Charentes)
  - La Couronne, La Fontaine du Poirier, sur les rochers surplombant la route entre Les Séverins et la Couronne (11.04.2006) ; 50 à 100 frondes.
  - Puymoyen, le Champ des Prauds, falaise surplombant la vallée des Eaux Claires (26.07.2006) ; plus d'une centaine de frondes.
- *Dorycnium pentaphyllum* (déterminante Poitou-Charentes)
  - Ruelle-sur-Touvre, entre la Grande Combe et la Combe des Robins (10.08.2006) ; plus d'une centaine de pieds.
- *Galeopsis angustifolia* (messicole)
  - Ruelle-sur-Touvre, Roudinet (10.08.2006).
- *Gladiolus italicus* (déterminante Poitou-Charentes, messicole)
  - Juignac, la Grande Métairie (18.05.2006) ; 10 pieds environ.
- *Lathraea squamaria* (déterminante Poitou-Charentes)
  - Saint-Amand-de-Montmoreau, vallée de la Gace, au nord du bois des Tâches (20.04.2006).
- *Ophioglossum vulgatum*
  - Saint-Amand-de-Montmoreau, vallée de la Gace, au nord du bois des Tâches (20.04.2006) ; 1 pied.
- *Osmunda regalis* (déterminante Poitou-Charentes)
  - Montbrond, bord de la Tardoire ; régulier sur la partie supérieure du cours d'eau jusqu'à la limite du département (25.07.2006).
  - Montrollet, landes de la Borderie, le Sanadie de la Lande, au bord d'une mare tourbeuse (09.08.2006), un seul pied.
- *Potamogeton coloratus* (déterminante Poitou-Charentes)
  - Salles-Lavalette, entre le Moulin de Sartier et le Moulin des Salles (30.03.2006).
  - Montrollet, landes de la Borderie, le Sanadie de la Lande, dans les mares tourbeuses (09/08/2006).
- *Stachys annua* (messicole)
  - Champniers, Font Martin (10.08.2006).

## 17 - Département de la Charente-Maritime

Contribution de Muriel DAUDON

- *Angelica heterocarpa*
  - Bords, les Prés Morad, deux pieds au bord de la Charente (16-06-05).

- *Cardamine parviflora*
  - Ciré d'Aunis, marais de la Brûlée, quelques pieds dans une dépression à l'intérieur d'une parcelle LPO (26-05-05).
- *Euphorbia palustris*
  - Breuil-Magné, marais du Roy, deux stations ponctuelles et une autre, plus étendue (une cinquantaine d'individus) dans les parcelles LPO (19-05-05).
- *Fritillaria meleagris*
  - Bords, les Prés Morad, une cinquantaine de pieds dans deux parcelles LPO (21-03-05).
- *Gratiola officinalis*
  - Bords, les Prés Morad, plusieurs milliers de pieds dans une parcelle LPO (16-06-05).
- *Inula britannica*
  - Bords, les Prés Morad, près d'un millier de pieds dans deux parcelles LPO (16-06-05).
- *Oenanthe foucaudii*
  - Bords, les Prés Morad, deux pieds au bord de la Charente (16-06-05).
- *Trifolium patens*
  - Bords, les Prés Morad, quelques centaines de pieds dans deux parcelles LPO (16-06-05).

Contribution de Olivier LACHENAUD

- *Polycarpon tetraphyllum*
  - Domino, Sables Vignier (08-2000).
- *Solanum villosum* subsp. *miniatum*
  - Domino, Sables Vignier (08-2000).

Contribution de Dominique PATTIER

- *Hibiscus trionum*
  - Dolus-d'Oléron, aux Allards. Un pied subsponané dans un jardin. 25 septembre 2004.
- *Rubia tinctorum*
  - Commune de Mornac-sur-Seudre. Une petite station se maintient dans le bourg, le long du mur du cimetière. 19 septembre 2004.

Contribution de Jean TERRISSE

- *Adonis annua*
  - Migré, RR dans une bande de sainfoin (gel apiculture) en bordure d'un champ de tournesol (16 juin 2005).
  - Torxé, champ de colza vers le Fief de l'Isle, quelques pieds (9 juin 2005).

➤ *Arctium lappa*

- Le Seure, Migron, Prignac, assez répandue dans le corridor alluvial de l'Antenne (17 août 2005).

➤ *Asparagus maritimus*

- Grand-Village-Plage, arrière-dune entre la Passe des Alassins et la Passe de Trillou, non loin d'*Asparagus prostratus*, un unique pied vigoureux. C'est la première fois que nous rencontrons cette espèce sur les pelouses arrière-dunaires de l'**Artemisio - Ephedretum** (20 juin 2005).

➤ *Asparagus prostratus*

- Le Château-d'Oléron, Dolus-d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron, quelques micro-stations dispersées sur tout le littoral oriental sableux entre Boyardville et le Château-Oléron, toujours avec des effectifs très réduits (mai 2004).

➤ *Bromus secalinus*

- Migré, au nord du Moulin de Migré, friche pierreuse calcaire (gel PAC), en compagnie de *Crepis pulchra*, quelques dizaines. Espèce devenue très rare en Poitou-Charentes (16 juin 2005).

➤ *Bupleurum protractum*

- L'Houmeau, quelques pieds en bordure d'un champ de colza, le long de la route bordant le nord du Marais de Pampin (21 juin 2005).

➤ *Callitriche truncata*

- Moëze, Réserve Naturelle, apparu en grande abondance dans des aménagements hydrauliques réalisés au sein de prairies saumâtres ;

- Yves, Réserve Naturelle, apparu dans plusieurs mares où il n'avait jamais été noté (mai 2004).

➤ *Carex acuta*

- Port-d'Envaux, bois au sud-est de Saint-Saturnin-de-Séchaud, abondant dans des dépressions au sein de l'**Alno - Ulmenion** (9 juin 2005).

➤ *Carex liparocarpos*

- Bords, chaumes de Sèchebec, quelques pieds dans la pelouse vivace (8 mai 2004).

➤ *Centaurea cyanus*

- Longèves, environ 50 pieds en bordure d'un champ de blé (21 juin 2005).

➤ *Chenopodium vulvaria*

- Antezant-La-Chapelle, à l'est de la Folatière, quelques pieds en lisière d'un champ de blé, en compagnie d'*Amaranthus graecizans* subsp. *silvestris*, *Medicago polymorpha* subsp. *polycarpa*, etc. (30 juin 2005).

➤ *Cistus psilosepalus*

- Saint-Georges-d'Oléron, forêt des Saumonards, une très grosse station de près d'un hectare, le long de la route forestière menant au fort des Saumonards, environ 100 m au sud-est du fort, en lisière d'une grande dépression humide située côté sud-ouest de la route. En mélange avec *Cistus salvifolius* et l'hybride *C. psilosepalus* × *C. salvifolius* (5 avril 2005).

➤ *Cynanchum acutum*

- Dolus, une petite station dans une phragmitaie sèche occupant une lède arrière-dunaire, en arrière de la plage de Vert-Bois. Station intéressante car

assez voisine de l'écologie de l'espèce en région méditerranéenne alors que la plupart des stations connues sur le littoral charentais correspondent plutôt à des fourrés des *Prunetalia* ou à des biotopes nettement rudéralisés (16 mai 2005).

➤ *Daphne laureola*

- Marennes, Bourcefranc-le-Chapus, zone boisée située entre Nodes et la Chainade, quelques individus dispersés en 3 stations distantes. Spontané ? (5 décembre 2004).

➤ *Deschampsia media*

- Benon, Bois du Fraigneau, ça et là dans de magnifiques pelouses du Molinion, avec *Galium boreale*, *Prunella hyssopifolia* etc. (juin 2005).

➤ *Dianthus hyssopifolius subsp. gallicus*

- Le Château-d'Oléron, Dolus, Saint-Pierre-d'Oléron, présent en populations dispersées sur l'ensemble du littoral sableux de la côte orientale de l'île d'Oléron, au sud de la forêt des Saumonards (prospections systématiques effectuées dans le cadre du suivi botanique de la Réserve Naturelle des Marais de Moëze). Le pic de fréquence semble se trouver au niveau de Fort Royer sur un cordon dunaire très abrité ainsi que, secondairement, au nord de la Brande (mai 2004).

➤ *Erysimum cheiranthoides*

- Torxé, friche humide vers le Port Neuf, quelques pieds (7 juin 2005).

➤ *Euphorbia pepilis*

- Yves, nord de l'Anse des Boucholeurs, sur la façade maritime de la Réserve naturelle du Marais d'Yves, 18 pieds. Espèce considérée comme éteinte en Poitou-Charentes, découverte ici par l'équipe de la Réserve (voir article dans le Bulletin 36) (août 2004).

➤ *Festuca gigantea*

- Tonnay-Charente, Bois des Ailes, quelques pieds (juillet 2005).
- Le Seure, frênaie alluviale à l'ouest de Chez Tirat, abondant dans un chemin inondable (17 août 2005).
- Migron, rives de l'Antenne, au nord des Bernardières (17 août 2005).

➤ *Galium murale*

- Sainte-Gemme, landes de Cadeuil, dans un chemin sablonneux à proximité des sablières (11 avril 2004) ;
- Le Château-d'Oléron, quelques plaques en arrière de la plage du Château (mai 2004).

➤ *Gamochaeta subfalcata*

- Le Grand-Village-Plage, allées sablonneuses de la forêt de Saint-Trojan (20 juin 2005).

➤ *Gladiolus byzantinus*

- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, une cinquantaine de pieds fleuris en lisière d'un champ de céréales (15 mai 2005).

➤ *Hainardia cylindrica*

- Benon, Bois du Fraigneau, quelques pied sur un chemin marneux (juin 2005).

Espèce pas si rare en Charente-maritime que ne le laisse supposer sa détection difficile !

➤ *Hedypnois cretica*

- Dolus-d'Oléron, AC pelouses sablonneuses rudéralisées en face du camping l'Ostrea, en compagnie d'*Hypecoum procumbens*, *Erodium malacoides*, *Paronychia argentea*, *Parentucellia latifolia* déjà connus là (4 mai 2004). Présent également dans l'arrière-dune de Vert-Bois (quelques individus, le 16 mai 2005).

➤ *Helxine soleirolii*

- Rochefort, quelques pieds en fleur dans une rue du centre-ville (12 avril 2005).

➤ *Hornungia petraea*

- Nieul-les-Saintes, Trou de Pampin, AC dans les pelouses du ***Bellidi pappulosae* - *Festucetum marginatae***, en compagnie de divers autres thérophytes du ***Vulpio hispanicae* - *Desmazerietum*** : *Nardurus maritimus*, *Cerastium brachypetalum*, *Bupleurum baldense* etc. (29 avril 2004).
- Bords, chaumes de Sèchebec, quelques pieds dans une tonsure thérophytique sur dalle rocheuse (8 mai 2004).
- Talmont-sur-Gironde, abondante sur les remparts nord (il ne s'agit pas d'*Hymenolobus procumbens* comme nous l'avions signalé par erreur il y a quelque temps !) (13 mars 2005).

➤ *Hymenolobus procumbens*

- Meschers-sur-Gironde, pêcheries de la Conche à Cadet, 2 individus en fruits en pied de falaises le long du sentier menant aux carrelets (15 mai 2005).

➤ *Isoetes hystrix*

- Échillais, bois vers la Sauzaie : abondant sur environ 70 m dans un chemin forestier inondé en bas de coteau, en compagnie de *Ranunculus ophioglossifolius*, *Briza minor* etc. (9 avril 2004) (voir article dans le Bulletin 36).

➤ *Isopyrum thalictroides*

- Fontcouverte, toujours présent dans le vallon où il est connu depuis longtemps : une micro-station d'un demi m<sup>2</sup> au pied d'un des piliers de l'aqueduc romain (avec quelques *Lathraea squamaria*) et une autre à 150 m à l'ouest, non loin d'une prairie pâturée par des chevaux (2 avril 2005).

➤ *Lathyrus sylvestris*

- Bussac-Forêt, 3 grosses plaques sur le talus de la voie ferrée Bordeaux-Paris (juillet 2004).

➤ *Legousia hybrida*

- Le Château-d'Oléron, une station « éclatée » sur quelques dizaines de mètres linéaires, au niveau du bourrelet dunaire situé en arrière de la plage du Château, entre la bande de *Cupressus macrocarpa* plantés et la route de Bellevue. C'est la première fois que nous rencontrons cette espèce réputée « messicole » en milieu dunaire. Espèce discrète, à rechercher sur Oléron dans des milieux similaires (mai 2004).
- Echebrune, talus de la D 700 vers les Chails de Malabri, quelques pieds avec *Biscutella guillonii*, *Astragalus monspessulanus*, *Linum strictum*, etc. (9 mai 2004).

➤ *Linaria arenaria*

- Saint-Pierre-d'Oléron, dunes de Saint-Séverin, AC (16 mai 2005).

➤ *Medicago marina*

- Le Château-d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron, rencontrée seulement en 2 stations sur tout le littoral dunaire systématiquement prospecté de la côte orientale de l'île au sud de Boyardville : à la pointe du même nom (station déjà connue) et en arrière de la plage du Château (mai 2004).

➤ *Neotinea maculata*

- Les Portes-en-Ré, forêt de Trousse-Chemise, 14 hampes fructifères et 5 rosettes stériles, sous pinède ouverte à *Pinus pinaster*, non loin de la station de *Cistus monspeliensis* que nous avons trouvée en 1998. Après la découverte de quelques pieds de cette espèce sur l'île d'Oléron en forêt de Saint-Trojan (C. DAUGE, 2003), cette espèce méditerranéenne, connue depuis longtemps des côtes aquitaines et ... irlandaises affirme donc sa position sur le littoral charentais (10 mai 2005).

➤ *Oenanthe crocata*

- La Rochelle, un pied unique, très fleuri, dans un fossé bordant la rocade nord (à proximité de l'embranchement pour l'aéroport) se maintient depuis plusieurs années. Station évidemment subspontanée d'une espèce dont l'aire régionale naturelle est rigoureusement circonscrite à la partie armoricaine des Deux-Sèvres (10 mai 2005).

➤ *Omphalodes littoralis*

- Le Château-d'Oléron, Dolus-d'Oléron, assez abondant (les années climatiquement favorables !) entre le camping l'Ostrea au nord et la pointe des Doux au sud. Apparemment absent d'autres milieux a priori favorables entre Boyardville et le Château comme les pointes de Bellevue et de Boyardville (prospections systématiques effectuées dans le cadre du suivi botanique de la Réserve Naturelle des Marais de Moëze) (mai 2004).

➤ *Ononis reclinata*

- Saint-Palais-sur-Mer, pelouses aéro-halines de la Grande Côte, un peu au nord du Puits de Lauture, quelques pieds (26 mai 2005).

➤ *Orobancha ramosa*

- Saint-Hippolyte, la Chavêche, une belle station en pied de haie au bord d'une petite route (21 mai 2005).

- Saint-Denis-du-Pin et Antezant-la-Chapelle, abonde dans les champs de colza de ces 2 communes, notamment autour de la Folatière où certaines emblavures hébergent des milliers de pieds ! (30 juin 2005). Espèce dont l'inscription sur la Liste Rouge Régionale sera peut-être à reconsidérer à la lumière de son apparition massive dans les champs de colza.

➤ *Paris quadrifolia*

- Prignac, vallée de l'Antenne, au nord-ouest de Chevallon, vers le Bois Rond, un unique pied sous frênaie-ormaie alluviale, parmi un tapis de Lierre, Ronce bleuâtre, *Mercurialis perennis*, etc. Nouvelle localité pour la Charente-Maritime pour cette espèce eurasiatique rare en Poitou-Charentes (trois autres localités sont connues dans le département) (17 août 2005).

➤ *Phillyrea latifolia*

- Geay, Bois de l'Ombrière, çà et là, rare, en compagnie de *Quercus ilex* au niveau des affleurements rocheux de la rupture de pente dominant la vallée du Bruant. NB : à quelques centaines de mètres, à noter la présence de quelques *Fagus sylvatica*, dont un individu pluri-centenaire de taille très respectable ! (18 avril 2004).

➤ *Polygonum maritimum*

- Le Château-d'Oléron, Dolus-d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron, quelques micro-stations dispersées sur tout le littoral oriental sableux entre Boyardville et le Château. Le maximum d'abondance se situe au niveau de la pointe de Boyardville (mai 2004).

➤ *Ranunculus tripartitus*

- Sainte-Gemme, landes de Cadeuil, abondante mais très localisée dans une micro-dépression artificielle juste exondée (11 avril 2004).

➤ *Ribes rubrum*

- Le Seure, frênaie alluviale à l'ouest de Chez Tirat, pas rare (17 août 2005). Prignac, vallée de l'Antenne, au nord-ouest de Chevallon, vers le Bois Rond, AC (17 août 2005).

➤ *Rostraria cristata*

- Le Château-d'Oléron, une unique station d'au moins 200 pieds observée au nord de la plage du Château, à proximité de l'aire de pique-nique, sur des sables fortement rudéralisés. Espèce en nette expansion dans notre région (mai 2004).

➤ *Scorzonera laciniata*

- Saint-Froult, dunes fossiles des sables de Plaisance, 3 pieds seulement. Espèce en régression spectaculaire par rapport aux indications anciennes (mai 2004).

➤ *Sedum rubens*

- Port-d'Envaux, bois au sud-est de Saint-Saturnin-de-Séchaud, AC dans un ourlet mésotrophe sur alluvions caillouteuses (quartz) en compagnie de *Dianthus armeria*, *Lotus angustissimus* subsp. *hispidus*, *Trifolium striatum*, etc. Exceptionnel en système alluvial (hautes terrasses de la Charente) (9 juin 2005).

➤ *Sinapis alba*

- Torxé, champ de luzerne autour du cimetière, quelques pieds en fruits (7 juin 2005).

➤ *Sisymbrium austriacum*

- Talmont, une centaine de pieds vers la pointe sud-est de la falaise de la Roche, sur le haut de la falaise, dans une clairière d'un fourré de prunelliers entretenue par les lapins (3 avril 2005).
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, falaise de la Motte Ronde, quelques individus à proximité des *Brassica oleracea* (mai 2005).

➤ *Verbascum sinuatum*

- Talmont, falaise de la Roche, çà et là dans la friche bordant le chemin blanc aménagé en haut des falaises (3 avril 2005).

➤ *Veronica filiformis*

- Fontcouverte, très abondante dans les pelouses du golf où elle forme des tapis magnifiques en début de printemps (2 avril 2005).

## 24 - Département de la Dordogne

Contribution de Paméla LABATUT

➤ *Bellevalia romana* (L.) Reichenb.

- Eymet. Plus de 300 pieds dans un champ au bord de la petite route qui suit le ruisseau de la Mouline lequel se jette dans le Dropt au moulin de l'Auque. 23 avril 2006. (Citée dans le *Livre Rouge de la Flore menacée de France*, tome 1 : espèces prioritaires).

## 36 - Département de l'Indre

Contribution de Muriel DAUDON

➤ *Cucubalus baccifer*

- Lingé, près des Etangs de la Touche (21-07-05).
- Saint-Michel-en-Brenne, Réserve Naturelle de Chérine (29-07-05).

➤ *Cyperus michelianus*

- Saint-Michel-en-Brenne, une cinquantaine de pieds sur un étang à sec dans la Réserve Naturelle de Chérine (20-07-05).

➤ *Fritillaria meleagris*

- Lingé, près des Etangs de la Touche, plus de 100 individus en sous-bois (observés et photographiés par Joël DEBERGE, LPO, le 27-03-05).

➤ *Rumex hydrolapathum*

- Saint-Michel-en-Brenne, une trentaine de pieds en queue d'un étang privé (6-07-05).

➤ *Xeranthemum cylindraceum*

- Lingé, petite population en lisière de bois vers le Tranchy (21-7-05).

## 37 - Département d'Indre-et-Loire

Contribution de Étienne HÉRAULT

➤ *Thalictrum flavum* (protégé en région Centre)

- Bréhémont, sur les bords de Loire (23.06.2006), régulièrement présent.

## 46 - Département du Lot

Contribution de Jean-Claude FELZINES

Nota - Le signe \* signifie que l'espèce est présente dans la maille 20 × 20 km correspondante de l'Atlas partiel de la Flore de France (DUPONT P., 1990)

où elle n'était pas encore indiquée. La nomenclature est celle de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF version 4.02-04/2005 du site Web de *Tela Botanica*), référentiel informatisé établi à partir de l'Index synonymique de la Flore de France de Kerguelen (1993).

➤ *Acer platanoides*

- Floirac, la Gardelle : espèce naturalisée dans la vallée de la Dordogne où elle reste dispersée dans les groupements forestiers alluviaux. 25.06.2005. CK 97.

➤ *Ajuga chamaepitys*

- Lacave, Rocamadour, aux alentours du moulin de Cougnaguet, sur les vires exposées O et SO de la vallée de l'Ouyse et du vallon adjacent de Canteloube. 14.07.2005. CK 86\*.

- Pinsac, versant abrupt situé 1 km au NE du Pech de Pinsac - 23.05.2005 (avec R. Goux). CK 86\*.

➤ *Anthericum liliago*

- Lacave, Rocamadour, sur les versants exposés O et SO de la vallée de l'Ouyse proches du moulin de Cougnaguet. Stations où se rencontrent aussi : *Biscutella laevigata* subsp. *controversa*, *Inula spiraeifolia*. 19.05.2005. CK 86.

- Pinsac, versant abrupt situé 1 km au NE du Pech de Pinsac avec *Inula spiraeifolia*. 23.05.2005 (avec R. GOUX). CK 86.

➤ *Artemisia alba*

- Lacave, versants SO sous Canteloube et 1 km en aval du moulin de Cougnaguet. 14.07.2005. CK 86.

➤ *Asphodelus albus*

- Lacave, vallée de l'Ouyse, en face du moulin de la Treille et versants aux alentours du moulin de Cougnaguet. 07.07.2005. CK 86.

➤ *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis*

- Lacave, Rocamadour, parois calcaires du vallon adjacent de Canteloube, situé à 300 m au N du moulin de Cougnaguet. 07.07.2005. CK 86.

➤ *Avena barbata*

- Autoire, versant exposé à l'E, sous le château des Anglais. Station où se trouvent aussi : *Bromus diandrus*, *Trifolium scabrum*, *Isatis tinctoria*, *Orlaya grandiflora*, *Orobanche teucrii*. 22.05.2005 (avec R. GOUX). DK 06.

➤ *Bromus benekenii*

- Lacave, vallée de l'Ouyse, Font du Truffé. 07.07.2005. CK 86.

➤ *Bupleurum baldense*

- Loubressac, corniche surmontant le château des Anglais, au-dessus de la vallée d'Autoire. 24.06.2005. DK 06.

- Pinsac, versant et crête, 1 km au NE du Pech de Pinsac. Station contenant aussi : *Biscutella laevigata* subsp. *controversa*. 19.05.2005. CK 86.

➤ *Carduus nigrescens* subsp. *spinifer*

- Autoire, versant sous le château des Anglais. 22.05.2005 (avec R. GOUX). DK 06.

- Lacave, Rocamadour, vallée de l'Ouyse, amont et aval du moulin de Cougnaguet. 14.07.2005. CK 86.

➤ *Carex tomentosa*

- Floirac, la Gardelle, dans le four à chaux en ruines ; espèce probablement méconnue. 25.06.2005. CK 97.

➤ *Cephalanthera rubra*

- Autoire, versant au-dessous du château des Anglais, exposition E. Station possédant aussi *Platanthera bifolia*. 22.05.2005 (avec R. GOUX). DK 06.

- Lacave, versant SO de Canteloube et vallée de l'Ouyse, 1 km aval moulin de Cougnaguet sur éboulis fixés en voie de colonisation par la fruticée ; fréquente dans ce type de station comme pionnière d'ourlet. 14.07.2005. CK 86.

- Rocamadour, versant au S de la Vitalie, avec *Euphrasia nemorosa*. 07.07.2005. CK 86.

➤ *Fumana ericoides*

- Lacave, Rocamadour, aux alentours du moulin de Cougnaguet, au pied des balmes et sur les vires de la vallée de l'Ouyse et du vallon adjacent de Canteloube. 14.07.2005. CK 86.

➤ *Galium timeroyi*

- Lacave, vallée de l'Ouyse, en face du moulin de la Treille et 1 km aval moulin de Cougnaguet et versant au SO de Canteloube ; sur éboulis fins. 07.07.2005. CK 86.

➤ *Genista sagittalis*

- Lacave, vallée de l'Ouyse, en face du moulin de la Treille. Présence également de *Geranium sanguineum*. 07.07.2005. CK 86\*.

➤ *Geranium phaeum*

- Floirac, la Gardelle, dans la forêt alluviale, avec *Impatiens noli-tangere*. 25.06.2005. CK 97\*.

➤ *Glyceria striata* subsp. *stricta*

- Carennac, île de Grand Bourgnoux, bord du bras secondaire en face de la station d'épuration. 25.06.2005. DK 07.

- Floirac, la Gardelle, dans la forêt alluviale, en bordure d'un petit chenal de crue. 25.06.2005. CK 97.

➤ *Helichrysum stoechas*

- Lacave, versant au SO de Canteloube ; présence aussi de *Inula spiraeifolia*. 14.07.2005. CK 86.

➤ *Helosciadium nodiflorum*

- Lacave, dans l'Ouyse à Valeille avec *Lemna trisulca*, *Nuphar lutea*. 07.07.2005. CK 86

➤ *Hieracium pallidum*

- Pinsac, chemin au sommet du versant abrupt 1 km au NE du Pech de Pinsac ; avec *Leontodon crispus*. 19.05.2005. CK 86.

➤ *Hypericum montanum*

- Lacave, vallée de l'Ouyse à la Font du Truffé. 07.07.2005. CK 86.

➤ *Iris foetidissima*

- Pinsac, Combe de Brigou. 19.05.2005. CK 86\*.

- *Laserpitium gallicum*
  - Lacave, versant exp. SO de la vallée de l'Ouyse, 1 km aval du moulin de Cougnaguet. 14.07.2005. CK 86.
- *Lathyrus niger*
  - Lacave, versant exp. SO de la vallée de l'Ouyse, 1 km en aval du moulin de Cougnaguet, en ourlet. 14.07.2005. CK 86.
- *Lavandula angustifolia*
  - Lacave, vallée de l'Ouyse, talus 300 m à l'aval du moulin de Cougnaguet ; subsponané. 07.07.2005. CK 86.
  - Rocamadour, chez Langle, en touffe isolée au bord du chemin. 07.07.2005. CK 86.
- *Lilium martagon*
  - Autoire, au pied de l'escarpement boisé le long de la D 38 (quelques individus). 22.05.2005. DK 06.
- *Limodorum abortivum*
  - Rocamadour, près du moulin de Cougnaguet ; présence également de *Orobanche amethystea*. 07.07.2005. CK 86.
- *Linaria supina*
  - Lacave, vallée de l'Ouyse, 1 km en aval du moulin de Cougnaguet sur éboulis fins et versant au SO de Canteloube ; avec *Silene vulgaris* subsp. *prostrata* abondant. 07.07.2005. CK 86.
- *Linum bienne*
  - Floirac, la Gardelle, dans une prairie du lit majeur ; avec *Vicia lutea*. 25.06.2005. CK 97.
- *Linum leonii*
  - Lacave, 1 km à l'aval du moulin de Cougnaguet sur un versant exposé SO et versant au SO de Canteloube. 14.07.2005. CK 86.
  - Pinsac, sommet du versant abrupt 1 km au NE du Pech de Pinsac. 19.05.2005. CK 86.
  - Rocamadour, 200 m au N du moulin de Cougnaguet, versants O et SO. 14.07.2005. CK 86.
- *Lithospermum purpurocaeruleum*
  - Lacave, vallée de l'Ouyse, en face du moulin de la Treille et 1 km à l'aval du moulin de Cougnaguet, versant exposé au SO ; présence de *Ononis natrix* et *Ononis striata*. 07.07.2005. CK 86.
- *Mercurialis annua* subsp. *huetii*
  - Autoire, versant sous le château des Anglais et le long de la D 38. 22.05.2005 (avec R. GOUX). DK 07.
- *Ophrys insectifera*
  - Pinsac, près du chemin au sommet du versant abrupt, 1 km au NE du Pech de Pinsac ; avec *Ophrys scolopax*. 23.05.2005 (avec R. GOUX). CK 86.
- *Oreoselinum nigrum* (= *Peucedanum oreoselinum*)
  - Floirac, la Gardelle, dans une prairie sablonneuse du lit majeur ; avec *Rorippa stylosa*. 25.06.2005. CK 97\*.

- *Phillyrea media*
  - Pinsac, versant abrupt 1 km au NE du Pech de Pinsac ; un seul individu parmi les pieds de *Rhamnus alaternus*. 19.05.2005. CK 86.
- *Pistacia terebinthus*
  - Lacave, Rocamadour, vallée de l'Ouyse, aux environs du moulin de Cougnaguet et en face du moulin de la Treille, individus isolés. 14.07.2005. CK 86.
- *Quercus ilex*
  - Pinsac, versant 750 m au S du Lac de Garet et 1 km au N de Rougié. 19.05.2005. CK 86.
- *Rumex scutatus*
  - Lacave, 1 km à l'aval du moulin de Cougnaguet, sur éboulis, versant exposé au SO ; espèce rare dans le département. 14.07.2005. CK 86.
- *Salix atrocinerea*
  - Rocamadour, "lac"-lavoir (mare) de la Vitalie. 07.07.2005. CK 86.
- *Sedum ochroleucon*
  - Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais. 24.06.2005. DK 07.
- *Sideritis peyrei* subsp. *guillonii*
  - Rocamadour, 200 m au N du moulin de Cougnaguet sur une vire avec *Stipa pennata* et *Orobanche amethystea*. 14.07.2005. CK 86.
- *Silaum silaus*
  - Lacave, vallée de l'Ouyse, à Valeille. 07.07.2005. CK 86.
- *Spiraea hypericifolia* subsp. *ovata*
  - Lacave, versant SO de Canteloube, avec *Staehelina dubia*, *Euphorbia seguieriana*. 14.07.2005. CK 86.
  - Pinsac, versant à 1 km au N de Rougié, avec *Staehelina dubia*, *Euphorbia seguieriana*. 23.05.2005 (avec R. GOUX). CK 86.
- *Torilis leptophylla*
  - Lacave, 1 km aval moulin de Cougnaguet sur une vire. 14.07.2005. CK 86.
- *Verbascum thapsus* subsp. *montanum*
  - Lacave, versant au SO de Canteloube et 1 km aval moulin de Cougnaguet versant exp. SO. 14.07.2005. CK 86.
- *Vitis rupestris*
  - Lacave, vallée de l'Ouyse, à la Font du Truffé. 07.07.2005. CK 86.

## 66 – Département des Pyrénées-Orientales

Contribution de Martine BRÉRET

- *Corallorrhiza trifida*
  - Commune de Prats-de-Molló. Un pied défléuri au bord de l'ancienne piste montant aux anciennes mines du Costabonne, avant la bifurcation pour aller à Can Peraféu. 14 juillet 2005.

➤ *Epipactis microphylla*

- Commune de Prats-de-Molló. Chemin de La Forge (La Preste) au Col de Siern. Un pied en fleurs dans le dernier lacet avant d'arriver sur une piste forestière récente. 26 juillet 2005.  
Cette orchidée est fidèle à cet endroit depuis 9 ans, en un seul exemplaire.
- Commune de Prats-de-Molló. Un pied en fleurs dans le vallon menant à Notre-Dame-du-Corral, avec la station de *Carpesium cernuum*. 25 juillet 2005.

Contribution de Dominique PATTIER

➤ *Carpesium cernuum*

- Commune de Prats-de-Molló. Çà et là le long du chemin allant du Col de la Guille à Notre-Dame-du-Corral, dans le vallon, avant de franchir le torrent du Corral. 25 juillet 2005.

Contribution de Didier PERROCHE

➤ *Delphinium verdunense*

- Jujols, vides à annuelles autour du croisement du sentier des carrières avec le ravin de Serrat Mitjan. 05-08-2002, revu le 07-08-2005. (D.P.).

➤ *Lysimachia ephemera*

- Jujols, deux pieds fleuris au niveau du croisement du sentier des carrières avec le ravin de Fraycinell. 07-08-2005. (D.P.).

## 79 - Département des Deux-Sèvres

Contribution de Yves BARON

➤ *Odontites jaubertiana*

- Granzay-Gript, devant le transformateur (site à *Arenaria controversa*), diverses formes, dont *O. chrysantha* (?), à revoir (7-9-05).

➤ *Pimpinella magna*

- L'Absie, entrée sud de la forêt, fossé de la D 179 (8-9-05).

Contribution de Antoine CHASTENET (A.C.),  
Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.),  
Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.),  
Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).

➤ *Cardamine parviflora*

- Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Quelques pieds localisés et peu abondants sur la rive nord. 17-09-2005. (P.G.).

➤ *Chenopodium glaucum*

- Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Nombreux pieds tout autour de l'étang en assec avec *Chenopodium rubrum*, *Corrigiola littoralis*, *Eleocharis acicularis*, *Cyperus michelianus* et *fuscus*, *Rumex maritimus*, *Rorippa palustris* et *Oenanthe aquatica*. 17-09-2005. (P.G.).

➤ *Chenopodium rubrum*

- Ménigoute, étang de la Laurencière. 24-09-2005. (A.C., P.G.).

➤ *Epilobium montanum*

- Vasles, bois de l'Abbesse. 2 pieds. 28-05-2005. (A.C., P.G.).

➤ *Euphorbia stricta*

- Vasles, bois de l'Abbesse. Une belle station dans le fossé. 28-05-2005. (A.C., P.G.).

➤ *Gastridium ventricosum*

- Thouars, cascade des Pommiers au niveau du motocross. Importante colonie de cette espèce fugace avec des pieds particulièrement luxuriants. 30-06-2005. (P.G.).

➤ *Hydrocharis morsus-ranae*

- Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Très abondant à l'état végétatif dans plusieurs secteurs de l'étang. 17-09-2005. (P.G.).

➤ *Lathyrus pannonicus* subsp. *asphodeloides*

- Courgé, dans les prairies près du courant de Raganne. 22-04-2005. (M.H.J.).

➤ *Limosella aquatica*

- Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Quelques pieds de cette espèce peu fréquente. 17-09-2005. (P.G.).

➤ *Ludwigia palustris*

- Ménigoute, étang de la Laurencière. Une petite population mêlée à *Lythrum portula*, *Callitriche obtusangula* forme exondée et *Leersia oryzoides*. 24-09-2005. (A.C., P.G.).
- Ménigoute, étang de Bois Pouvreau, très abondant en compagnie de *Eleocharis acicularis*. 10-10-2005. (M.H.J.).

➤ *Myosotis secunda*

- Vasles, bois de l'Abbesse. Une petite population le long du ruisseau avec *Ranunculus omiophyllus* et à proximité *Eleogiton fluitans* et *Stellaria alsine*. 28-05-2005. (A.C., P.G.).

➤ *Narcissus pseudonarcissus*

- Rom, bois de la Caillette et bois près du carrefour de la Croix Barricaud, abondant, 20-03-2005. (M.H.J.).

➤ *Ophioglossum azoricum*

- Thouars, vallée du Pressoir au niveau du Château. Nouvelle et belle station pour cette espèce devenue rarissime avec *Sedum villosum* et à proximité *Teesdalia coronopifolia*, *Arnoseris minima*, *Anthoxanthum aristatum*. 28-05-2005. (P.G.).

➤ *Potamogeton trichoides*

- Vasles, bois de l'Abbesse. Une petite population au milieu de l'étang. 28-05-2005. (A.C., P.G.).

- *Potentilla supina*
  - Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Très abondant tout autour de l'étang. 17-09-2005. (P.G.).
- *Spergularia echinosperma*
  - Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Plusieurs pieds de cette espèce découverte en 1997 par Jean TERRISSE. 17-09-2005. (P.G.).
- *Zannichellia palustris* subsp. *palustris*
  - Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de Beaurepaire. Une petite population repérée sur le bord de l'étang avec *Najas marina* subsp. *marina* et *Ranunculus peltatus* subsp. *peltatus*. 17-09-2005. (P.G.).

## Contribution de Olivier LACHENAUD

- *Adonis annua*
  - Chenay, Mellier (1997, 2004).
- *Ambrosia artemisiaefolia*
  - Chenay, Mellier, champ de Tournesol (1999-2005).
- *Anagallis minima*
  - Celle-l'Evescault, est de la forêt de Saint-Sauvant, près de la D 96, avec *Lythrum portula*, *Scirpus setaceus* (07-05).
- *Amaranthus ascendens*
  - Lezay, Bignet (08-99) ;
  - Sainte-Soline, Bignolèse, jardin (08-04).
- *Amaranthus graecizans*
  - Chenay, Mellier, Jassay (2005) ;
  - Vançais, Courgé ;
  - Sainte-Soline, Bonneuil ;
  - Arçais, La Croix des Marys (08-01).
- *Bromus wildenowii* (= *catharticus*)
  - Exoudun, (été 2001) ;
  - Lezay ;
  - Sainte-Soline ;
  - Chey (07-05).
- *Coronopus didymus*
  - Arçais, La Croix des Marys (08-01).
- *Cynoglossum officinale*
  - Chenay, Mellier, talus, abondant (1996).
- *Galium boreale*
  - Chey, bord de la Sèvre (07-05).
- *Gymnaderia conopsea*
  - Lezay, Grand Champ (05-04).
- *Lathyrus pannonicus*
  - Chenay, Hautes Bourdellières (2003) et Mellier, pré humide (04-05).

- *Medicago orbicularis*
  - Chenay, Jassay (05-03).
- *Ophioglossum vulgatum*
  - Chenay, Hautes Bourdellières, pré humide, quelques ares (05-04).
- *Orchis ustulata*
  - Chenay, Hautes Bourdellières, une cinquantaine de pieds (05-04), Mellier, une cinquantaine de pieds (04-05).
- *Panicum dichotomiflorum*
  - Chenay, Mellier, champ de blé (08-01).
- *Pentaglottis sempervirens*
  - Lezay, D17, fossés au croisement de Rom (05-97) ;
  - Rouillé, le Grand Breuil, fossés de la N 150 (1997 ; déjà signalé par CONTRÉ en 1979) ;
  - Saint-Sauvant, Faljoie, petit bois (05-05).
- *Petroselinum segetum*
  - Chenay, Mellier, Jassay, répandu.
- *Phalaris paradoxa*
  - Chenay, Mellier (07-02).
- *Legousia hybrida*
  - Chenay, Mellier (05-03, non revu depuis).
- *Ranunculus ophioglossifolius*
  - Lezay, l'Erable, pré marécageux, avec *Fritillaria meleagris*, *Carex disticha*, *Lathyrus pannonicus*, *Trifolium patens*, *Inula salicina*, *Cirsium tuberosum*. (O. L. et Y. B.16-4-04).
- *Stachys arvensis*
  - Chenay, Mellier, friche (08-03), jardin (04-04).
- *Symphytum tuberosum*
  - Lezay, route de Sainte-Soline (05-03).
- *Teucrium scordium*
  - Chenay, Les Basses Bourdellières, mare, environ 50 pieds (2002).
- *Trifolium patens*
  - Lezay, Grand Champ (05-03)†; Chenay, Hautes Bordellières (05-04).

## 85 - Département de la Vendée

Contribution de Marie-Hélène JEANNEAU

- *Carex pseudocyperus*
  - La Boissière-de-Montaigu, étang de la Bultière. 15-07-2005. (M.H.J.).
- *Carex vesicaria*
  - Saint-Malo-du-Bois, Poupet. 16-05-2005. (M.H.J.).
- *Centaurea cyanus*
  - Chambretaud, le Boisniard, chemin des Tarons, quelques pieds le long d'un champ de blé. 16-05-2005. (M.H.J.).

➤ *Crassula tillaea*

- Chambretaud, le Boisniard, chemin des Tarons, assez abondant. 18-04-2005 et 16-05-2005. (M.H.J.).

- Saint-Malo-du-Bois, Poupet. 16-05-2005. (M.H.J.).

➤ *Hydrocharis morsus-ranae*

- Saint-Aubin-des-Ormeaux, vallée de la Sèvre Nantaise. 19-09-2005. (M.H.J.).

➤ *Sedum anglicum*

- Saint-Malo-du-Bois, Poupet. 16-05-2005. (M.H.J.).

➤ *Trifolium micranthum*

- La Boissière-de-Montaigu, étang de la Bultière, La Maurosière. 15-07-2005. (M.H.J.).

## 86 - Département de la Vienne

Contribution de Yves BARON

➤ *Aethusa cynapium*

- Saint-Benoît, l'Hermitage, jardin de l'auteur (août 2005).\* (voir note page suivante)

➤ *Althaea cannabina*

- Vouillé, Comméré (20-8-05).

➤ *Ambrosia artemisiaefolia*

- Saint-Benoît, l'Hermitage, jardin de l'auteur, deux pieds, détruits au début de l'anthèse... (été 05). \*

➤ *Anacamptis pyramidalis*

- Fontaine-le-Comte, la Devinalière, berme est de la D 40, plusieurs dizaines (3-6-05).

---

\* A l'intérieur des anthropochores, il conviendrait ainsi de distinguer les "botanochores" ou espèces colportées par les botanistes ! Pour ne parler que du jardin évoqué ci-dessus, ont été notées au fil des années : *Cardamine impatiens* (commune au bord du Clain, mais quelque 20 m en contrebas), *Phacelia tanacetifolia* (issu des jachères PAC), *Ambrosia artemisiaefolia* (transmis plusieurs fois pour identification) ; sur le trottoir limitrophe, *Viola riviniana* (commun dans les chênaies sessiliflores des environs, en une belle bordure éliminée, malgré oppositions réitérées, par le Round-up municipal !), *Petroselinum segetum*, *Euphorbia exigua* (suite vraisemblable de prospections messicoles, la seconde encore présente cette année), *Astragalus glycyphyllos*, et même *Erysimum cheiranthoides*, souvenir possible de prospections dans le marais poitevin, plus *Roripa sylvestris*, au bord d'une autre rue du quartier... toutes espèces, probablement venues, à son insu, par le truchement du sursigné... mais aussi, *Hypericum androsaemum* ou *Euphorbia lathyris*, qui prolifèrent ici ou là depuis leur volontaire transplantation aussi ancienne que ponctuelle, alors que la première est si sporadique dans la Chênaie-Hêtraie ! De sorte que cette cohorte pourrait à son tour se voir subdiviser (latinistes (et hellénistes !), à votre Gaffiot !) en "nolobotanochores" clandestinement introduites, et les "volobotanochores", où l'action transgressive est délibérée, et souvent peu recommandable, même si l'exemple vient de haut, et de loin (n'est-ce pas Messieurs ROBIN, LUDWIG, REYNOUTRI, ou quelque chose comme ça : ah, celui-là, s'il a vraiment existé et si on pouvait le tenir !

- *Daphne laureola*
  - Béruges, bois du Cerne, avec *Euphorbia villosa*, *Isopyrum thalictroides* et *Aquilegia vulgaris* (19-5-05).
- *Fagus sylvatica*
  - Château-Larcher, entrée de Baptesse, 2,28 m de circonférence, en conditions limites en Poitou aux étés trop secs, où il se localise en bois de versants frais. Le Hêtre y était inconnu jusqu'à présent comme arbre d'alignement (30-5-05).
- *Medicago orbicularis*
  - Dissay, les Pendants (2-6-05).
- *Mycelis muralis*
  - Smarves, bois de Saint-Pierre, la Reculée (1-7-05).
- *Odontites jaubertiana*
  - Roches-Prémarie, la Porchalière, berme sud de la route de la Villedieu (16-9-05).
- *Orobanche ramosa*
  - Aslonnes, au Grand Goulard, en pied de haie de la D 88, plus de 80 hampes (8-6-05).

Contribution de Antoine CHASTENET (A.C.),  
 Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.),  
 Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.),  
 découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).

- *Adonis annua* subsp. *annua*
  - Frozes, le long de cultures de colza (3 observations) où cette plante arrive à se maintenir. 01-02-2005. (A.C.).
- *Consolida regalis*
  - Vouillé, Traversonne, 2 pieds. 30-06-2005. (A.C.).
- *Cynoglossum officinale* L.
  - Avanton, « Champ de Bataille », le long de la voie ferrée en compagnie de *Lithospermum officinale*. 06-05-2005. (A.C.).
- *Cuscuta epithymum* subsp. *trifolii*
  - Vouzailles, dans deux champs de luzerne au bord de la D. 84 entre Vouzailles et La Rondelle. Cette plante m'a été montrée pour la première fois par mon père en 1995 à Champigny-le-Sec. Elle a été revue en 1996 dans cette même commune ainsi qu'à Maillé. Elle est donc toujours présente dans ce secteur où elle est susceptible d'être observée dans les vieilles luzernes. Espèce méconnue dans la Vienne, à rechercher méthodiquement. 22-07-2003, revue le 15-07-2005. (D.P.).
- *Datura stramonium* subsp. *stramonium* var. *tatula*
  - La Puye, étang de La Puye. Quelques pieds de cette variété à la queue de l'étang en compagnie du type. 29-09-2005. (P.G.).
  - Saint-Sauvant, Longes, assez abondant dans un champ de tournesols. 27-08-2004. (M.H.J.).

- *Daphne laureola* L. subsp. *laureola*
  - Béruges, une belle population dans les bois de Béruges. 20-03-2005. (A.C.).
- *Deschampsia cespitosa* subsp. *cespitosa*
  - Montreuil-Bonnin, une touffe près du stade. 02-07-2005. (S.B.C.O.-86).
- *Epilobium montanum*
  - Saint-Sauvant, forêt domaniale, D 96. 08-07-2005. (M.H.J.).
- *Epipactis palustris*.
  - Montreuil-Bonnin. Station déjà connue et signalée par Michel BRAMARD. 02-07-2005. (S.B.C.O.-86).
- *Equisetum* × *littorale*
  - Vouneuil-sous-Biard, Pinail, aux abords d'une mare. Deuxième mention de cet hybride qui avait été trouvé par RALLET dans les landes de Chitré. 16-07-2005. (P.G.).
- *Euphorbia platyphyllos* subsp. *platyphyllos*
  - Brux. Quelques pieds dans le lit de la Bouleure asséchée. 18-06-2005. (SBCO-86).
- *Galium divaricatum*
  - Vouneuil-sous-Biard, Pinail. Population très localisée sur le pare-feu sud de la réserve naturelle du Pinail. 07-07-2005. (P.G.).
- *Galium parisiense*
  - La Grimaudière, moulin de Cholet. Quelques pieds de cette espèce peu fréquente avec *Bombacillaena erecta* et *Teucrium botrys*. 12-05-2005. (P.G.).
- *Genista anglica*
  - Archigny, les Jolines. Quelques pieds de cette espèce qui semble se raréfier. 16-06-2005. (P.G.).
- *Gratiola officinalis*
  - Payré, prairie de Payré. Quelques pieds sur le bord du plan d'eau avec *Anagallis tenella* et *Samolus valerandi*. 21-06-2005. (P.G.).
- *Hottonia palustris*
  - La Puye, étang de La Puye. Encore une nouvelle station pour cette espèce peu fréquente. 29-09-2005. (S.P.).
- *Lamium hybridum*
  - Vendevre-du-Poitou, la Servanterie. Quelques pieds dans une vigne. 13-03-2005. (P.G.).
- *Lathraea squamaria*
  - Béruges, vallée de la Boivre, bois de la Brousse. Une centaine de hampes fleuries près de la source de l'Achenaud, une cinquantaine dans le bois à mi-pente et une vingtaine le long d'un ruisseau à sec de cette espèce inscrite sur la liste rouge régionale. 26-03-2005. (A.C.).
- *Lathyrus tuberosus*
  - Migné-Auxances, à Saint-Nicolas en lisière d'une seule parcelle. 08-06-2003, non revu depuis. (D.P.).
- *Limosella aquatica*
  - Coulombiers, étang de Maupertuis. Plusieurs pieds de cette espèce qui semblait avoir disparu de la Vienne avec *Chenopodium rubrum*, *Ranunculus sceleratus*,

*Rorippa palustris* et *sylvestris*, *Potentilla anserina*, *Plantago major* subsp. *intermedia*, *Oenanthe aquatica* et *Rumex maritimus*. 11-10-2005. (P.G.).

➤ *Misopates orontium*

- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas, un seul pied. 15-07-2005, revu le 20-08-2005. (D.P.).

➤ *Muscari botryoides* subsp. *lelievrei*

- La Roche-Posay, les Bornais. Belle population au niveau d'un sous-bois assez clair. C'est à cette sous-espèce que correspondent les individus de cette station indiquée par Pierre PLAT. 24-03-2005. (P.G.).

➤ *Narcissus pseudonarcissus*

- Béruges, vallée de la Boivre. Une touffe en lisière du bois de la Brousse. 27-03-2005. (A.C.).

➤ *Orobanche purpurea*

- La Grimaudière, moulin de Cholet. Importante population le long d'un champ de colza. 12-05-2005. (P.G.).

➤ *Panicum dichotomiflorum*

- Mignaloux-Beauvoir, les Bruères. Belle population, dans un fossé, de cette graminée qui est apparue depuis peu dans la Vienne. 14-09-2005. (A.C.).

➤ *Potamogeton berchtoldii*

- Payré, prairie de Payré. Repéré dans la rivière avec *Potamogeton lucens*, *Spirodela polyrhiza* et *Sagittaria sagittifolia*. 21-06-2005. (P.G.).

- Saint-Maurice-la-Clouère. 09-07-2005. (SBCO-86).

➤ *Potamogeton trichoides*

- Saint-Maurice-la-Clouère. 09-07-2005. (SBCO-86).

- Montreuil-Bonnin, « le Moulin Neuf » dans une partie calme de la Boivre. 10-07-2005. (A.C.).

➤ *Potentilla supina*

- La Puye, étang de La Puye. Abondant sur la rive sud avec *Cyperus michelianus*, *Crypsis alopecuroides*, *Eleocharis ovata*, *E. acicularis* et *Pseudognaphalium luteoalbum*. 29-09-2005. (P.G.).

- Coulombiers, étang de Maupertuis. 11-10-2005. (P.G.).

Ce sont deux nouvelles stations pour cette espèce qui n'était connue jusqu'alors que des étangs du camp militaire de Montmorillon.

➤ *Primula* × *polyantha* Mill.

- Béruges, plusieurs pieds dispersés le long de la route qui traverse le « Vau noir » en présence des « parents » (*Primula acaulis* qui est rare à l'ouest de Poitiers et *Primula veris*). 28-03-2005. (A.C.).

- Montreuil-Bonnin, le long de la route en face la ZNIEFF en présence des « parents ». 28-03-2005. (A.C.).

➤ *Senecio inaequidens*

- Saint-Cyr, Plan d'eau. Encore une station pour cette espèce qui se répand doucement avec *Sporobolus indicus* ainsi que *Scirpoides holoschoenus* toujours présent. 27-10-2005. (P.G.).

➤ *Sixalix atropurpurea* subsp. *atropurpurea*

- Migné-Auxances, Chardonchamps. Cette espèce semble se répandre depuis

quelques années aux abords des axes routiers et ronds-points. 23-06-2005. (P.G.).

➤ *Stachys alpina* subsp. *alpina*

- Brux. Quelques taches dans le sous-bois. 18-06-2005. (SBCO-86).

➤ *Teucrium scordium* subsp. *scordioides*

- Brux. Cette sous-espèce beaucoup, plus rare, était assez abondante dans le lit de la Bouleure complètement en assec. 18-06-2005. (SBCO-86).

- Montreuil-Bonnin. Première observation de cette sous-espèce sur la ZNIEFF (l'autre sous-espèce y est abondante). 10-07-2005. (A.C.).

➤ *Vicia cassubica*

- Saint-Sauvant, forêt domaniale, quelques pieds. 21-05-2005. (M.H.J.).

➤ *Viola alba* subsp. *alba*

- Latillé, Puy Hervé, autre station que celle signalée en 2004, à 300 mètres. Une cinquantaine de pieds. 19-03-2005. (A.C.).

- Béruges, plusieurs dizaines de pieds dispersés le long de la lisière du bois de la Brousse (orientée sud-ouest). 27-03-2005. (A.C.).

- Béruges, plusieurs dizaines de pieds dispersés le long de la route qui traverse le « Vau noir ». 28-03-2005. (A.C.).

➤ *Vulpia unilateralis*

- Montamisé, Ensoulesse. 03-05-2005. (P.G.).

➤ *Zannichellia palustris* subsp. *palustris*

- Saint-Cyr, plan d'eau. Une petite station avec *Najas marina*. 27-10-2005. (P.G.).

- Saint-Maurice-la-Clouère. 09-07-2005. (SBCO-86).

#### Contribution de Olivier LACHENAUD

➤ *Amaranthus ascendens*

- Romagne, la Borichère (08-00).

➤ *Amaranthus graecizans*

- Buxerolles, bord de route (08-99) ;

- Pleumartin (08-01).

➤ *Bromus wildenowii* (= *catharticus*)

- Romagne, la Borichère (08-00) ;

- Saint-Sauvant, divers points (2003) (en expansion rapide dans le secteur).

➤ *Chamaecytisus supinus*

- Pleumartin, coteau à Genévriers (08-02).

➤ *Dianthus superbus*

- Saint-Sauvant, forêt RF Lorentz, un pied (08-94, non retrouvé depuis).

➤ *Dichantium ischaemum*

- Saint-Sauvant, forêt, RF Lorentz (08-99).

➤ *Duchesnea indica*

- Saint-Sauvant, laie au sud de la Branlerie (07-05).

➤ *Hesperis matronalis*

- Saint-Sauvant, RF Lorentz (07-96, non revu depuis).

- *Impatiens glandulifera*  
- Voulon, le Petit Allier, bras du Clain (1997).
- *Linum trigynum*  
- Saint-Sauvant, laies forestières (1997).
- *Mentha arvensis*  
- Lathus, Portes d'Enfer (08-00).
- *Panicum dichotomiflorum*  
- Lathus, Porte d'Enfer (08-00).
- *Stachys arvensis*  
- Romagné, la Borichère (2001).
- *Stachys germanica*  
- Pleumartin, lisière forêt (08-00).
- *Thlaspi arvense*  
- Pleumartin (08-01).
- *Trifolium hybridum*  
- Pleumartin, bord de route (08-01).

**ERRATA :**

- Compte rendu de la sortie du 9-06-2001 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **33** : 210 : en bas ne pas lire "DANGEARD père", mais "B. SOUCHÉ"... "suivi du fils DANGEARD (10 ans) - son brillant successeur"... (le "président" patoisant invoqué dans le compte rendu de l'époque étant manifestement celui de la S.B.D.S. plutôt que l'éphémère président de la section poitevine.
- Compte rendu de la sortie du 25-05-2002 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 274 : en bas, lire bien sûr *Anchusa* (= *Lycopsis*) *arvensis* et non *Lycopus europaeus*, s'agissant de messicoles.