

Contributions à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, les trouvailles intéressantes qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, avant le 31 mars, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune en premier lieu**, puis du lieudit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- les contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique des genres.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin de l'année précédente.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce – qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre – il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet

d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du Bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

17 - Département de la Charente-Maritime

Contribution de Yves BARON

► *Conium maculatum*

- De Nuaille-d'Aunis (depuis le Curé) à Lagord, bernes N 11, abondant (30/04/2008).

Contribution de Pierre LE GALL

► *Bupleurum lancifolium*

- Nieul-sur-Mer. Observé un très bel exemplaire au printemps 2008, en bordure d'un champ de tournesol du secteur des Trois Chirons (01°10.48 O - 46°13.09 N).

Contribution de Dominique PATTIER

► *Centranthus calcitrapae*

- Ile de Ré. Forêt du Lisay, quelques pieds çà et là sur les dunes (29-04-2006).
Taxon ne figurant pas dans l'inventaire des plantes vasculaires de l'île de Ré de André TERRISSE, donc probablement implanté depuis peu dans l'île.

► *Galium mollugo* subsp. *neglectum*

- Île d'Oléron. Dunes des Huttes, le long du chemin parallèle à la mer menant à un petit étang. Une station de quelques pieds (26-06-2006).

► *Hedypnois cretica*

- Île d'Oléron, Bellevue. Quelques pieds dans le parc de stationnement sableux du bout de la route (15-05-2006).

► *Hymenolobus procumbens*

- Île d'Oléron, Bellevue. Une petite population le long du chemin sableux partant vers l'est de l'ultime parc de stationnement (14-05-2006).

► *Pistia stratiotes*

- Île d'Oléron, Avail. Probablement introduit dans un trou d'eau aménagé pour l'irrigation dans une zone de jardins (23-06-2006).

► *Stenotaphrum secundatum*

- Île d'Oléron, sur le port de La Cotinière. Cette graminée, d'origine américaine, occupe quelques mètres carrés entre les blocs endiguant le nord du nouveau bassin du port (01-01-2009).

► *Veronica cymbalaria*

- Île d'Oléron, La Brée-les-Bains, pointe des Boulassiers. Localisé au bord du chemin sableux menant à la pointe, une vingtaine de pieds (25-03-2007).

Contribution de Jean TERRISSE
(Années 2006 à 2008)

► *Acorus calamus*

Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime. Elle a été découverte en 1999 par P. JOURDE au cours de prospections odonatologiques menées en canoë sur la Charente. Nous signalons ici les stations que nous avons observées depuis :

- Port-d'Envaux au nord de Les Rivauds ;
- Port-d'Envaux au Pré d'Agonnay ;
- Saintes entre Lormont Bas et la station d'épuration ;
- Dompierre-sur-Charente sous le Bas-Bourg ;
- Brive-sur-Charente vers la Fosse ;
- Salignac-sur-Charente au nord-ouest du Port du Lys (2006 et 2007).

► *Allium ericetorum*

- La Gripperie-Saint-Symphorien, 3 petites stations dans des layons de lande mésophile à *Erica scoparia*, un peu au sud de la Montée Gironde, (09-2007) ;
- Bussac-Forêt, abondant dans une moliniaie-lande (*Erica scopariae* - *Molinietum*) de plusieurs hectares acquise par le CREN, vers la « Petite Ferrière » (septembre 2007).

► *Angelica heterocarpa*

- Au cours d'une étude financée par la DIREN Poitou-Charentes dans le cadre du site Natura 2000 de la moyenne vallée de la Charente, un inventaire systématique des stations de cette espèce a été réalisé depuis un bateau, sur les 2 berges entre Saintes et Saint-Savinien : environ 500 pieds d'Angélique des estuaires ont été recensés sur les communes de Saint-Savinien, Crazannes, Port-d'Envaux et Taillebourg (en amont de cette commune, il semble que seule *Angelica sylvestris* soit présente). L'étude complète est téléchargeable sur le site <http://pc70valcharente.natura2000.fr/>.

- *Asparagus maritimus*
 - Le Château-d'Oléron, Pointe Blanche, 1 touffe (1-09-2008).
- *Avenula lodunensis*
 - Bussac-Forêt, plusieurs centaines de pieds en lisière d'une moliniaie-lande (*Erico scopariae* - *Molinietum*) de plusieurs hectares acquise par le CREN, vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
- *Cardamine parviflora*
 - Saint-Laurent-de-la Prée, prairie hygrophile de l'*Oenanthion fistulosae* au nord du Pont de Charras (05-2007).
- *Cardamine sylvatica*
 - Clérac, bord du Lary (9-09-2005).
- *Carex binervis*
 - Bussac-Forêt, une grosse station d'une centaine de touffes au moins dans la moliniaie-lande (*Erico scopariae* - *Molinietum*), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008) ;
 - Corignac, 3 petites stations dans le secteur des Brandes de Corignac (08- 2006).
- *Carex depauperata*
 - La Gripperie-Saint-Symphorien, çà et là, localement pas rare dans le bois de la Rouillasse sous des faciès secs de chênaie pédonculée, Réserve Naturelle Volontaire de La Massonne (26-05-2008).
- *Carex echinata*
 - Saint-Pierre-du-Palais, combe humide juste à l'est de Chagnaud ;
 - Saint-Pierre-du-Palais, prairie à l'ouest de Merveillaud (21-05-2006).
- *Carex hostiana*
 - Bussac-Forêt, des milliers de pieds dans une moliniaie-lande (*Erico scopariae* - *Molinietum*) (16-05-2008). Rappelons que ce *Carex* est RR en Charente-Maritime.
- *Carex pulicaris*
 - Bussac, des centaines de pieds dans une moliniaie-lande (*Erico scopariae* - *Molinietum*), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008) ;
 - Corignac, 3 petites stations (moins de 20 pieds en tout) dans le secteur des Brandes de Corignac (06-2006).
- *Carex punctata*
 - La Gripperie-Saint-Symphorien, plusieurs stations dans la Réserve Naturelle Volontaire de La Massonne et, notamment, très abondant le long du sentier bordant le ruisseau qui traverse le Bois de la Rouillasse (26-05-2008).
- *Carex umbrosa*
 - La Gripperie-Saint-Symphorien, çà et là, localement AC dans le Bois de la Rouillasse sous futaie de *Quercus robur* pélophile et plus ou moins hydromorphe, RNV La Massonne (26-05-2008).
- *Carex viridula*
 - Corignac, une micro-station en bordure d'une unique mare du secteur des Brandes (08-2006).

- *Centaureum spicatum*
 - Saint-Laurent-de-la-Prée, des milliers de pieds dans un faciès surpiétiné par des chevaux (avec pâturage hivernal) de l'*Alopecuro bulbosi* - *Juncetum gerardii* à l'ouest du Pont de Charras (08-2007).
- *Coronilla scorpioides*
 - Saint-Porchaire, 2 individus dans une pelouse calcicole xérophile (*Bellidi pappulosae* - *Festucetum marginatae*) de « Bel-Air » (15-05-2007).
- *Cynosurus echinatus*
 - La Gripperie-Saint-Symphorien, une énorme station de plusieurs ares et de plus d'un millier de pieds dans une pelouse calcifuge psammophile pâturée par des chevaux, RNV de La Massonne (26-05-2008).
- *Dactylorhiza elata*
 - Saint-Pierre-du-Palais, 3 pieds dans une prairie hygrophile à l'est de Sureau (avec *Carex lepidocarpa*) (21-05-2006).
- *Daphne cneorum*
 - Bussac-Forêt, une seule et unique station de 2 pieds dans une moliniaie-lande (*Erico scopariae-Molinietum*), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
- *Dryopteris affinis*
 - Clérac, vallon humide à l'ouest de Forien (06-2006).
- *Dryopteris dilatata*
 - Clérac, vallon humide à l'ouest de Forien (06-2006).
- *Ecbalium elaterium*
 - Le Château-d'Oléron, un unique individu au pied des remparts de la citadelle (4-11-2008).
- *Exaculum pusillum*
 - Bussac-Forêt, une petite station de quelques pieds dans une dépression au sein d'une moliniaie-lande (*Erico scopariae - Molinietum*) de plusieurs hectares acquise par le CREN, vers la « Petite Ferrière » (8-2007).
- *Galium boreale*
 - Bussac-Forêt, répandu mais peu abondant dans une moliniaie-lande (*Erico scopariae - Molinietum*), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
- *Gentiana pneumonanthe*
 - La Gripperie-Saint-Symphorien, 2 micro-stations dans des layons de lande mésophile à *Erica scoparia*, un peu au sud de la Montée Gironde ; (07-2007) ;
 - Bussac-Forêt, 20 micro-stations (1-3 pieds à chaque fois) dans une moliniaie-lande (*Erico scopariae - Molinietum*), vers la « Petite Ferrière » (08-2007).
- *Geranium pusillum*
 - Saint-Denis-du-Pin et Antezant, répandu et localement assez abondant dans les cultures de céréales sur groies entre ces deux communes (06-2005).
- *Gladiolus italicus*
 - Montlieu-la-Garde, culture à l'est de Chez Dalon (06-2005).

- ▶ *Gratiola officinalis*
 - Bussac-Forêt, 3 petites stations dans une moliniaie-lande (***Erico scopariae* - *Molinietum***), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
- ▶ *Hesperis matronalis*
 - Saint-Césaire, quelques beaux pieds au bord du Coran (06-2006). Espèce spectaculaire, souvent cultivée, de statut incertain en Charente-Maritime.
- ▶ *Iberis amara*
 - Orignolles, friche sèche au nord de la Pierrière (05-2006).
- ▶ *Juncus striatus*
 - Saintes, vallée de la Charente, prairie méso-hygrophile de fauche à l'est de la « Métairie de Madame » (5-06-2008), une station de quelques m².
- ▶ *Lathyrus pannonicus*
 - Bussac-Forêt. Localisée et rare (moins de 10 pieds) dans une moliniaie-lande (***Erico scopariae* - *Molinietum***), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).
- ▶ *Legousia hybrida*
 - Saint-Porchaire, AC dans une céréale clairesemée (agriculteur bio !), vers « Bel-Air » (31-05-2008).
- ▶ *Limonium ovalifolium*
 - Le Château-d'Oléron, Pointe d'Oume, assez abondant, avec *Frankenia laevis* comme presque toujours sur le littoral charentais (01-09-2008).
- ▶ *Linaria pelisseriana*
 - Bussac-Forêt, AC sur la marge d'une piste sablonneuse, au sud-ouest du Jarcelet et menant à la Saye (16-05-2008).
- ▶ *Littorella uniflora*
 - Neuvicq, étang de Maine Jary. **Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime**, découverte par P. JOURDE lors de la réalisation de l'atlas départemental des odonates. Vue très abondante, surtout sur la rive ouest (07- 2006).
- ▶ *Milium scabrum*
 - Port-des-Barques, pelouse sablonneuse à l'entrée de l'île Madame, quelques pieds seulement (12-04-2007).
- ▶ *Moehringia pentandra*
 - Les Mathes, quelques individus en sous-bois du parc de loisirs « Indian Forest » (04-2008).
- ▶ *Myrica gale*
 - Saint-Pierre-du-Palais, petite lande tourbeuse bordant la D 910 bis au niveau du Ruisseau de l'Enclou (21-05-2006).
- ▶ *Neotinea intacta*
 - Les Portes-en-Ré, bois de Trousse-Chemise, au moins 200 rosettes comptabilisées (12-03-2006).
- ▶ *Odontites jaubertianus*
 - Saint-Porchaire, plusieurs centaines de pieds au sein des vides du ***Bellidi - Festucetum***, pelouse de Bel-Air (7-09-2008) ;

- Le Château-d'Oléron, digue à la mer de la Pointe d'Oume (01-09-2008), quelques pieds ;
- Marennes, talus de la déviation qui mène à l'île d'Oléron, quelques pieds (13-09-2008).
- *Ophrys argensonensis*
- Saint-Porchaire, quelques pieds en ourlet de chênaie pubescente à Chêne vert, lisière sud du bois de la Combe Brune (05-2008).
- *Ornithopus pinnatus*
- La Gripperie-Saint-Symphorien, quelques dizaines de pieds sur un chemin sablonneux, RNV de La Massonne (05-2008).
- *Orobanche purpurea*
- Saint-Pierre-du-Palais, prairie de fauche mésophile au sud de Chagnaud, une centaine de pieds (21-05-2006) ;
- Clérac, terre-plein bordant la D 158 à l'entrée sud-est de Clérac, quelques pieds (05-2006) ;
- Orignolles, prairies mésophiles à l'est de la D 134, au sud de la Berlanderie (05-2006).

Cette espèce, considérée jusqu'ici comme très rare en Charente-Maritime (aucune mention au cours des 20 dernières années) semble donc avoir un petit centre de dispersion dans le sud du département.

- *Osmunda regalis*
- Le Fouilloux, bords du Palais, au nord de Moissant (05-2006).
- *Phalaris paradoxa*
- Saint-Vivien, champ argileux de céréales situé au nord du bois de Châteaugaillard (07-2007). **Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime !**
- *Phillyrea latifolia*
- Le Château-d'Oléron, quelques très beaux individus sur un cordon sableux séparant d'anciennes salines, vers la Pointe Blanche (01-09-2008).
- *Pilularia globulifera*
- Bussac-Forêt et Corignac, présente dans 2 mares des « Brandes de Corignac », ainsi qu'en bordure d'une mare et le long d'un fossé à la « Petite Ferrière », ce qui, avec la station que nous avons signalée à proximité, le long du pare-feu à *Kickxia cirrhosa*, et celle, classique de l'étang des Sauzes, porte à 6 le nombre de stations de cette espèce RR en Charente-Maritime, toutes situées sur les communes citées (08-2007).
- *Potamogeton obtusifolius*
- Corignac, c'est à cette espèce que nous rapportons un potamot non fructifié récolté dans une micro-mare du secteur des Brandes de Corignac (05-2006). L'identification devra toutefois être retenue à l'aide d'échantillons portant des fruits mûrs pour confirmer la présence de cette espèce qui **serait nouvelle pour la Charente-Maritime.**
- *Potentilla recta*
- Saint-Pierre-du-Palais, une trentaine de pieds dispersés dans une prairie

mésophile calcifuge au sud-est de Chagnaud (05-2006). Espèce très rare en Poitou-Charentes.

► *Prunella hyssopifolia*

- Bussac-Forêt, abondante mais localisée en bordure d'une moliniaie-lande (*Erico scopariae* - *Molinietum*), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).

► *Puccinellia fasciculata*

- Saint-Laurent-de-la-Prée, 3 micro-stations sur des pas d'entrées de parcelles au nord du Pont de Charras (05-2007).

► *Puccinellia rupestris*

- Loiré-les-Marais, la Grand Prée, abondant sur un parking de terre et gravats calcaires servant de plateforme à une station de pompage et, de là, pénètre largement dans la céréale voisine où les pieds sont beaucoup plus robustes (9-06-2008).

► *Ranunculus arvensis*

- Villars-les-Bois, vigne argileuse (avec *Veronica agrestis*) à l'ouest de Chautabry ;

- Villars-les-Bois, vigne à l'ouest de Chez Lunaud (04-2006).

► *Ranunculus lingua*

- Saint-Vivien, un unique individu (stérile !) à l'angle sud-est du bois de Châteaugaillard (07-2007).

► *Ranunculus peltatus*

- Corignac, une unique station d'une dizaine d'individus dans une mare du secteur des Brandes de Corignac (05-2006).

► *Ranunculus tripartitus*

- Corignac, présente dans 4 mares du secteur des Brandes de Corignac (05-2006).

► *Rhynchospora alba*

- La Génétouze, quelques pieds parmi les *Sphagnum* de la saulaie tourbeuse du Mauvais Pas (9/09/2005).

► *Rumex palustris*

- Saint-Vivien, quelques pieds sur des dépôts de boues de curage des fossés sur la lisière sud du bois de Châteaugaillard (07-2007).

► *Sanguisorba officinalis*

- Bussac-Forêt, assez commune (500-1000 pieds) dans une moliniaie-lande (*Erico scopariae* - *Molinietum*), vers la « Petite Ferrière » (16-05-2008).

► *Sisymbrella aspera*

- Saint-Porchaire, AC dans l'angle d'un champ argilo-calcaire subissant des submersions temporaires, vers « Bel-Air » (31-05-2008).

► *Thelypteris palustris*

- Clérac, bois humide au sud de le Brandard (06-2006).

► *Thymelaea passerina*

- Saint-Porchaire, une quarantaine de pieds sur la pelouse de Bel-Air (7-09-2008). Espèce devenue introuvable dans le Centre-Ouest !

► *Trifolium patens*

- Montlieu-La-Garde, prairie méso-hygrophile dans la vallée de l'Ary entre Chassit et Moulin Berland (avec *Fritillaria meleagris*) (06-2006) ;
- Orignolles, entre Sauvaine et Chez Tureau (06-2006).

► *Utricularia minor*

- Corignac, présente dans 4 mares du secteur des Brandes de Corignac (06-2006).

► *Valerianella rimosa*

- Saint-Porchaire, AC dans une céréale clairsemée (agriculteur bio !), vers « Bel-Air » (31-05-2008).

► *Veronica acinifolia*

- Villars-les-Bois, présente dans de nombreuses vignes (05-2006) ;
- Brizambourg, vigne vers Chez Gautret (04-2006).

► *Veronica agrestis*

- Villars-les-Bois, quelques pieds dans une vigne argileuse (avec *Veronica acinifolia*) à l'ouest de Chautabry (04/2006). Contrairement à la précédente, localisée mais encore localement fréquente, cette espèce est devenue introuvable en Charente-Maritime.

► *Vicia narbonensis*

- Loiré-les-Marais, la Grand Prée, quelques pieds dans une bande enherbée PAC ayant reçu les boues de curage d'un fossé (9/06/2008).

79 - Département des Deux-Sèvres

Contribution de Yves BARON

► *Montia minor*

- Melle, au pied de la grotte de Loubeau (7/03/2008).

Contribution de Patrick GATIGNOL (P.G.)

► *Carex depauperata* Curtis ex With.

- Exireuil, Le Puits d'Enfer. Quelques pieds de cette espèce inscrite sur la LRR, disséminés le long d'un petit sentier à travers le bois. 15-05-2008. (P.G.).

► *Bupleurum virgatum* Cav.

- Sainte-Radegonde, Site de la Cascade de Pommiers. A la lumière de la monographie de J.-P. REDURON c'est bien à cette espèce qu'il faut rapporter ma citation du 13-06-91 sous *Bupleurum gerardi* (Cf. REDURON J.-P., 2007 : *Ombellifères de France, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., Numéro Spécial 27* tome 2 : 625-648). Ce Bupleurum thermophile qui semble inféodé aux sols plutôt sablonneux (ici arènes granitiques) serait à rechercher dans les secteurs analogues de notre région. (P.G.).

► *Sagina subulata* (Sw.) C. Presl subsp. *subulata*

- Exireuil, coteau de la Boutinière. Une petite population dans la station d'*Ophioglossum azoricum*. 15-05-2008. (P.G.).

► *Scleranthus polycarpus* L.

- Exireuil, coteau de la Boutinière. Espèce méditerranéenne atlantique bien présente sur cette station ainsi que sur les Tines de Chobert à proximité. 15-05-2008. (P.G.).

Cette espèce se retrouve sur la plupart des pelouses siliceuses des Deux-Sèvres : secteur d'Argenton-Château et de Thouars (vallée du Pressoir).

► *Campanula erinus* L.

- Availle-Thouarsais, vallée de Fourbeau. Deux pieds en fleurs pour cette espèce assez discrète. 10-06-2008. (P.G. avec Yann SELLIER).

86 - Département de la Vienne

Contribution de Yves BARON

► *Ambrosia artemisiaefolia*

- Saint-Benoît, dans un massif en face du square, deux énormes pieds (12/08/2008, objet d'un reportage FR3), signalé rue du Val béni (2 pieds) et rue de la Médoquerie (une cinquantaine de pieds) par des particuliers au pied de nourrissoirs à oiseaux (graines mélangées à celles de tournesol 22/08/2008).

► *Anmi majus*

- Messicole actuellement en extension à l'ouest de Poitiers, dont certaines formes à allure de *Bifora* (feuilles végétatives à divisions linéaires jusqu'au contact des ombelles) identifiées le 17/06/2008, Migné-Auxances, Saint-Nicolas, (groupe messicoles Poitou-Charentes Nature, 18/05/2008). Autres messicoles relevées : *Adonis annua* (dont formes pâles), *Viola arvensis* et *tricolor*, *Petroselinum segetum*, *Linaria supina*, *Euphorbia falcata*, *Legousia speculum-veneris*, *Papaver hybridum*, *Alopecurus myosuroides*, *Calendula arvensis*, etc. plus *Bupleurum lancifolium* le 17/06/2008. C'est ici qu'avaient été relevés le 13/07/1988 les 2 seuls pieds de *Bifora testiculata* jamais signalés dans la région à l'époque « moderne », d'où la vigilance ci-dessus.

► *Conium maculatum*

- Poitiers, le Breuil Mingot, entrée voie express (16/05/2008) ;
- Chouppes, Villecouppère (22-5-08) ;
- Loudun, Les Trois Moutiers, bermes N 147 (5/07/2008).

Espèce rudérale assez répandue, voire abondante (cf N 147 autour de Neuville, ou N 11 près de la Rochelle), mais qui manque dans de nombreux secteurs (fossés de la N 149 à l'ouest de Poitiers), et semble-t-il à l'est de Poitiers. A signaler.

► *Euphorbia esula* :

- Migné-Auxances, N 149, à l'entrée de la Cadoue (20/06/2008).

► *Linaria supina*

- Poitiers, zone industrielle de la République, terre-plein central de la rocade ouest, sur plusieurs centaines de mètres (6/05/2008).

- *Orchis simia*
- Angles-sur-l'Anglin, à Remerle, coteaux au dessus du Roc-aux-Sorciers, avec *Orchis purpurea* (8/05/2008).
- *Polycarpon tetraphyllum*
- Poitiers, rue Saint-Grégoire, rue Louis Renard (28/06/2008). Espèce d'affinité urbaine qui semble plus méconnue que rare.
- *Sedum ochroleucum*
- Vouneuil-sous-Biard, berme D 3 à la Grand-Vallée (25-7-08).
- *Sporobolus tenacissimus*
- Ligugé, au nord de la Galonnière, le long d'une petite voie de desserte parallèle à la N 10 (22/09/2008).
- *Stachys alpina*
- Saint-Benoît, Fontarnaud (21/06/2008).

ERRATA

Contribution à l'Inventaire de la Flore 2006

(*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **38** : 292-293)

La contribution de ces trois pages est la mienne (mais on pouvait supprimer celle concernant le *Damasonium* cité d'après B. ROCHOLET (Étude d'Impact Ligne TGV), ayant été précédé - à mon insu - par PG, cf p. 290). De même, le mérite de la découverte du site messicole de Neuville revient à D. PERROCHE et A.C. (p. 290), que j'ai citée par précaution, ne sachant alors si elle serait publiée, pour situer mon modeste complément (*Agrostemma githago* et *Calendula arvensis*).

Contribution d'Antoine CHASTENET (A.C.),

de Patrick GATIGNOL (P.G.)

et découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86)

- *Campanula persicifolia* L. subsp. *persicifolia*
- Guesnes, en face du parking de l'aire de repos au bord de la nationale. Une dizaine de pieds sur le bas-côté de la route de Poitiers à Loudun. 28-04-2008. (A.C.).
- *Carex viridula* Michx. subsp. *viridula* var. *viridula*
- Ternay, landes de Ternay, quelques pieds près d'une mare. 17-05-2008. (S.B.C.O.-86).
- *Carex pulicaris* L. (LRR)
- Vouneuil-sur-Vienne, Pinail (en dehors de la Réserve) - 24-05-2008. (S.B.C.O.-86).
- *Cirsium* × *forsteri* (Sm.) Loudon (= *C. spurium*)
- Ternay, landes de Ternay. Quelques pieds de ce curieux et très rare hybride entre *Cirsium dissectum* et *Cirsium palustre* qui sont tous les deux présents

sur le site. 17-05-2008. (S.B.C.O.-86).

- *Euphorbia platyphyllos* L. subsp. *platyphyllos*
- Roiffé, près de Saint-Hilaire, une dizaine de pieds. 29-05-2008. (A.C.).
- *Fallopia dumetorum*
- Angliers, Près de la station de pompage sur la route de Loudun. Une belle population sur un grillage limitant une parcelle replantée. 15-10-2008. (A.C.).
- *Hieracium aurantiacum* L.
- Loudun, Véniers près du cynodrome. Quelques pieds de cette plante montagnarde dont on peut se demander ce qu'elle fait ici (introduction ? échappée de culture ?). 05-06-2008. (A.C.).
- *Inula salicina* L. subsp. *salicina*
- Bournand, Auton. Une très belle station dans un fossé. 30-06-2008. (A.C.).
- *Lithospermum officinale*
- Guesnes, plusieurs dizaines de pieds sur le bas-côté de la route de Poitiers à Loudun. 28-04-2008. (A.C.).
- *Myosurus minimus*
- Bournand, non loin du Passoir. Plusieurs centaine de pieds, avant labourage, dans un champ semé en tournesol en 2007. 29-04-2008. (A.C.).
- Bournand, non loin du terrain de kart. Quelques pieds, avant labourage, dans un champ semé en maïs en 2007. 06-05-2008. (A.C.).
- *Orchis simia*
- Guesnes, plusieurs dizaines de pieds sur le bas-côté de la route de Poitiers à Loudun. 28-04-2008. (A.C.).
- *Rosa tomentosa* Sm.
- Ternay, landes de Ternay. Bien présent dans une haie en mélange avec *Rosa* × *nitidula*. Espèce peu fréquente dans la Vienne. 17-05-2008. (S.B.C.O.-86).