

## Détermination rapide des genres de champignons à lames

A observer		Couleur de la sporée			
		blanche à jaune pâle	rose	±rouille	noire
Pied cassant comme de la craie	Pas de lait	<i>Russula</i>			
	Présence de lait	<i>Lactarius</i>			
Volve + anneau		<i>Amanita</i>			
Pas de Volve + anneau		<i>Limacella</i>			
Volve + pas d'anneau		<i>Amatopsis s.l.</i>	<i>Volvariella</i>		
Anneau	Pied séparable du chapeau	<i>Lepiota</i>			<i>Agaricus</i>
	Pied non séparable	<i>Armillaria</i> <i>Cystoderma</i>		<i>Galerina</i> <i>Kuehneromycete</i> <i>Gymnopilus</i> <i>Rozites</i> <i>Agrocybe</i> <i>Pholiota</i>	<i>Stropharia</i>
Cortine présente				<i>Cortinarius</i>	<i>Hypoholoma</i>
Lames libres			<i>Pluteus</i>		
Lames adnées (parfois une cortine fugace), chapeau fibrilleux souvent fendu radialement				<i>Inocybe</i>	
Lames échancrées		<i>Tricholoma</i>	<i>Entoloma</i>	<i>Hebeloma</i>	
Lames décurrentes	Pied central	<i>Clitocybe</i>	<i>Clitopilus</i>		<i>Gomphidius</i>
	Pied excentrique	<i>Pleurotus</i>			
	Lames espacées et épaisses	<i>Hygrophorus</i>			<i>Gomphidius</i>
	Lames fourchues	<i>Hygrophoropsis</i>			
	Lames facilement séparables du pied			<i>Paxillus</i> <i>Tapinella</i>	
	Marge fissile, lignicole	<i>Omphalotus</i>			
Lames déliquescentes					<i>Coprinus</i>
Lames nuageuses					<i>Paneolus</i>
Champignons assez grêles	Pied fortement résistant à la torsion	<i>Marasmius</i> <i>Collybia</i> <i>Mucidula</i>			
	Pied ± résistant à la torsion	<i>Laccaria</i> <i>Mycena</i>			